




I, 4

285

[Handwritten signature]

<36608176800019

<36608176800019

Bayer. Staatsbibliothek

PHILOLOGISCHE
UNTERSUCHUNGEN

HERAUSGEGEBEN

VON

A. KIESSLING UND U. V. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.

VIERZEHNTE HEFT:

DIE PNEUMATISCHE SCHULE
BIS AUF ARCHIGENES

IN IHRER ENTWICKELUNG DARGESTELLT

VON

MAX WELLMANN.

BERLIN

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1895.

DIE PNEUMATISCHE SCHULE

BIS AUF ARCHIGENES

IN IHRER ENTWICKELUNG DARGESTELLT


VON

MAX WELLMANN

BERLIN

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1895.



Bayerische
Staatsbibliothek
München

EINLEITUNG.

ÄUSSERE GESCHICHTE DER PNEUMATISCHEN SCHULE BIS AUF ARCHIGENES.

1.

Athenaios.

Das erste Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung bezeichnet für die Medizin die Zeit der letzten Blüte. Die vermehrte Genufsucht und die kolossale Lasterhaftigkeit der Bevölkerung des neuen römisch-hellenischen Weltreiches waren die indirekte Veranlassung derselben. Die neuen Krankheiten, welche die allgemeine Demoralisation im Gefolge hatte¹⁾, die verheerenden Epidemien, die in den gröfseren Städten infolge des unverhältnismäfsig schnellen Wachstums der Bevölkerung und besonders in den Handelsstädten infolge des Zusammenströmens eines bunten Gemisches korrumpierten Gesindels von den Nationen dreier Weltteile ausbrachen²⁾, gaben den Ärzten reichlich Gelegenheit zur Vervollkommnung ihrer Wissenschaft. Dazu kam das rege Interesse, das die römischen Kaiser von Augustus an der Medizin entgegenbrachten und das in der Wiederaufnahme einer alten Institution, der Archiatry, die an den Höfen

¹⁾ Plin. n. h. XXVI 1 ff.

²⁾ Gal. XII 839: Pamphilos erwarb in Rom grofse Reichtümer mit einem Mittel gegen Mentagra, als dort eine Mentagra-Epidemie herrschte. Oribas II 68 (D.): Zur Zeit des Pneumatikers Apollonios aus Pergamon wurde Asien von der Pest heimgesucht. Vgl. Friedländer, Sittengeschichte Roms I⁶ 39.

der Nachfolger Alexanders des Großen allgemein verbreitet gewesen war¹⁾, einen sichtbaren Ausdruck fand.

In der Geschichte der Medizin dieser Zeit sind zwei Erscheinungen besonders auffallend. Während in vorchristlicher Zeit Kos und Alexandria die Hauptsitze gewesen waren, gehören seit der Zeit des ersten Jahrhunderts v. Chr. die bedeutendsten Ärzte durch ihre Geburt Kleinasien²⁾ an: an die Stelle der früheren Centren treten die Schulen von Pergamon, Ephesus, Tralles, Milet, Attalia u. s. w. Die andere durchgehende Erscheinung dieser Zeit liegt in dem Umstande, daß gerade die bedeutendsten Ärzte entweder vorübergehend oder ständig in der Hauptstadt des römischen Reiches gewirkt haben³⁾. Es erklärt sich dies in erster Linie aus rein äußerlichen Gründen: Rom bot mehr Aussicht auf Erfolg und Verdienst als jede andere Stadt. Dann hat aber auch die Einrichtung der Archiatrie sehr viel dazu beigetragen, daß gerade die tüchtigsten Ärzte nach Rom gingen: die ἀρχιατροί hatten nicht bloß als Leibärzte der Kaiser, sondern auch in andern ärztlichen Funktionen reichliche Gelegenheit⁴⁾, ihr umfangreiches Wissen und ihre reiche Erfahrung zum Wohle der Menschheit zu verwerten.

Die drei großen Schulen der vorchristlichen Zeit, die dogmatische, empirische und die Schule des Asklepiades bestanden in dieser Zeit fort. Daneben aber gab es eine nicht geringe Zahl von Ärzten, die unbefriedigt von den bestehenden Systemen entweder die Lehren derselben weiter ausbildeten oder durch Verquickung der Medizin mit der Philosophie die Grundlage zu einem neuen System schufen. Gleichzeitig machte sich das Bestreben geltend, die Gegensätze der

¹⁾ Briau, L'archiatrie romaine ou la médecine officielle dans l'empire romain. Paris 1877. Homolle Bull. de corr. hellén. IV 218 (1880). Bull. de corr. hellén. VII 359 (1883). In der litterarischen Überlieferung ist Themison der erste ἀρχιατρός. Vgl. schol. Juven. sat. X 221 p. 327 (Jahn). Es ist eine lohnende Aufgabe, die auf Inschriften vorkommenden Ärzte zusammenzustellen.

²⁾ Asklepiades stammte aus Prusa in Bithynien, Themison und Archigenes aus Syrien, Thessalos aus Tralles, Athenaios aus Attalia, Menemachos aus Aphrodisias, Magnus, Soran und Rufus aus Ephesus, Olympiakos aus Milet, der Pneumatiker Apollonios aus Pergamon, Dioskorides aus Anazarba, Aretaios und Heras aus Cappadocien u. s. w.

³⁾ So z. B. Asklepiades, Themison, Thessalos, Andromachos, Athenaios, Agathinos, Herodot, Heliodor, Soran u. s. w.

⁴⁾ Briau, a. a. O.

*of R. Gohl
Ort mit Inschriften
Bau 1905*

herrschenden Schulen mit einander zu versöhnen und so eine synkretistische Richtung zu fördern, die uns auf philosophischem Gebiet schon ein Jahrhundert früher begegnet.

Aus der Schule des Asklepiades ist der Arzt hervorgegangen, der durch Popularisierung der Theorieen seines Lehrers der Begründer der methodischen Schule wurde, Themison aus Laodicea. Die große Zahl der Anhänger¹⁾ dieser Schule spricht für den Beifall, den ihre straffe Systematik gefunden hat. Der bekannteste Vertreter ist Thessalos aus Tralles, ein Schüler des Themison aus neronischer Zeit, ein Arzt von schamloser Selbstsucht und marktschreierischer Großthuererei, der mit Unrecht für die Folgezeit der typische Vertreter dieser Schule geworden ist.

Für die weitere Entwicklung der Arzneiwissenschaft war die methodische Schule mit ihrer allerdings einfachen, aber höchst einseitigen Lehre von den κοινότητες und der daraus abgeleiteten Therapie von untergeordneter Bedeutung im Verhältnis zu einer anderen Ärzteschule, deren Anfänge in etwas spätere Zeit, etwa in die des Claudius fallen — ich meine im Verhältnis zu der pneumatischen Schule. Das Charakteristische derselben besteht in einer eigenartigen Verknüpfung der stoischen Philosophie mit den Hauptsätzen der dogmatischen Schule. Diese Verquickung der Medizin gerade mit dem Stoicismus wird verständlich durch die hinlänglich bekannte Thatsache, daß in jener Zeit der Stoicismus zu weitverbreiteter Herrschaft gelangt war. Die Verdienste der Pneu-

¹⁾ Ich nenne von den Schülern des Themison: Meges aus Sidon (schol. Oribas. III 688, 17. Gal. X 454. Cels. V 28, 7 u. öfter), Eudemos (Cael. Aur. A. M. II 38 u. öfter), Proculus (Cael. Aur. M. Ch. III 8. Er ist identisch mit dem von Galen erwähnten Methodiker Proclos: Gal. X 52. XIV 684. Oribas. V 130. Vgl. Grotefend, Die Stempel der röm. Augenärzte. Hannover 1867 n. 83. 84, dessen Bedenken gegen die Identität unbegründet sind) und Menemachos aus Aphrodisias (Gal., a. a. O. Da Celsus bereits ein Zahnmittel von ihm anführt VI 9, 247 D., so muß er ebenfalls Schüler des Themison gewesen sein. Als solcher giebt er sich dadurch zu erkennen, daß er genaue Vorschriften über die zuerst von seinem Lehrer verwandten Blutegel gegeben hat: Orib. II 72. Vgl. II 417f.). Ferner Dionysios (Gal. X 52. XIV 684), Mnaseas (er gehört schon der zweiten Hälfte des 1. Jahrh. an. Soran benutzte ihn: Cael. Aur. M. Ch. II 7. περὶ γυν. παθ. I 6, 27. 29 R. Andererseits ist er jünger als Dionysios: Sor. a. a. O.). Antipatros, Olympikos aus Milet und Apollonides aus Cypern (Gal., a. a. O.).

matiker sind nicht auf ein Gebiet der Medizin beschränkt, sondern erstrecken sich gleichermaßen auf die Physiologie, Diätetik, Pathologie und Therapie. Als Stifter galt Athenaios aus Attalia, aber schon unter seinem Schüler Agathinos nahm sie eine eklektische Richtung an, die sie nicht zu ihrem Schaden unter den späteren Vertretern beibehielt.

Über das Leben des Stifters sind uns fast gar keine Nachrichten erhalten, nicht einmal über die Zeit seiner Thätigkeit liegt eine directe Überlieferung vor. Eine Möglichkeit, dieselbe zu bestimmen, ergibt sich aus der bei Suidas s. v. Ἀρχιγένης erhaltenen, durch Juvenal¹⁾ bestätigten Angabe über die Lebenszeit des Archigenes. Da dieser Arzt unter Trajan blühte, sicher nicht nach Trajan, weil er schon von Rufus²⁾ und Soran benützt³⁾ ist, und da er ein Alter von 63 Jahren erreicht hat (Suid.), so muß er spätestens 54 n. Chr. geboren sein; demnach kommen wir mit seinem Lehrer Agathinos (Suid.) in die Zeit der Flavier oder wenn wir für ihn eine längere Lebenszeit in Anspruch nehmen, in die neronische Zeit, und mit seinem Lehrer Athenaios⁴⁾ in die Zeit des Claudius. Des Athenaios Lehrthätigkeit bis in die Zeit des Tiberius hinaufzurücken, verwehrt uns die Thatsache, daß Celsus, der unter Tiberius seine acht Bücher de medicina schrieb⁵⁾, die Anhänger der pneumatischen Schule mit keinem Worte erwähnt, während er die Theorien der etwas älteren methodischen Schule bereits berücksichtigt hat, ferner eine Notiz des Galen⁶⁾, nach welcher der Lehrer des Scribonius Largus, Tryphon⁷⁾ oder dessen Sohn bereits von Athenaios benützt ist. Der erste Arzt, der beide Pneumatiker erwähnt, ist der jüngere

¹⁾ Juv. sat. VI 236. XIII 98. XIV 252.

²⁾ Rufus d'Éphèse ed. Ruelle 496, 2.

³⁾ Cael. Aur. A. M. II 10.

⁴⁾ Gal. VIII 787.

⁵⁾ M. Schanz, Die Schriften des Cornelius Celsus. Rh. Mus. XXXVI 362 ff.

⁶⁾ Gal. XIII 847.

⁷⁾ Vgl. Scrib. Larg. comp. c. 175, 71 H. Seine Verdienste liegen auf dem Gebiet der Pharmacie und Chirurgie. Vgl. Cels. VII prooem. 263 D. Galen nennt ihn zweimal Τρύφων ἀρχαῖος: Gal. XII 843 = Scrib. Larg. 203, 82. Gal. XIII 745 = Scrib. Larg. c. 201, 81. Der Tryphon pater (Cels. a. a. O.) setzt einen Tryphon filius voraus. Vielleicht ist sein Sohn der von Galen mit dem Distinktiv Τογτυριάτης angeführte Tr. XIII 246 = 253 (aus Asklepiades).

Andromachos aus der Zeit der Flavier in seinem pharmaceutischen Werk *περὶ φαρμάκων σκευασίας*¹⁾.

Nachdem wir eine Grundlage für die Zeitbestimmung der beiden ältesten Pneumatiker gewonnen haben, halte ich die Vermutung Osanns²⁾ für höchst wahrscheinlich, daß der in der *vita Persii* als Freund des Stoikers Cornutus erwähnte Claudius Agaturinus³⁾ (so oder Agaturrinus die Hds.) *medicus Lacedaemonius* kein anderer ist als der Pneumatiker Agathinos. Alle persönlichen Anzeichen passen vortrefflich auf ihn: sein wirkliches Nomen war Claudius⁴⁾, er wirkte wie sein Schüler Herodot⁵⁾ und Archigenes in Rom, ferner stammte er thatsächlich aus Sparta⁶⁾, endlich glaubt man gern, daß ein Vertreter der ärztlichen Schule, die sich nach dem Zeugnis des Galen⁷⁾ direkt an die Lehren der Stoa angeschlossen hat, in dem Hause eines Cornutus verkehrte. Athenaios stammte aus Attalia⁸⁾ (in Pamphylien?), ging von dort nach Rom und wurde hier das Haupt einer eigenen Schule. Er muß hohes Ansehen genossen haben, da er einen großen Kreis von Schülern um sich scharte, *ὁ τῶν ἀπ' Ἀθηναίου χορός, οἱ ἀπ' Ἀθηναίου τοῦ Ἀτταλέως* oder *πνευματικοί*⁹⁾ genannt. Selbst die Nachwelt wagte es nicht, seinen Ruhm zu schmälern: der schmäh süchtige Galen spricht von ihm mit großer Achtung¹⁰⁾ und verdankt nicht wenige seiner Theorien dieser Schule. Die von ihm besonders bei Oribasius erhaltenen

1) Gal. XIII 296. 299.

2) Corn. de nat. deor. XVIII.

3) Vgl. Zeller, *Gesch. d. Phil.* IV 689 A. Simon Sepp, *Pyrrhonäische Studien*. Freising 1893, 120. Reinesius hat Claudius Agathemerus vermutet, den wir als Arzt aus C. I. S. I. 1750 kennen. Prof. v. Wilamowitz schließt sich ihm an, wie er mir brieflich mitgeteilt hat; den Sarkophag des Claudius Agathinos hält er für jünger.

4) C. I. S. I. 2064: *Κλαύδιος ἰητὴρ Ἀγαθεῖνος*.

5) Gal. VIII 750 f.

6) Gal. XIX 353. Vgl. Suet. Tib. 6.

7) Gal. VIII 631. 642.

8) Der Athenaeus Tarsensis bei Cael. Aur. A. M. II 1 ist höchst wahrscheinlich verderbt. Doch ist auch möglich, daß er thatsächlich eine Zeit lang in Tarsus gewirkt hat. Bei Sor. *περὶ γυν. παθ.* II praef. 2 R. ist *Ἀθηνίων* für *Ἀθήναιος* zu lesen: vgl. Cels. V 25, 9.

9) Gal. VII 295. VIII 749. 787 u. öfter.

10) Gal. I 457: *Καίτοι σχεδὸν οὐδεὶς τῶν νεωτέρων ἱατρῶν οὕτως ἅπαντα τὸν κατὰ τὴν ἱατρικὴν τέχνην ἐξεργάσατο λόγον ὥς Ἀθήναιος*. Vgl. Gal. VII 174.

ziemlich umfänglichen Bruchstücke zeugen von grofser Einfachheit und Klarheit der Darstellung und sind voll von richtigen Beobachtungen und treffenden Bemerkungen. Er ist die liebenswürdigste Erscheinung unter den Ärzten dieser Zeit: mit gründlicher philosophischer Bildung verband er einen scharfen Blick für die Mifsstände seiner Zeit. Es klingt wie eine verhaltene Klage, wenn er in seinen platonisch gehaltenen Vorschriften über Jugenderziehung seinen Zeitgenossen den Vorwurf macht, dafs die meisten von ihnen mehr Geld für kundige Pferdeknechte ausgäben als für tüchtige Pädagogen¹⁾, oder wenn er den Frauen im Interesse ihrer Gesundheit und ihrer Nachkommenschaft ein einfaches, in der Sorge für das Hauswesen aufgehendes Leben anempfiehlt²⁾.

Seine Kenntniss der grofsen Meister der philosophischen und medizinischen Litteratur ist nicht gering anzuschlagen³⁾: unter ihnen waren es vor allem die Werke des Aristoteles⁴⁾, Plato⁵⁾ und der Stoiker, besonders des Chrysipp⁶⁾, die er zur Begründung seines Systems heranzog; daneben benützte er von Philosophen den Empedokles⁷⁾, Theophrast⁸⁾, Straton von Lampsakos⁹⁾, Herakleides Pontikos¹⁰⁾, von Ärzten den Hippokrates¹¹⁾, Diokles¹²⁾, Andreas¹³⁾ und Asklepiades¹⁴⁾, jedoch so, dafs er mit Urteil und Kritik sich seinen Standpunkt wahrte¹⁵⁾.

Athenaios vertrat die Ansicht, dafs die Unterweisung in der Arzneikunde einen wichtigen Bestandteil des Jugendunterrichts bilden müsse, er verlangte also, dafs jeder Mensch Arzt sein müsse, da es keine Beschäftigung gebe, in der man nicht der Heilkunde bedürfe (Orib. III 164). Es ist daher begreiflich, dafs er, um dieser Forderung die Möglichkeit der Durchführung zu verschaffen, ein grofsartig angelegtes Werk verfasste, in dem er die gesamte Arzneikunde behandelte, streng nach seinen Grundsätzen und mit vielem wertvollen gelehrten Material, unter dem Titel *περὶ βοηθημάτων* (Orib.

1) Orib. III 163 f.

2) Orib. III 97.

3) H. Diels, Sitzungsber. d. B. Ak. 1893, S. 102, Anm. 2 hat zuerst auf das doxographische Interesse dieses Mannes aufmerksam gemacht.

4) Gal. I 486. IV 610. 612. 613. 620. 626.

5) Gal. VII 609.

6) Gal. I 486. 523.

7) Orib. III 79.

8) Gal. I 523.

9) Gal. VII 615 f.

10) Gal. a. a. O.

11) Orib. III 98.

12) Orib. III 78.

13) Orib. III 108.

14) Gal. VII 615. I 486.

15) Gal. I 486. VII 615.

II 302) in mindestens 30 Büchern (Orib. a. a. O.). Die Anordnung des Ganzen läßt sich nicht mehr erkennen, aber soviel ergibt sich aus den Bruchstücken, daß er alle¹⁾ Gebiete der Medizin darin bearbeitet hat. So behandelte er in den ersten Büchern die Diätetik: im 1. Buche die Nahrungsmittel, die verschiedenen Getreidearten, wie Weizen (Orib. I 10), Gerste (Orib. I 26) und die daraus bereiteten Brote (Orib. I 24)²⁾, wahrscheinlich auch das Wasser (Orib. I 337), im 3. Buche die Physiologie (Gal. XIX 356), im 7. Buche die Entwicklungsgeschichte (Gal. IV 604), im 24. pathologische Fragen (Gal. VII 165), im 29. die Beschaffenheit der atmosphärischen Luft (Orib. II 291), im 30. endlich die Lage der menschlichen Wohnung (Orib. II 302).

Fraglich ist, ob die von Galen einmal (XV 444) erwähnte Schrift eines Athenaios über die Kunst des Wahrsagens aus dem Flug der Vögel mit unserm Arzte etwas zu thun hat. Namentlich citiert wird die Schrift von Galen nicht, vermutlich führte sie wie die Spezialschrift des mit ihm von Galen zusammen genannten Arztes Polles³⁾ von Aegä den Titel *οἰωνοσκοπικά*

2.

Agathinos.

Unter den Schülern des Athenaios ist der bedeutendste Claudius Agathinus aus Sparta⁴⁾, von dessen Lebenszeit im vorhergehenden Paragraphen die Rede war. Mit ihm und einem nicht weiter bekannten Petronius Aristocrates⁵⁾ aus Magnesia, die beide in der *vita Persii* als „doctissimi et sanctissimi viri“ bezeichnet werden, wurde im Hause des Cornutus der an Jahren jüngere Persius bekannt. Er galt als Stifter⁶⁾ der eklektischen oder episynthetischen oder hektischen

¹⁾ Vgl. Gal. I 457.

²⁾ Das an den beiden letzten Stellen bei Oribasius überlieferte *λ' λόγου* ist in *α' λόγου* zu ändern. Vgl. Daremb. I 564.

³⁾ Vgl. Suid. s. v. Orib. IV 528.

⁴⁾ Gal. VIII 787. XIX 353.

⁵⁾ Vielleicht auch Arzt. Einen Aristocrates grammaticus kennt Gal. XII 878. 879. Unter den Ärzten der Zeit war Neigung zur Stoa: so wird Julius Bassos, der Freund des jüngeren Niger, geradezu als *Στωικός* bezeichnet. Gal. XIII 1033.

⁶⁾ Gal. XIX 353.

Schule, deren Streben darauf gerichtet war, die Lehren der pneumatischen Schule mit denen der Empiriker und Methodiker zu vereinigen. Eine treffende Charakteristik dieses Mannes giebt sein Schüler Archigenes: *πάντα ἀκριβῆς ὧν καὶ οὐ πιστεύων τῇ ἐκλογῇ, ἀλλὰ καὶ πείρας εἰς ἀσφάλειαν δεόμενος*¹⁾ und berichtet von ihm, daß er auf empirischem Wege den Nutzen des Nieswurz festgestellt habe. Galen rühmt ihn ebenfalls als *ἀνὴρ οὐχ ὁ τυχῶν εἰς τὴν τοιαύτην ὑπείσῃ διδασκαλίαν*²⁾. Als er einmal an einem heftigen, mit Delirien verbundenen Fieber erkrankt war, wurde er von seinem Schüler Archigenes durch Übergießungen mit warmem Öl geheilt³⁾. In seinen Schriften behandelte er die von seiner Schule besonders ausgebildeten Gebiete der Medizin: die Pulslehre⁴⁾, die Lehre von den Fiebern⁵⁾ und hygienisch-diätetische Fragen⁶⁾. Dem Titel nach kennen wir nur die Schrift *περὶ σφυγμῶν*, welche seinem Schüler Herodot gewidmet war⁷⁾ und deren erstes Buch von den Pulsdefinitionen⁸⁾ handelte: in dieser Schrift zeigt er dasselbe doxographische Interesse wie sein Lehrer.

1) Orib. II 158.

2) Vgl. Gal. VIII 937.

3) Aet. III 172.

4) Gal. VIII 749.

5) Gal. VII 367. 369. 373. XVII A. 120. 228. 942.

6) So handelte er über den Gebrauch der Nieswurz (Cael. Aur. A. M. III 16), die er gegen Wassersucht empfahl, solange die Krankheit im Entstehen war. Vgl. Orib. II 158. Ferner über den Nutzen der kalten Bäder: Orib. II 394.

7) Gal. VIII 751.

8) Ein Abschnitt desselben läßt sich aus Galen rekonstruieren. Im vierten Buche seiner Schrift *περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν* giebt Galen eine Zusammenstellung und Kritik der verschiedenen spitzfindigen Definitionen des Pulses von der Zeit des Herophilos bis auf Archigenes. Hermann Schoene hat in seiner tüchtigen Doktorarbeit *de Aristoxeni περὶ τῆς Ἡροφίλου αἰρέσεως libro tertio decimo*, Bonn 1893, richtig erkannt, daß die von Galen gegebene Zusammenstellung von Definitionen der Herophileer aus Aristoxenos, einem Schüler des Alexander Philalethes, also aus der Zeit des Augustus oder Tiberius, stammt. Seine Abgrenzung des aristoxenischen Excerptes ist nicht ganz richtig: es reicht nur bis Gal. VIII 748, 8. An dieser Stelle setzt eine neue Quelle ein: daraus erklärt sich, daß er noch einmal auf die Definition des Bakchios zu sprechen kommt, trotzdem er sie schon 732, 8 abgethan hat. Angeführt werden in diesem Abschnitt die Definitionen des Asklepiadeers Philonides, des Herophileers Bakchios (748), des Agathinos (750), Athenaios (750. 756), Archigenes (754), Magnus (756), Asklepiades (757), Moschion (758) und des Erasistrateers Apollonios aus Memphis (759). Die beiden jüngsten der hier erwähnten Ärzte sind Agathinos und Archigenes. Zeitlich steht von ihnen Archigenes dem Galen am

3.

Theodoros. Magnus.

Von den übrigen Schülern des Athenaios ist nur wenig bekannt. Ein Θεόδωρος ἰατρὸς Ἀθηναίου μαθητῆς wird von Diogenes Laertius¹⁾ erwähnt, den ich mit dem Θεόδωρος ὁ Μακεδών identifiere, der in dem von E. Rohde²⁾ edierten Auszuge aus Archigenes citiert wird. Auf Archigenes gehen auch die sonstigen Erwähnungen³⁾ dieses Arztes zurück.

nächsten. Trotzdem spricht gegen die Annahme, daß er die Quelle dieser Zusammenstellung ist, der Umstand, daß er in seiner Schrift περὶ σφυγμῶν keine doxographische Übersicht über die Ansichten seiner Vorgänger gegeben hat; ferner ist es unwahrscheinlich, daß er die Ansicht des Athenaios, dem er zeitlich doch nicht so fern stand, aus Agathinos gekannt haben sollte wie Galen (750, 19). Die Quelle des Galen ist vielmehr sein Lehrer Agathinos. Es folgt aus seinen eigenen Worten 748, 8: ὥσπερ δ' ἐνταῦθα πολλῶν λόγων ὑπόθεσιν ἑαυτῷ τις πορίσασθαι δύναται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐὰν τὰ γεγραμμένα Φιλωνίδῃ τῷ Σικελῷ κατὰ τὸ περὶ τῆς ἰατρικῆς ὀκτωκαιδέκατον προχειρίζηται τις, ὧν ἐπὶ βραχὺ καὶ Ἀγαθῖνος ἐμνημόνευσε μεμφόμενος αὐτῷ πρῶτον μὲν ὡς μοχθηρῶς ἀποφηναμένῳ τὸν σφυγμὸν ἐν ἀσθηρίαις μόναις γίγνεσθαι, δεύτερον δὲ ὡς καὶ τὸν Βακχεῖον οὐκ ὀρθῶς ἑαυτῷ συνεπισπόμενῳ 750, 19: καὶ μέντοι καὶ τὸν Ἀθηναῖον φησιν (sc. Agathinos) οἶεσθαι καὶ τὴν συστολὴν ὀνομάζεσθαι σφυγμὸν etc. Die Definitionen des Philonides, Bakchios, Athenaios stammen also aus ihm, folglich hatte er wie sein Lehrer doxographisches Interesse. Daß er sich nicht auf die Definitionen der Pneumatiker beschränkte, sondern auch die der Erasistrateer und Asklepiadeer erwähnte, erklärt sich aus seinem eklektischen Standpunkt. Nunmehr wird es auch klar, wie Galen (715, 4—719, 10) darauf kam, sich gegen den Wert von Definitionen auszusprechen: er referiert einfach die Ansicht des Agathinos. Vgl. Gal. 719, 5: ταῦτα οὖν εἰκότως μεμφόμενος ἀεὶ τοῖς ἐπιχειροῦσιν ἅπαντα δι' ὅρων διδάσκειν εἵνεκα παραδείγματος ἐπὶ τόνδε τὸν λόγον ἤκον = Gal. 749, 13: ὁ γοῦν Ἀγαθῖνος . . . καίτοι τοῖς δι' ὅρων ἐπιχειροῦσιν ἅπαντα διδάσκειν ἐπιτιμῶν, ὅμως κτλ. 750, 9.

¹⁾ Diog. L. II 103: Θεόδωροι δὲ γεγόνασιν εἴκοσι — (104) ἑπτακαιδέκατος ἰατρὸς Ἀθηναίου μαθητῆς.

²⁾ Rhein. Mus. XXVIII 270. 282.

³⁾ Aet. VI 91. VIII 46. XII 5. XIV 24. 48. XVI 49. Alex. von Tralles I 559 (P.). Das Citat Alex. v. T. I 563: ἐκ τοῦ νῆ Θεοδώρου Μοσχίωνος (Μακεδόνης?) halte ich trotz Rose Soran XVII für verderbt. Mit dem Skeptiker Theodas, der etwas jünger zu sein scheint, hat er trotz Simon Sepp a. a. O. 119 nicht das mindeste zu thun. Der von Plinius XX 103, XXIV 186 erwähnte Theodoros ist sicher ein älterer Arzt.

Ferner gehört noch Magnus hierher, der von Galen¹⁾ zusammen mit Archigenes, Athenaios und Agathinos als Pneumatiker genannt wird. Auch von Caelius Aurelianus²⁾ wird er zusammen mit Agathinos und Archigenes erwähnt. Da er von ihm als älter bezeichnet wird als Agathinos, so kann er nur Schüler des Athenaios gewesen sein. Er stammte aus Ephesos und verfaßte Briefe medizinischen Inhalts in mindestens zwei Büchern³⁾. Eine zweite Schrift von ihm führte den Titel *περὶ τῶν ἐφευρημένων μετὰ τοὺς Θεμίσωνος χρόνους*, einem Demetrios gewidmet, in mindestens drei Büchern⁴⁾.

4.

Herodot. Leonidas.

Als Schüler des Agathinos werden Archigenes⁵⁾ und Herodot⁶⁾ genannt. Der letztere gehörte demnach dem Ende des 1. Jahrh. n. Chr.⁷⁾ an und hat mit dem skeptischen Philosophen gleichen

¹⁾ Gal. VIII 646: ὁ γὰρ τοι Μάγνος καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῆς πνευματικῆς αἰρέσεως εἶναι προσποιούμενος. Vgl. 674.

²⁾ Cael. Aur. A. M. II 10: Nam ex nostris primus Magnus eius (sc. καταλείψεως) argumenta constituit atque mox Agathinus, dehinc Archigenes. Er war also wie diese Eklektiker.

³⁾ Cael. Aur. A. M. III 14.

⁴⁾ Gal. VIII 640. Von ihm zu unterscheiden ist der Archiater Magnus, der unter Marc Aurel in Rom lebte und sich um die Lehre von den Giften verdient gemacht hat (Gal. XIV 261. 262. 263. 267). Es gab verschiedene Ärzte dieses Namens, deren Identifizierung die reinste Willkür wäre: einen Magnus ὁ Φιλαδελφεύς (Gal. XIII 296. 829. 831), der gleichfalls dem 1. Jahrh. n. Chr. angehört, ferner einen Magnus aus Tarsus (Gal. XIII 313), einen Magnus ὁ κλινικός (Gal. XII 829) und einen Magnus ὁ περιοδευτής (Gal. XII 844). Der von Theophilos *περὶ οὔρων* erwähnte *Μ. ἰατροσοφιστής* (Ideler med. et phys. I 261) gehört einer jüngeren Zeit an.

⁵⁾ Suid. s. v.

⁶⁾ Gal. VIII 750.

⁷⁾ Der erste, der ihn citiert, ist der Leibarzt des Trajan (Gal. XII 445. Martial XI 60, 6. Suid. s. *Ποῦφος*. F. H. G. IV 373 f.) Kriton (Gal. XIII 789. 801), der ein Handbuch der Toilettenkunst (*Κοσμητικά*) verfaßte, eine fleißige, aber dürre Zusammenstellung der kosmetischen Mittel des Herakleides von Tarent, der Cleopatra ὅσοι τ' ἄλλοι μετ' αὐτοὺς ἐν τῷ μεταξὺ γεγόνασιν ἰατροί in 4 B. (Gal. XII 446), d. h. des Damokrates (XII 486), Moschos (XII 401), Antonius Musa (XII 994), Artemidor (XII 828) und anderer. Eine Inhaltsangabe s. *κοσμητικά* hat Galen (XII 446 f.) erhalten. Die Cleopatra-Citate bei Galen gehen auf ihn zurück (Gal. XII 492. 403). Außerdem schrieb er *περὶ τῆς τῶν φαρμάκων συνθέσεως*

Namens nichts zu thun. Gegen die von Zeller¹⁾ und nach ihm von Simon Sepp²⁾ vermutete Identifizierung spricht allein schon die Nachricht des Galen³⁾, daß er keine medizinische Sekte außer der pneumatischen anerkennen wollte. Schwerlich hätte dieser Mann, der darnach zu den starrsinnigsten Anhängern dieser Schule gehörte, sich zu einer andern Schule bekannt, zumal den Pneumatikern nachgesagt wurde⁴⁾, daß sie lieber ihr Vaterland verraten hätten, als ihre Schule aufgeben. Außerdem läßt sich selbst bei den gewaltsamsten Reckungsversuchen seine Zeit (etwa 70—100) schlechterdings nicht mit der des Lehrers des Sextus Empiricus (170—200) vereinen.

Herodot war ein angesehener Arzt in Rom⁵⁾; ihm war das Buch seines Lehrers *περὶ σφρυγμῶν* gewidmet. Von seinen Schriften sind zwei dem Titel nach bekannt: ein *Ἱατρός*⁶⁾ und ein umfangliches Werk *περὶ βοηθημάτων*⁷⁾, von dem mehrere Teile angeführt werden: *περὶ κενουμένων βοηθημάτων*⁸⁾, *περὶ ποιουμένων βοηθημάτων*⁹⁾ und *περὶ τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων*¹⁰⁾. Er war

(XIII 786) oder *βίβλοι φαρμακίδες* (XIV 103), wie der von ihm benutzte Heras aus Cappadocien. Von diesem Werke hat Galen ebenfalls umfangliche Bruchstücke erhalten. Von Simon Sepp, a. a. O. 121, wird er zum Freunde des Herodot gestempelt auf Grund von Gal. XIII 788 f.; daß diese Stelle weiter nichts besagt als daß Kriton ihm das Hikesiosrecept entnommen, beweist Aet. XV 13. Archigenes benutzte den Herodot ebenfalls schon: Orib. IV 587, 6. Aet. X 29.

¹⁾ Zeller, Ph. d. Gr. III² p. 6. ²⁾ Simon Sepp, a. a. O. 120.

³⁾ Gal. XI 432: *ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτοις ἔτι καὶ κεῖνο εἵποιμ' ἂν, ὥς Ἡρόδοτος μὲν ἀπάσας τὰς ἄλλας αἰρέσεις μοχθηρὰς ὑπολαμβάνων πλὴν τῆς πνευματικῆς κτλ.* ⁴⁾ Gal. VIII 630. ⁵⁾ Gal. VIII 751.

⁶⁾ Gal. XVII A 999. Ihn für den Verfasser des unter Galens Namen erhaltenen *Ἱατρός* zu halten, liegt kein Grund vor; der Verfasser desselben gehört einer späteren Zeit an.

⁷⁾ Über die Anlage solcher Werke vgl. Gal. XVI 315. Stobäus Floril. III 263 M.

⁸⁾ In diesem Teile seines Werkes handelte er u. a. über die Frage, zu welcher Zeit des Fiebers der Aderlaß anzuwenden ist (Orib. II 42, von Gal. XVI 134 benutzt aus Antyll), über die Wirkung der Schröpfköpfe (Orib. II 62), über den Gebrauch des Helleboros (Orib. II 163).

⁹⁾ Orib. I 496 f. Dieser Abschnitt behandelte die von Asklepiades eingeführten Friktionen.

¹⁰⁾ Orib. II 419. 461. Dies Buch handelte von den Bädern (Orib. II 386), den Sandbädern (II 403), den Sonnenbädern (II 407), den Meerwasserbädern (II 466), den Ölbädern (II 461. 468), den Mineralwassern (II 386) u. s. w.

wie sein Lehrer Eklektiker. Von seinem Eklekticismus zeugen die von ihm erhaltenen Bruchstücke: die Grundlage seines Systems bildet die pneumatische Lehre von der Qualitätenmischung¹⁾, er giebt genaue Vorschriften, um das Übermaß einer Qualität zu bekämpfen²⁾, er rechnet mit dem Einfluß, den Geschlecht, Lebensalter und Jahreszeit auf den menschlichen Körper ausüben³⁾. Andererseits treten uns in seinen Lehren ganz unverkennbare Spuren methodischer Doktrin entgegen: er nahm auf die methodische Lehre von den *κοινότητες* Rücksicht⁴⁾, er ist Anhänger der von Thessalos zur Beurteilung des Verlaufs einer Krankheit aufgebrachten Theorie von der *διάκριτος*⁵⁾, er wandte bei chronischem Fieber ein der Metasynkrise verwandtes Verfahren⁶⁾ an und suchte wie Thessalos⁷⁾ die Metasynkrise durch passive Bewegung und Friktionen herbeizuführen⁸⁾. Sogar in seiner Terminologie sind methodische Anklänge nachweisbar: der von Asklepiades geprägte Kunstaussdruck der *ἐνστάσεις*, der die durch Verstopfung der Poren entstandenen Krankheiten bezeichnet⁹⁾, kehrt bei ihm wieder¹⁰⁾, ebenso der von den Methodikern zur Bezeichnung der Centralorgane des menschlichen Körpers aufgebrachte Ausdruck *τὰ μέσα*¹¹⁾.

Die Zugehörigkeit des Leonidas aus Alexandreia¹²⁾ zu dieser Schule beweist der Umstand, daß er von Galen und Soran¹³⁾ als Episynthetiker bezeichnet wird. Da er vor Soran, d. h. im Ausgange des 1. Jahrh. n. Chr. lebte, so scheint er Schüler des Agathinos, des Begründers der episynthetischen Schule¹⁴⁾, gewesen zu sein. Er war fast ausschließlich Chirurg. Die von Aetius und Paulus Aegineta erhaltenen Bruchstücke¹⁵⁾ zeugen von genauer

1) Orib. I 407. 2) Aet. IV 45. 47. 3) Orib., a. a. O. und öfter.

4) Orib. I 406. 5) Gal. X 264. Orib. I 413. 6) Orib. I 500.

7) Gal. X 250. 8) Orib. I 496. 519.

9) Daremberg zu Orib. I 418, 12. 646, 26.

10) Orib. I 418.

11) Orib. I 407. 497.

12) Gal. XIV 684. Er gehörte zu den berühmtesten Ärzten des Altertums: Cramer A. P. IV 196, 1 f., wo an vorletzter Stelle *Λεωνίδης* für *Λιονίδης* zu lesen ist.

13) Cael. Aur. A. M. II 1.

14) Gal. XIX 353.

15) Aet. VI 1 = Antyll bei Orib. IV 200. Paul. Aeg. VI 3. Aet. X 30. XIV 8. 9. 11. 13. 14. 21. 22. 23. 50. 85. XV 5. 7. 8. XVI 40. 43 f. 50. Paul. Aeg. VI 32. 44. 64. 67. 69. 78. 79. 84. schol. Orib. III 588. Die aus Leonidas stammende Partie bei Oribasius steht III 631, 2—9 in einem aus Antyll entlehnten Kapitel. Vgl. Paul. Aeg. VI 78.

Kenntnis der schwierigsten chirurgischen Operationen. Er knüpfte dabei an die großartigen Erfindungen der alexandrinischen Chirurgen des 1. Jahrh. v. Chr. an, deren Kenntnis uns Celsus übermitteln hat, und ist die Hauptquelle für die Chirurgen der pneumatischen Schule, für Heliodor¹⁾, Archigenes²⁾ und Antyll³⁾. Sein chirurgisches Werk war vermutlich wie das der andern Chirurgen seiner Zeit *Χειρουργούμενα* betitelt.

5.

Apollonios aus Pergamon. Heliodor.

Apollonios aus Pergamon lebte sicher vor Antyll (c. 150 n. Chr.)⁴⁾, der ihn bereits in seiner Schrift *περὶ βοηθημάτων* benutzt hat. Die Vorschriften, die er über den Aderlaß giebt⁵⁾, beweisen, daß er auf dem Boden der pneumatischen Schule stand. Das wichtigste Axiom der Pneumatiker, daß Krankheit und Gesundheit durch das Verhalten des *πνεῦμα* bedingt ist, findet in seinen Bruchstücken volle Beachtung: so widerrät er häufige Anwendung des Aderlasses mit der Begründung, daß mit dem Blut zuviel *πνεῦμα ζωτικόν* dem Körper entführt werde⁶⁾; andererseits hält er es für schädlich, wenn die Gefäße und Eingeweide zum Platzen voll und zu sehr gespannt sind, weil das *φυσικόν πνεῦμα* in diesem Falle nur schwer den Körper durchdringen könne⁷⁾. Das einzige Persönliche, das wir von ihm erfahren, ist die Notiz des Oribasius, daß, als zu seiner Zeit Asien von einer Pest heimgesucht und er selbst von der Krankheit befallen wurde, er sich durch Scarifikation das Leben rettete⁸⁾.

¹⁾ Orib. IV 3 ff. = Paul. Aeg. VI 36. Quelle ist Antyll, der aus Heliodor schöpft. Mit diesem Bericht deckt sich wieder in vielen Punkten Leonidas bei Aetius XV 7. 8. Vgl. schol. Orib. IV 527, 25 (Heliodor) = Leonidas bei Aet. XV 5.

²⁾ Aet. X 30. XVI 43.

³⁾ Vgl. Anm. 15, S. 15.

⁴⁾ Orib. II 64—68. Daß der an dieser Stelle citierte Apollonios identisch ist mit dem Pergamener, folgt aus Orib. V 575 = V 20. 21. 814. 815. Vgl. V 418 = VI 413. Seine Benutzung durch Antyll folgt aus der Vergleichung von Orib. II 64 mit Gal. XI 322. XVI 95. Mit dem Landwirt gleichen Namens, der ebenfalls aus Pergamon stammte (Plin. Ind. I 8. 10. 14. 16—18. Varro, r. r. I 1, 8. Col. I 1, 9) hat er nichts zu thun.

⁵⁾ Orib. II 64.

⁶⁾ Orib. II 65.

⁷⁾ Orib. II 66.

⁸⁾ Orib. II 68.

Ungefähr in derselben Zeit wie Archigenes lebte Heliodor¹⁾. Dafs er dieser Schule zugehört, folgt daraus, dafs er den Leonidas benützte und wieder von Antyll, der gleichfalls Pneumatiker war, in seiner Chirurgie in umfänglicher Weise²⁾ benützt ist. Er war als Chirurg berühmt und verfafste eine Schrift *Χειρουργούμενα* in fünf Büchern³⁾ und ein *μονόβιβλον περὶ ἐπιδέσμων*⁴⁾ das die Hauptquelle für das 48. Buch der Compilation des Oribasius ist⁵⁾.

¹⁾ Juv. sat. VI 373 und das Scholion.

²⁾ Orib. III 615 und öfter.

³⁾ Seine Chirurgie läfst sich zum grofsen Teil aus Oribasius mit Hilfe der Scholien rekonstruieren. In das 1. Buch gehören folgende Kapitel: *περὶ στεατωμάτων* (Orib. IV 526, 6), *περὶ σκληρώματος* (Orib. IV 13, 11 = IV 527, 11), *περὶ γαγγλίου* (Orib. IV 15, 11 = IV 527, 16), *περὶ τερηδονισμοῦ κρανίου* (Orib. IV 187, 14 = IV 533, 32), vermutlich auch *περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων* (Orib. IV 147, 9), *περὶ τοῦ ἐπὶ μεγάλῳ τραύματι ἐπὶ πλεῖον ἐψιλωμένου ὀστέου* (Orib. IV 153, 4 = IV 531, 6) und *περὶ τῆς τῶν σωμάτων ἀναστολῆς* (Orib. IV 154, 6 = IV 531, 7). In das 2. Buch folgende: *περὶ φλεγμονῆς διαφράγματος τῶν μυξωτήρων* (Orib. III 590, 1 = III 686, 15), *περὶ τῆς ἐν τοῖς παρισθμίσι φλεγμονῆς* (Orib. III 590, 7 = III 686, 17), *περὶ τῶν ἐν οὐλῳ συρίγγων* (Orib. III 627, 2 = 688, 8), *περὶ στεατωμάτων, μελικηρίδων, πώρων, τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις ἀθηρωμάτων* (Orib. IV 10, 11 = IV 527, 8). In das 3. Buch folgende: *περὶ φλεγμονῆς καὶ τοπικῶν ἀποστημάτων* (Orib. III 572, 12 = III 686, 1), *τίνες τῶν ἀφισταμένων τόπων ὑποπίπτουσι χειρουργίᾳ καὶ τίνες διαίτη καὶ φαρμακείᾳ* (Orib. III 577, 1 = III 686, 5), *τῶν ἐν μεσοπλευρίῳ ἀποστημάτων χειρουργία* (Orib. III 579, 1 = III 686, 7), *περὶ τῶν κατὰ τοὺς βουβῶνας ἀποστημάτων* (Orib. III 687, 12), *περὶ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν παθῶν* (Orib. III 621, 3 = III 688, 5), *περὶ τῶν γιγνομένων κατὰ τοὺς δακτύλους* (Orib. III 633, 5 = III 688, 14. Vgl. IV 249, 8 = IV 537, 1), *περὶ τῶν κατ' ἀγκῶνα παθῶν* (Orib. IV 10, 4 = IV 527, 6), *περὶ χοιράδων* (Orib. IV 527, 25). In das 4. Buch folgende: *περὶ τῶν ἐν τῇ ἔδρᾳ ῥαγάδων καὶ κονδυλωμάτων* (Orib. III 573, 13 = III 686, 3), *περὶ τῶν ἔδρᾳ συρίγγων* (Orib. III 627, 6 = III 688, 10), *περὶ τοῦ σκληρώματος τοῦ ἐν τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως* (Orib. IV 14, 6 = IV 527, 13), *περὶ ὑποσπαδιαίας* (Orib. IV 463, 13 = IV 540, 15), *περὶ σύσσωρ-κωθείσης οὐρήθρας* (Orib. IV 472, 1 = IV 540, 22) und die folgenden Kapitel. In das 5. Buch: *περὶ τῆς τοῦ ὀσχεοῦ φλεγμονῆς* (Orib. III 590, 11 = III 686, 19. Vgl. 633, 14 = 688, 16), *περὶ τῶν ἐν ὀσχεῳ κισσῶν* (Orib. IV 44, 1 = IV 528, 7). Das letzte Kapitel war betitelt: *περὶ ἀκρωτηριασμοῦ* (Orib. IV 247, 12 = 536, 28). Er benützte in dieser Schrift ausser Leonidas den Archibios und Menodoros (Orib. IV 161).

⁴⁾ Orib. IV 281, 10. schol. IV 537, 12.

⁵⁾ Schol. Orib. a. a. O. Darnach stammen Orib. B. XLVIII c. 20—70 (IV 281—332) aus ihm.

6.

Archigenes.

Der bedeutendste Anhänger der pneumatischen Schule ist ohne Frage Archigenes aus Apamea in Syrien¹⁾. Er ist der einzige Pneumatiker, der bei Suidas eine vita hat, die leider nur wenig Detail enthält: darnach hiefs sein Vater Philippos²⁾, sein Lehrer Agathinos;

¹⁾ Suid. s. v. Gal. XIV 684. Cramer A. P. IV 196. Vgl. Harles, *Analecta historico — critica de Archigene medico et de Apolloniis medicis*. Lipsiae 1816. 1 ff.

²⁾ Vielleicht war er der Arzt Philippos, der des öfteren von Galen mit Archigenes zusammen erwähnt wird und dessen Verdienste um die Arzneimittellehre von ihm gerühmt werden (Gal. XIII 14. 502. 642). Mehrere Mittel von ihm hat Asklepiades *ὁ Φαρμακίων* (Ende des 1. Jahrh. n. Chr.) erhalten: gegen Ruhr und Blutspucken (Gal. XIII 88), gegen Schwindsucht und innere Geschwüre (105), gegen chronische Ruhr (304). Vgl. XII 735. Möglich, daß er der Philippos *ὁ Μακεδών* ist, von dem Galen ein Gegengift *ἀμβροσία* kennt (XIV 149). Er hatte auch pathologisches Interesse: so handelte er über die Starrsucht, deren Symptome er genau beschrieb (Cael. Aur. A. M. II 10. Gal. XVI 684. XVII A 640, der ihn wieder mit Archigenes zusammen nennt). Ein zweiter Träger des Namens Philippos war ein Zeitgenosse des Galen (XIX 16), gehörte der Schule der Empiriker an und war ein so eingefleischter Anhänger dieser Schule, daß er in einem Disput mit dem Arzte Pelops, dem Lehrer des Galen in Smyrna, die Behauptung vertrat, daß die Medizin allein mit der Erfahrung auskommen könne. Dieser Disput war der Gegenstand einer dem Galen bekannten Schrift: *περὶ τῆς ἰατρικῆς ἐμπειρίας* (Gal. XIX 16). Im Alter von vierzig Jahren verfaßte er eine Schrift über die Frage, wie man dem Menschen ewig die Jugend erhalten könne. (Gal. VII 670. VI 399). Galen bekämpft an erster Stelle diese Behauptung ohne Nennung ihres Vertreters: der Name des Philipp stand bei Aet. IV 106, der diese Stelle excerpiert hat: *ὡς εἶγε δυνατόν ἦν αἰεὶ διαφυλάττειν ὑγρὰν τὴν κράσιν τοῦ σώματος, ὃ τοῦ σοφιστοῦ Φιλίππου λόγος, ἀθάνατον ἐπαγγειλάμενος ποιήσειν τὸν αὐτῷ πειθόμενον ἀληθῆς ἂν εἴη*. Infolge der Polemik gegen ihn verfaßte Philippos eine zweite Schrift *περὶ τῆς θαυμαστῆς ἀγηρασίας*, in der er seine Ansicht dahin änderte, daß nur derjenige in ewiger Jugend erhalten werden könne, bei dem durch die Erziehung die richtige Grundlage gelegt sei (VII 671). Endlich gab es einen Pneumatiker Philippos, der eine Schrift über die Abzehrung verfaßt hat, die den Galen zur Abfassung seiner Schrift *περὶ μαρασμοῦ* (VII 667) veranlafte. In dieser Schrift hatte er über die Entstehung dieser Krankheit, ihre verschiedenen Arten und die Diagnose derselben eingehend gehandelt, die Therapie dagegen unberücksichtigt gelassen (VII 689). Ein Arzt Philippos wird von Plin. Ind. 29. 30 citiert. Vgl. Juv. XIII 125.

ferner erfahren wir, daß er 63 Jahre alt wurde, unter Trajan in Rom lebte und *πολλὰ ἰατρικὰ τε καὶ φυσικὰ* schrieb. Er war ebenfalls Eklektiker¹⁾ und einer der fruchtbarsten medizinischen Schriftsteller. Obgleich seine Werke, insbesondere seine Schrift *περὶ συνγμῶν* nicht frei von Vulgarismen waren, weshalb der Atticist Galen ihn des öfteren tadelt²⁾, standen sie doch bei der Nachwelt in höchstem Ansehen. Antyll³⁾, Soran⁴⁾, Galen, Philumenos⁵⁾, Philagrios⁶⁾, Alexander von Tralles⁷⁾ und aus diesen wieder Oribasius, Aetius, Paulus von Aegina haben ihn häufig benützt. Alexander von Tralles⁸⁾ nennt ihn *ὁ θειότατος* und Galen, der seine Schriften genau kannte, hat die hohen Verdienste dieses Arztes anerkannt⁹⁾: „er war, um seine Worte zu gebrauchen, wie kaum ein anderer bemüht, die Arzneiwissenschaft von Grund aus zu durchforschen und hat viele bedeutende Schriften hinterlassen. Freilich hat er nicht in allem, was er überliefert, das Richtige getroffen, ebensowenig wie seine Vorgänger; er war ja ein Mensch, und es ist deshalb schwerlich anzunehmen, daß er sich nicht in manchen Dingen geirrt haben sollte; er hat manches nicht gekannt, anderes unrichtig gedeutet, anderes wieder nur oberflächlich beschrieben“. Bezeichnend ist es, daß Galen das Lob des Archigenes durch den Hinweis auf seine Abhängigkeit von den Vorgängern wieder einschränkt.

Von seinen Schriften sind uns folgende dem Titel nach bekannt: *περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων*¹⁰⁾, *περὶ πυρετῶν σημειώ-*

1) Gal. XIV 684. Er heißt deshalb bald Empiriker (Gal. XII 469), bald Methodiker (Cael. Aur. A. M. II 10). Nach Cramer A. P. IV 404 war er auch als Arzt der *castra praetoriana* tätig (*Α. ὁ στρατόπεδον θεραπεύων*).

2) Gal. VIII 578. 932.

3) Aet. III 167 = Orib. II 383. Aet. III 180 = Orib. II 409. Aet. III 181 = Orib. II 410.

4) Cael. Aur. A. M. II 10.

5) Aet. IX 3. Orib. IV 65 (Philumenos = Archigenes bei Aet. XIII 120 ff.

6) Aet. XI 4.

7) Alex. v. Tralles (Puschm.) I 556. 560. 562. 566; II 154. 264.

8) Alex. v. Tr. II 265. 72. Gal. XII 534f.

9) Gal. XII 534f.

10) Gal. XII 533f. Dieses Werk, das zwei Bücher umfaßte (Gal. XIII 217), gehörte zu den berühmtesten Heilmittellehren des Altertums. Es ist von Galen in seinen beiden pharmakologischen Schriften *περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους* und *τῶν κατὰ γένη* so stark benützt, daß es sich zum großen Teil rekonstruieren läßt. Galen wirft ihm allerdings des öfteren vor,

σεως¹⁾, περὶ τόπων πεπονθότων²⁾, περὶ τύπων³⁾, περὶ τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρῶν⁴⁾, περὶ σφυγμῶν⁵⁾, τῶν ὀξέων καὶ χρονίων παθολογικῶν⁶⁾, θεραπευτικὰ τῶν ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν⁷⁾, σύνοψις τῶν χειρουργουμένων⁸⁾, περὶ καστορίου χρήσεως⁹⁾, ἐπιστολαί¹⁰⁾, vermutlich auch περὶ βοηθημα-

dafs ihm die ἀκριβεία τῶν ὀρισμῶν, d. h. genauere Angaben über den Gebrauch der Mittel gefehlt haben (Gal. XII 514. 969. 1002). Selbst die Haarfärbemittel fanden in dieser Schrift gebührende Beachtung. Es wäre unrecht, daraus einem sonst verständigen Arzte wie Archigenes einen Vorwurf zu machen, da die Damen der vornehmsten Kreise (βασιλικαὶ γυναῖκες) darnach verlangten (Gal. XII 443). Er gehörte wie Kriton zu den galanten Modeärzten (vgl. Iuv. VI 236) jener Zeit.

1) Gal. IX 668f. Von dieser Schrift, die in 10 Büchern die Fieberlehre der pneumatischen Schule behandelte, gab es auch eine Epitome (669).

2) Diese Schrift war eine örtliche Pathologie und bestand aus drei Büchern (Gal. IX 670). Galen rühmt sie als die beste auf diesem Gebiet; durch sie ist er zur Abfassung seiner Schrift περὶ τῶν πεπονθότων τόπων angeregt worden (VIII 1 ff.).

3) Gal. IX 672. Galens Schriften περὶ τύπων (VII 463) und πρὸς τοὺς περὶ τύπων γράψαντας ἢ περὶ περιόδων (VII 475) verdanken ihre Entstehung dieser Schrift des Archigenes. Vgl. Gal. IX 672: ἴσως μὲν γὰρ καὶ ἡμεῖς εἰς τοὺς αὐτοὺς ποτε τύπους γράψομεν, ἵνα τὰ τε προσεξευρημένα διέλθωμεν ἀφέλωμέν τε τινα τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους οὐκ ὀρθῶς εἰρημένων ἀπαντὰ τε σαφῶς ἐρμηνεύσωμεν.

4) Dieses Werk, das aus zwei Büchern bestand (Gal. VII 461), ist von Galen in seiner gleichbetitelten Schrift (VII 406 f.) ebenfalls benützt.

5) Gal. VIII 754. Über diese Schrift wird später ausführlich gehandelt werden.

6) Gal. VIII 203. Die Schrift bestand vermutlich aus 4 Büchern.

7) Orib. II 146.

8) Vgl. Orib. III 646 mit dem dazu gehörigen Scholion III 689, 9: ἀπὸ τοῦ α' βιβλίου τῆς συνόψεως τῶν χειρουργουμένων, μετὰ τὸ ἡμισυ τοῦ βιβλίου, κεφάλαια τοῦ ὁμοίου. Im ersten Buch dieser Schrift handelte er περὶ γαγγραινῶν (Orib., a. a. O.), περὶ ὑποδραμόντος αἵματος (Orib. IV 193, 4 = IV 534, 1), περὶ ὑπερσαρκώσεως (Orib. IV 195, 9. 197, 10. schol. IV 534, 5), περὶ τῶν ἀφαιρεθησομένων μερῶν (Orib. IV 244, 9. schol. IV 536, 44), περὶ λοιμικῶν ἐλκῶν (Orib. IV 517, 8. schol. IV 541, 10).

9) Gal. XII 337. Möglich ist aber auch, dafs dies Buch ein Teil eines gröfseren Werkes gewesen ist.

10) Gal. VIII 150: βιβλίων ἐπιστολικῶν ἑνδεκα. In diesen 11 Büchern hat er Freunden ärztliche Ratschläge erteilt in Briefform. Das erste Buch enthielt einen Brief an Marsus, in dem er über Wiederherstellung des verlorenen Gedächtnisses handelte. Galen (VIII 150f.) hat daraus ein längeres Excerpt

των¹⁾), endlich *περὶ ἰοβόλων θηρίων καὶ δηλητηρίων φαρμάκων*²⁾).

erhalten. Ein zweiter an denselben Marsus gerichteter Brief handelte über Melancholie (Aet. III 114; vgl. Gal. XIII 129). Ein Brief *πρὸς Ἀρίστωνα* enthielt eine Beschreibung der Iberis nach Damokrates: Aet. III 184; vgl. Aet. XII 2 (aus Archigenes), Gal. XIII 349. 353. Endlich wird von Paulus von Aegina III 45 ein Brief an einen Atticus erwähnt.

¹⁾ Der Titel ist allerdings nirgends überliefert. In dem Abschnitt *περὶ τῶν ἔξωθεν προσφερομένων* handelte er über Bäder (Aet. III 167 = Orib. II 383), über das Ausziehen der Haare mittels der Pechmütze (*περὶ δρωπάκων* Aet. III 180 = Orib. II 409), über Sinapismus (Aet. III 181 = Orib. II 410), außerdem weise ich dieser Schrift zu Orib. II 202: *περὶ ἐμέτου ἀπὸ σιτίων* und Orib. II 270: *καθαυτήρια ἐπὶ πυρεπτόντων*, vermutlich dem Abschnitt *περὶ κενουμένων βοηθημάτων*.

²⁾ Erwin Rohde, Aelius Promotus. Rh. Mus. 28, 264.

I. Teil.

QUELLEN FÜR DAS SYSTEM DER PNEUMATISCHEN SCHULE.

1. Aretaios.

Eine der wichtigsten Quellen für unsere Kenntnis der Theorien der pneumatischen Schule, insbesondere ihrer Pathologie und Therapie sind die beiden Schriften des Kappadokiers Aretaios *περὶ αἰτιῶν καὶ σημείων ὀξέων καὶ χρόνιων παθῶν* in vier Büchern und eben so viele *περὶ θεραπειᾶς ὀξέων καὶ χρόνιων παθῶν*. Der geniale Verfasser der einzigen wissenschaftlichen Geschichte der Arzneikunde, Kurt Sprengel¹⁾, hat richtig erkannt, daß der Verfasser ein Anhänger der eklektisch pneumatischen Schule gewesen und daß er „in aller Rücksicht mit Archigenes in eine Klasse zu setzen sei.“ Heutzutage erfreut er sich bei den modernen Ärzten und Litterarhistorikern großen Ansehens: fast einstimmig wird die hohe Naturwahrheit seiner Krankheitsbilder, die schlichte Einfachheit seiner Darstellung, seine reiche Erfahrung und die strenge, bis ins kleinste gehende Berücksichtigung der Diät in seiner Therapie gerühmt. Das sind in der That Vorzüge, die Niemand verkennen wird. Merkwürdig ist nur, daß die Hochschätzung der Modernen in krassem Widerspruch steht zu dem Ansehen, das er im Altertum genoß. Trotzdem seine Schriftstellerei sich über die verschiedensten Gebiete der Medicin erstreckte — außer den beiden erhaltenen Schriften schrieb er *περὶ πυρετῶν*²⁾, *περὶ γυναικείων*³⁾, *χειρουργίαι*⁴⁾, über

¹⁾ Geschichte der Arzneikunde II^s 114f. Nach ihm Locher, Aretaios aus Kappadocien, Zürich 1847.

²⁾ Aret. ed. Kühn 185.

³⁾ Aret. 209.

⁴⁾ Aret. 295.

Pharmakologie¹⁾ und *περὶ φυλακτικῶν*²⁾ — wird er doch nur von wenigen Ärzten citiert. Er teilt darin das Schicksal eines ihm geistesverwandten Schriftstellers, des Nicander. Abgesehen von Pseudodioskorides, der von ihm ein Mittel gegen Nierenkrankheit erwähnt³⁾ kennt seine Hauptschrift nur noch Philagrios⁴⁾, während seine beiden Schriften *περὶ πυρετῶν* und *περὶ φυλακτικῶν* einzig und allein von dem Verfasser der unter dem Namen des Alexander von Aphrodisias erhaltenen Schrift *περὶ πυρετῶν* benützt sind. Wie ist diese auffallende Thatsache zu erklären? Diese Frage, die von den Modernen gar nicht aufgeworfen worden ist, läßt sich in befriedigender Weise damit beantworten, daß Aretaios kein selbständiger Schriftsteller ist, sondern daß er seine pathologisch-therapeutischen Theorien dem großen Meister seiner Schule, dem Archigenes von Apamea verdankt. Der Beweis dafür kann mit Hilfe der bei Aetius zahlreich erhaltenen Excerpte dieses Arztes erbracht werden. Der Hauptwert des Aretaios liegt in dem tollen Ionisch, das er schreibt: er will weiter nichts als Stilist sein, und darin liegt ein weiterer Grund, weshalb er von einem leidlich verständigen Arzte verschmäht wurde.

In den Krankheiten, deren genaue Beschreibung und therapeutische Behandlung das Verdienst der nachchristlichen Ärzte ist, gehört die Elephantiasis, eine Art Aussatz, die vornehmlich in Ägypten verbreitet⁵⁾, in Italien aber noch zur Zeit des Celsus⁶⁾ ziemlich unbekannt war. Die erste Erwähnung derselben findet sich bei einem Arzte des 3. Jhds. v. Chr., bei dem Erasistrateer Straton⁷⁾, der richtig das Wesen derselben in der schlechten Beschaffenheit des Blutes erkannte und sie deshalb *κακοχυμία* nannte. Aber Gegenstand sorgfältiger Behandlung ist sie erst seit der Zeit des Asklepiades geworden⁸⁾. Sein Schüler Themison ist für uns der

¹⁾ Aret. 213. 254.

²⁾ Alexander Aphrod. in Ideler's phys. et med. gr. minores I 97.

³⁾ Dioscorides ed. C. Sprengel II 34.

⁴⁾ Bei Aetius VIII c. 47. XI c. 1. Paul. Aeg. IV c. 1.

⁵⁾ Gal. XI 141.

⁶⁾ Cels. III 25, 116 D. Plin. XXVI 7.

⁷⁾ Rufus in seinem *παθολογικὸν τῶν χρόνιων* citierte ihn nach Orib. IV 63, 4.

⁸⁾ Plut. quaest. conv. VIII 9 c. 1, 2. Plin. a. a. O.

erste, der sie in seiner Therapie behandelt hat¹⁾. Ungefähr in dieselbe Zeit mag die auf den Namen des Democrit gefälschte Schrift *περὶ ἐλεφαντιάσεως* gehören, in der als Ursache derselben nach dem Vorgange des Straton die schlechte Beschaffenheit des Blutes bezeichnet und als Mittel der Aderlaßs und das Decoct einer in Syrien und Cilicien wachsenden nicht genauer bestimmten Pflanze empfohlen wurde²⁾. Seit dieser Zeit fehlt die Behandlung dieser Krankheit in keinem therapeutischen Werke, von Celsus³⁾,

1) Cael. Aur. M. Ch. IV 1. Im 2. Buch seiner Briefe empfahl er gegen diese Krankheit: Aderlaßs, Brechmittel auf nüchternen Magen, Abführmittel, besonders den Helleborus, Reibungen des Körpers mit einer Salbe aus *μυροβάλανον* mit Essig, Rosenöl, Myrrhenöl, Tropfen von Ammoniakharz mit Alaun. Ferner ließ er die Kranken zweimal am Tage kalt baden in einer Abkochung von Rebhühnerkraut oder Wegerich oder Myrten oder Brombeeren, verordnete *ψίλωθρον* zur Glättung der Haut, ferner Cataplasmata, erweichende Umschläge, Rubefacientia und das Pflaster des Archagathos (Cels. V, 19, 27 p. 176 D. Orib. VI 201). Als Nahrung schrieb er leicht verdauliche Speisen und Wasser vor; außerdem empfahl er körperliche Bewegung und darnach Schwitzbäder, dagegen verbot er das Salben des Körpers, weshalb er von Philumenos-Archigenes bei Orib. IV 73 angegriffen wird.

2) Cael. Aur. M. Ch. IV 1. Rufus bei Orib. IV 63. R. Fuchs, *anecdota medica graeca*, Rh. Mus. XLIX 557. Das von ihm edierte Anecdoton führte den Titel *διάγνωσις περὶ τῶν ὀξέων καὶ χρόνιων νοσημάτων*. Kennt der Verf. wohl den Caelius Aurelianus?

3) Cels. III 25, 116 D. Seine Kenntniss von den Krankheitserscheinungen ist im Verhältniss zu derjenigen der späteren Ärzte noch gering: als charakteristische Symptome bezeichnet er die Geschwulste und Flecken, welche die Körperoberfläche bedecken und anfangs rötlich, später schwarz erscheinen, ferner die Risse in der Haut, das Anschwellen des Gesichts und der Füße unter gleichzeitigem Abmagern des Körpers, das Umsichgreifen der Geschwüre an den Fingern und Zehen, endlich das Fieber. Seine Behandlung ist im Wesentlichen dieselbe wie die des Themison. Die Beschreibung der Krankheit berührt sich mit Plin. XXVI 7; diese Berührung ist derart, daß meiner Ansicht nach eine gemeinsame Quelle zu statuieren ist. Eine Gegenüberstellung beider Berichte wird jeden Unbefangenen davon überzeugen:

Cels. III 25, 116, 15.

Ignotus autem paene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἐλεφαντίασιν Graeci vocant isque longis annumeratur. Totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitiari dicantur. Summa pars

Plin. XXVI 7.

Diximus elephantiasim ante Pompei Magni aetatem non accidisse in Italia, et ipsam a facie saepius incipientem, in nare prima veluti lenticula, mox inarescente per totum corpus maculosa variis coloribus et inaequali cute, alibi

Rufus¹⁾, Archigenes²⁾, Soran³⁾, Galen⁴⁾, Philumenos⁵⁾ an bis auf die späteren Compileren.

Die Elephantiasis galt im Altertum für sehr gefährlich und hatte verschiedene Namen, die ihr Wesen nach verschiedenen Seiten

corporis crebras maculas crebrosque tumores habet; rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur; summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur; corpus emacrescit; os, surae, pedes intumescunt: ubi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur, febricula oritur, quae facile tot malis obrutum hominem consumit.

crassa, alibi tenui, dura alibi ceu scabie aspera, ad postremum vero nigrescente et ad ossa carnes adprimente, intumescantibus digitis in pedibus manibusque

Dasselbe gilt für die bei Plinius unmittelbar vorhergehende Beschreibung des Carbunkel (§ 6):

Cels. V, 28, 205:

Plin. a. a. O.

Eius (sc. carbunculi) hae notae sunt: rubor est superque eum non nimium pusulae eminent, maxime nigrae, interdum sublividae aut pallidae somnus urget; nonnumquam horror aut febris oritur aut utrumque circumque exiguae pusulae oriuntur: et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit.

Nascitur in occultissimis corporum partibus et plerumque sub lingua duritia rubens vari modo, sed capite nigricans, alias livida, in corpus intendens neque intumescens, sine dolore, sine pruritu, sine alio quam somni indicio, quo gravatos in triduo aufert, aliquando et horrorem adferens circaque pusulas parvas, rarius febrem, stomachum faucesque cum invasit, ocissime exanimans.

Plinius hat seine Angaben über den Carbunkel und die Elephantiasis höchst wahrscheinlich aus Varro. Ich schliesse es aus dem Varrociat (§ 14) in dem unmittelbar folgenden sich ebenfalls mit Celsus (prooem. I 2, 14. D. I 3 p. 18, 24) berührenden kurzen Überblick über die Entwicklung der Medicin. Simon Sepp a. a. O. 56 ist anderer Meinung. Die dritte von ihm zum Beweis für die Benutzung des Celsus durch ihn angeführte Stelle: Plin. n. h. XXXI 38 = Cels. II 18 p. 66, 28 geht sicher auf Varro zurück. Vgl. Rusch, De Posidonio Lucreti Cari auctore, Greifswalder Dissert. 1883 p. 38. Die Quellschrift des Celsus wäre darnach das 8. Buch der Encyclopädie des Varro. Diese Frage bedarf einer Specialuntersuchung.

¹⁾ Er behandelte diese Krankheit in seinem παθογνωμονικὸν τῶν ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν: Orib. IV 63 und das schol. IV 529, 13.

²⁾ Aet. XIII 120f.

³⁾ Cael. Aur. a. a. O.

⁴⁾ Gal. XI 140f. u. öfter.

⁵⁾ Orib. IV 65 ff.

charakterisierten: Leontiasis¹⁾, weil bei dem an Elephantiasis Erkrankten ähnlich wie beim ergrimmtten Löwen die Haut oberhalb der Augen (das ἐπισκύνιον) stark herabgezogen und dadurch die Augen verdeckt werden. Satyriasis²⁾ wegen der Ähnlichkeit des Gesichts eines solchen Kranken mit dem eines Satyrn oder wegen des durch diese Krankheit hervorgerufenen satyrhaften Triebes nach Geschlechtsgegnuß, endlich Krankheit des Herakles wegen ihrer furchtbar vernichtenden Macht³⁾.

Nach Aretaios ist die Krankheit schrecklich anzusehen und deshalb so gefährlich, weil sie dieselbe Ursache hat wie der Tod, nämlich Erstarrung der eingepflanzten Wärme, und weil sie in ihrem Anfangsstadium schwer zu erkennen ist, da sie auf der Oberfläche des Körpers erst im vorgerückten Stadium erscheint, wenn das Innere des Menschen schon von ihr zerfressen ist. Vortrefflich ist seine Beschreibung der Symptome: Trägheit, Schläfrigkeit, Hartleibigkeit, übelriechender Atem, dicke, schlammige, schaumige Beschaffenheit des Urins, Erschlaffung der Verdauungsorgane, zahlreiche dicke Geschwulste an verschiedenen Stellen des Körpers derart, daß der Zwischenraum zwischen den einzelnen Stellen birst und Risse bekommt, Ausfallen der Haare, frühzeitiges Ergrauen und Kahlwerden, tiefe Risse in der Kopfhaut, Nachlassen des Pulses, Anschwellung der Venen an den Schläfen und unter der Zunge, hagelkornartige Knötchen auf der Zunge, flechtenartiger Ausschlag an den Extremitäten, Röte und Anschwellung der Wangen, Trübung und metallene Färbung der Augen, übelriechende Geschwüre an Wangen, Kinn, Fingern und Knieen, Absterben und Abfallen einzelner Körperteile, unnatürliche Geilheit, völlige Apathie, Schwere in den Gliedern und endlich Erstickungsanfälle.

Vergleicht man diese Beschreibung des Aretaios mit der von Aetius (XIII 120) erhaltenen Beschreibung des Archigenes, so muß die fast wörtliche Übereinstimmung jedem in die Augen springen: dieselbe Erklärung der verschiedenen Namen, dieselbe Begründung ihrer furchtbaren Gefahr, endlich dieselbe Reihenfolge in der Be-

¹⁾ Rufus a. a. O. kennt dieselben Namen, giebt aber eine etwas verschiedene Erklärung. Vgl. Pseudogalen εἰσαγωγή XIV 757.

²⁾ Gal. VII 29. 727 f.

³⁾ „Krankheit des Herakles“ hieß auch wegen ihrer Grauenhaftigkeit die Epilepsie: Gal. XVII B 341.

schreibung der Symptome. Diese Übereinstimmung ist um so auffallender, als die Beschreibung bei beiden so ins Einzelne geht, wie es in den sonst erhaltenen Beschreibungen derselben Krankheit nirgends der Fall ist.

Aret. caus. ch. m. II 13, 178:

Ἐκίκλησκον δὲ καὶ λέοντα τὸ πάθος τοῦ ἐπισκυνίου τῆς ὁμοιότητος εἵνεκεν, ἣν ὕστερον φράσω. οἷ δὲ¹⁾ σατυρίησιν τῶν τε μήλων τοῦ ξρουθήματος καὶ τῆς ἐς²⁾ συνουσίην ὁρμῆς ἀσχέτου τε καὶ ἀναισχύντου, ἀτὰρ καὶ ἡράκλειον, ὅτι τοῦδε μέζον οὐδὲν οὐδὲ ἀλκιμώτερον.

Μέγα μὲν οὖν τὸ πάθος ἐς δύναμιν· κτεῖναι γὰρ πάντων μᾶλλον δυνατώτατον· ἀτὰρ καὶ ἰδέσθαι αἰσχροὺν καὶ δειματῶδες τὰ πάντα, ὡς ἐλέφας τὸ θηρίον· ἀλλ' ἄφυκτος ἡ νοῦσος.

¹⁾ ἡδὲ Hds. οἷ δὲ Wil. ²⁾ τῆς ἐκ συνουσιῶν ὁρμῆς Hds. Die Verbesserung rührt von Fr. Z. Ermerins, Aretaei Cappadocis quae supersunt p. 150, her.

Aet. XIII 120:

Περὶ ἐλεφαντιάσεως. Ἐκ τῶν Ἀρχιγένους.

Ἡ ἐλεφαντίασις καλεῖται παρὰ τισι λεοντίασις, παρ' ἑτέροις δὲ σατυρίασις. ἐλεφαντίασις μὲν οὖν κέκληται¹⁾ διὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ πολυχρόνιον τοῦ πάθους, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἐπιγιννομένην τισὶν αὐτῶν τραχύτητα τοῦ δέρματος. λεοντίασις δὲ²⁾ κέκληται, ἐπειδὴ τὸ μέτωπον τοῦ πεπονθότος μετ' οἰδήματος τινὸς χαλᾶται ὁμοίως τῷ ἐπισκυνίῳ τοῦ λέοντος. σατυρίασις δὲ λέγεται, διότι τὰ μῆλα τοῦ προσώπου ἐπαίρεται τοῖς τοιοῦτοις μετ' ξρουθήματος, οἷον σπασμὸν τινὰ ὑπομενόντων τῶν σιαγονιτῶν μυῶν· πλατύνεται γὰρ³⁾ τὸ γένειον καθάπερ τοῖς γελῶσιν ἐμφερῶς ταῖς τῶν σατύρων γραφαῖς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς συνουσίαν προθυμία σφοδρὰ αὐτοῖς προσεδρεύει, ὥσπερ λέγεται.

Ἔστι δὲ χαλεπὸν τὸ πάθος καὶ ἐγγὺς τοῦ ἀνίατον εἶναι, καὶ βαρὺ μὲν αὐτῷ τῷ πάσχοντι, εἰδεχθὲς δὲ καὶ ἀποσιροφὴν παρέχον τοῖς ὁρῶσιν, ὥστε πολλοὶ τῶν ἀναγκαίων καὶ

Ich gebe den griechischen Text nach dem cod. Weigelianus (W.), sechzehn Bücher s. XV, jetzt cod. Berol. gr. fol. 37 und nach dem cod. Philipp. 1534 ex bibl. Meerman. s. XVI (P.), ebenfalls in Berlin.

¹⁾ καλεῖται P. „Elephantiasis quidem a magnitudine ... nomen accepit.“ Cornarius. ²⁾ δὲ fehlt in W. „autem“ Corn. ³⁾ γὰρ fehlt in P.

5. 341, 9: ἀτερπὲς μὲν καὶ φοβε-
ρὸν ἰδεῖν· θηρίου γὰρ <ή>¹⁾ ἰδέη· δέος
δὲ ξυμβιοῦν τε καὶ ξυνδιαιτᾶσθαι
οὐ μείον ἢ λοιμῶ· ἀναπνοῆς γὰρ ἐς
μετάδοσιν ῥηϊδίη βαφή.

5. 183, 7: τοιούσδε οὖν ἔοντας τίς
οὐκ ἂν φύγοι ἢ τίς οὐκ ἂν ἐκτραπείη,
κῆν υἱὸς ἢ πατήρ ἔη, κῆν κασίγνητος
τύχη; Δέος καὶ ἀμφὶ μεταδόσιος τοῦ
κακοῦ· πολλοὶ γοῦν ἐπ' ἐρημίας καὶ
ἐς ὄρεα τοὺς φιλτάτους ἐξέθεσαν, οἱ
μὲν ἐς χρόνον ἐπαρήγοντες τῷ λιμῶ,
οἱ δὲ ὡς ὠκιστα²⁾ σφέας ἐθέλοντας
ἐκθανεῖν.

5. 178, 14: ἀτὰρ οὐδὲ ἴσχει τέκμαρ
οὐδὲν ἢ ἀρχὴ τῆς νούσου[μέγα]³⁾, οὐδέ
τι ξενοπρεπὲς κακὸν τὸν ἄνθρωπον
ἐπιφοιτᾷ· οὐδὲ ἐπὶ τοῖσι⁴⁾ ἐπιπολῆς
τοῦ σκήνεος φαντάζεται, ὡς ἰδεῖν τε
εὐθύς καὶ ἀρχομένῳ ἀρῆξαι, ἀλλὰ
τοῖσι σπλάγχνοισιν ἐμφωλεῦσαν ὥπως
αἰδήλον⁵⁾ πῦρ ἤδη τύφεται καὶ τῶν
εἴσω κρατῆσαν αὐθὺς ποτε ἐπιπολαίως
ἐξάπτεται . . .

οἰκείων τῷ πάσχοντι¹⁾ ἐξέκλιναν
τὴν διατριβὴν [αὐτοῦ]²⁾. Καὶ γὰρ
δὴ ὑπόνοιαν παρέχει πολλοῖς τὸ
πάθος, ὡς μεταδόσιμον ὑπάρχον³⁾.
Κάγωγε φημι μοχθηρὸν εἶναι τὸ
συνδιατρίβειν τοῖς τοιούτοις· μολύνε-
ται γὰρ ὁ εἰσπνεόμενος ἀῆρ ἐκ τῆς
τῶν ἐλκῶν δυσωδίας καὶ τῆς μοχθηρᾶς
ἐκπνοῆς. χαλεπὸν δέ ἐστι τὸ πάθος
οὐ μόνον διὰ τὴν κατασκευὴν δύσλυ-
τον ὑπάρχουσιν⁴⁾, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ
δυσδιαγνώστους σχεδὸν ἔχειν τὰς
ἀρχὰς⁵⁾ τῆς γενέσεως· ὅτε γὰρ περὶ
τὴν ἐπιφάνειαν ἤδη ἔχνη αὐτοῦ
[γένηται ἢ]⁶⁾ φαίνεται, οἱ γίνονται
τότε, ἀλλὰ τελειοῦται, ἔνδοθεν ὡς
εἰπεῖν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων ἀρχό-
μενον καὶ διαβαῖνον ἐπὶ τὴν ἐπιφά-
νειαν· ὥστε οὐκ ἀπεικός ἐστι τὰς
ὀχθώδεις ἐπαναστάσεις καὶ κατὰ τὸ
ἐντὸς γεγονέναι.

ἀλίσκονται δὲ τῷ πάθει ἄνδρες
μᾶλλον τῶν⁷⁾ γυναικῶν καὶ τούτων
μᾶλλον οἱ πολὺ γλίσχρον καὶ μελαγ-
χολικὸν ἔχοντες τὸ αἷμα καὶ οἱ
φλέγμα πολὺ γεννῶντες ἀλμυρὸν ἢ
ὀξῶδες οἷ τε τροφῇ παχείᾳ καὶ
δυσδιοικήτῳ χρώμενοι καὶ οἱ ἀργό-
βιοι· οὐκ ἔλαττον δὲ τούτων οἱ ἀτά-
κτως πολλοῖς γυμνασίοις χρώμενοι
καὶ διὰ τούτων εἰς πῆξιν ἄγοντες τὸ
αἷμα οἷ τε διαφθείροντες συνεχῶς
τὰς τροφάς. ὅσον δὲ⁸⁾ ἐπὶ τῇ ἡλικίᾳ
παῖδες καὶ νέοι μάλιστα καθ' ὃν
καιρὸν ἥβης γίνεται ἀρχή. χώρα δὲ
τοῦ πάθους ποιητικὴ⁹⁾ ἢ τε ἄγαν

1) Wil. 2) Wil. ἥκιστα Hds.
3) Glossem Wil. 4) ἐπὶ τῇσι ἐπιπολῇσι
Hds. Verbessert von Erm. 5) Wil.
αἰδὶ Hds.

1) τῷ πάσχοντι W. τοῦ πάσχοντος
am Rande von anderer Hand. 2) Wil.
αὐτῷ W. αὐτῶν P. 3) ὑπάρχει W.
ὑπάρχων P. 4) διὰ τὸ . . . ὑπάρχειν P.
5) τὴν ἀρχὴν P. 6) Dittographie Wil.
7) τῶν fehlt in P. 8) δέ fehlt in W.
9) τοῦ πάθους ποιητικὴ fehlt in W.,
von anderer Hand erst am Rande er-

5. 179, 8: Νωθέες μὲν γὰρ ὡς ἀπὸ σχεδίου προφάσιος, ὑπναλέοι, ἡσύχιοι, τὴν κοιλίην ἐπίξηροι. Τάδε καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσι κάρτα οὐκ ἀήθεα. Ἐπὶ δὲ τῇσιν αὐξήσεσι τοῦ πάθους ἀναπνοὴ βρωμώδης ἐκ τῆς ἐνδον διαφθορῆς¹⁾ τοῦ πνεύματος. τοιάδε ὁ ἀῆρ ἢ τι τῶν ἔξωθεν αἰτίην ἴσχειν δοκέει. Οὐρα παχέα, λευκά, θολερὰ οἶον ὑποξυγίου . . . 182, 15: σιτίων ὄρεξις οὐκ ἀγεννής· ἀποιοις δ' ²⁾ ἢ γεῦσις οὐδὲ τερπνὸν ἢ ἐδωδὴ καὶ ἢ πόσις· ἀπάντων δὲ ὑπ' ἀχθηδόνος μῖσος, Ἀφροδίτης ἐπιθυμίη³⁾ λυσσώδης . . . 180, 16: φλέβες κροτάφων ἐπηρμέναι καὶ ὑπὸ τῇ γλώσση, κοιλίαι χολώδεις. γλώσσα χαλασώδεσιν ἰόνθοισι τρηχεῖα· οὐκ ἀδόκητον καὶ τὸ ξύμπαν σκῆνος ἔμπλεων τοιῶνδε ἔμμεναι. καὶ γὰρ καὶ τοῖσι κακοχύμοισι ἱερεῖοισι τὰ κρέα χαλάζης ἐστὶν ἔμπλεα· ἣν δὲ πολλὸν αἴρηται⁴⁾ ἀπὸ τῶν ἐνδοθεν ἢ πάθη καὶ ἐπὶ τοῖσι ἄκροισι φαίνεται⁵⁾, λειχήνες ἐπὶ τοῖσιν ἄκροισι δακτύλοισι, γούνασι κνησμοὶ καὶ τῶν κνησμῶν ἄπτονται μεθ' ἡδονῆς· ἀμπίσχει δὲ ὁ λειχήν καὶ γένειόν ποτε ἐν κύκλῳ· ἐρεύθει δὲ καὶ μῆλα ξὺν ὄγκῳ οὐ κάρτα μεγάλῳ . . . χρῶμα πελιδνὸν ἢ μέλαν . . . 5. 182, 5: ἣν δὲ ἐπὶ μᾶλλον αὖξῃ τὸ κακὸν, ἐλκώδεας τοὺς ὄχθους· μῆλων γενείου, δακτύλων γονάτων κάκοδμα καὶ ἀναλθέα τὰ ἔλκεα . . . 182, 17: κόποι αὐτόματοι, μελέων ἐκάστου ἰδέη βαρεῖα, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀχθεῖ καὶ τὰ σμικρὰ μέλα· ἀτὰρ καὶ τὸ σῶμα πρὸς ἅπαντα ἄχθεται, οὐ λουτροῖσι τέρεται, οὐκ ἀλουσίη, οὐ

1) ἀναφορῆς Hds. Erm. διαφθορῆς.
2) δ' Erm. 3) Wil. ἀτροφίη Hds.
4) So Wiggan. αἶρη τι Hds. 5) Erm. für φανῆται.

θερμὴ καὶ ἡ πάνυ ψυχρά, ἡ μὲν τῷ κατοπιᾶν τὸ αἷμα, ἡ δὲ τῷ καταπηνύειν τῇ ψύξει καὶ τῷ κωλύειν τὴν διαπνοὴν καὶ καταπνίγειν τὸ ἔμφυτον θερμὸν.

παρακολουθεῖ δὲ τοῖς μέλλουσιν ἐνσχεθῆσθαι¹⁾ τῷ τοιούτῳ πάθει νωθρότης, βραδύπνοια, δυσκινησία, κοιλίας συνεχῆς ἐποχή²⁾, οὖρων ἐκκρισις ὑποξυγιωδῶν, ἀναπνοὴ βραδεῖα καὶ βρωμώδης³⁾, ἐρυγαὶ συνεχεῖς⁴⁾ καὶ αὐτοῖς τοῖς πεπονθόσι προσβάλλουσαι τινα ἀηδίαν. ὄρεξις οὐκ ἀμβλεῖται μὲν οὐδὲ φλογώδεις . . .⁵⁾ ὁρμὴ πρὸς ἀφροδίσια ἐπιτεταμένη. ἦδη δὲ τοῦ πάθους διαβαίνοντος εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, μῆλα πρῶτον παχύνεται καὶ γένειον, εἰτ' ἐρυθραίνεται ταῦτα οὐκ εὐανθεῖ, ἀλλὰ πελιῶ ἐρυθήματι, καὶ αἶ⁶⁾ ὑπὸ τὴν γλώτταν φλέβες κυρτοῦνται καὶ μελαίνονται, ὡς ἐμφαίνειν ὅτι ἐν ὁμοίᾳ τινὶ⁷⁾ καταστάσει καὶ τὰ σπλάγχνα εἰσὶν, ὅποια βλέπεται καὶ τινων χοίρων τὰ ἐντός, αἱ δὲ χαλάζια καλεῖται. ἔστι δ' ὅτε καὶ καθ' ὅλου τοῦ σώματος οἱ ὄχθοι φαίνονται, μάλιστα δὲ κατὰ τῶν ἄκρων τοῦ μετώπου καὶ τοῦ γενείου. δοκεῖ δὲ τὸ σῶμα αὐτοῖς ἐν μεγέθει τινὶ ὑπάρχειν⁸⁾ αἷμα καὶ βάρει⁹⁾ τινὶ δυσυποίστιῳ, ὅτε οὔτε τὸ πιεῖν¹⁰⁾ αὐ-

gänzt „Regio vero huius mali inductrix“ Corn.

1) ἐνσχεθῆσθαι W. P. 2) συνοχὴ ἐποχή W. „assidua constrictio alvi“ Corn. 3) βρωμώδεις W. „respiratio gravis et foetida“ Corn. 4) καὶ συνεχεῖς W. 5) Wil. zu ergänzen etwa: τῶν δὲ προσφερομένων ἡδονῇ ἐπαχίστη. 6) αἶ fehlt in P. 7) τινὶ fehlt in P. 8) Die Interpolation μετ' ὄγκου fehlt in W., von anderer Hand am Rande ergänzt. 9) βάρους τινὸς δ. P. 10) ποιεῖν W.

τροφῇ, οὐκ ἀσιτίῃ, οὐ κινήσει, οὐκ ἡρεμίῃ δύσπνοια καρτερή. πνίγες ὡς ἀπ' ἀγχόνης

τοῖς οὔτε τὸ φαγεῖν ἡδύ ἐστιν. ἀτολμοὶ δὲ γίνονται πρὸς πάντα· οὔτε γὰρ ὑπὸ φιλοζωίας καταλείπειν τὸν βίον καὶ καταφρονεῖν καρτεροῦσιν οὔτε τὸ πάθος γενναίως φέρειν δύνανται, ἀλλ' ὥσπερ κατεγνωκότες ἑαυτῶν εἰσι καὶ περιστέλλονται καὶ ἐκκλίνουσιν ἀπὸ τῶν γνωρίμων. Τινὲς δὲ αὐτῶν καὶ πνιγώδεις καὶ ὥσπερ ἀγχόμενοι γίνονται κατὰ τοὺς ὕπνους

Zur Erklärung dieser Übereinstimmung sind zwei Annahmen zulässig: entweder Archigenes ist Quelle des Aretaios oder umgekehrt. Die dritte Annahme, daß beide aus gemeinschaftlicher Quelle schöpften, halte ich bei der bisweilen wörtlichen Übereinstimmung für ausgeschlossen. Allein schon die Berühmtheit und das hohe Ansehen, in dem Archigenes im ganzen Altertum gestanden, berechtigt zu der Schlußfolgerung, daß er die Primärquelle gewesen. Auch wird man wohl unbedenklich zugeben, daß der Bericht des Aetius, der überhaupt viel verständiger ist als Aretaios, in seiner Geschlossenheit und Vollständigkeit durchaus den Eindruck des Ursprünglichen macht. Bewiesen wird seine Unabhängigkeit von Aretaios durch die größere Reichhaltigkeit, die uns vor allem in seinen Angaben über die Disposition der einzelnen Lebensalter und der verschiedenen Gegenden zu dieser Krankheit entgegentritt.

Ebenso auffallend ist die Übereinstimmung in der Therapie dieser Krankheit¹⁾: beide empfehlen Aderlaß mit dem Hinzufügen, beide Ellenbogenvenen zu öffnen mit steter Rücksicht darauf, daß kein gutes Blut mit abgeführt werde, ferner die Hiera sowie sonstige Abführmittel, den Genuß von Molken, Brechmittel und Niefswurz; bei beiden folgt dann eine Anzahl von Recepten mit dem Unterschiede, daß sie von Aetius sehr ausführlich angegeben werden, während sich Aretaios auf eine geringe Auswahl beschränkt, beide rühmen besonders das Nattermittel, endlich stimmen beide in den *σμήγματα* überein, die zur Beseitigung des Ausschlages dienten. Die Verwandtschaft beider Berichte wird durch eine Gegenüberstellung klar werden:

¹⁾ Aret. cur. morb. chron. II 13, 341 f. Aet. XIII 121 f.

Aret. 341, 17 f.

Τάμνειν ὦν τὰς ἐπ' ἀγκῶνι φλέβας, ἄμφω δέ. Τάμνειν δὲ καὶ τὰς ἐπὶ σφυροῖσι, (μὴ)¹⁾ αὐτῆμαρ· κρέσσον γάρ ἢ διάστασις ἔς τε πολλὴν τὴν τοῦ αἵματος ῥοὴν καὶ ἐς ἀνάκλησιν τῆς δυνάμιος. χρεὼν γὰρ αἷμα πολλάκις καὶ πολλόν²⁾ ἐκχέαι, τοῦ πάθους τὴν τροφήν. σμικρὸν δὲ ἐν αὐτῷ τὸ χρηστόν, τῆς φύσιος ἢ τροφῆς. Ξυντεκμαίρεσθαι ὦν, ἀφαιρέοντα τὸ πονηρόν, καὶ ἐντηκτον μεσηγὺ τὸ οἰκεῖον, μέσφι ἂν προαπαυδήσῃ ἀτροφίῃ ἢ νοῦσος . . . ἔπειτα τὴν ἱερὴν πιπύσκειν, μὴ ἐσάπαξ· ἀλλὰ γιγνέσθω πάντα πολλάκις ἐξ ἀναλήψιος καὶ παλινδρομίας. Ἔστω καὶ ἡ ἄλλη κάθαρσις φαρμακώδης ἐν σιτίῳ, ἢ ἐπὶ τῷ ἰσχύῳ [ἢ] ἔλεξα. ἀτὰρ³⁾ ἡδὲ γάλα ἀδιάκριτον· πολλὸν δὲ ἔστω τόδε ἐς διαχώρησιν πιεῖν. ἐχέτω δὲ μοίρην τὴν πέμπτην ὕδωρ, ὡς πᾶν τὸ γάλα διεκθέειν. Ἐς ἑμέτους δὲ θᾶσσον ἄγειν νήστιας τὸ πρῶτον· ἀπὸ σιτίων δ' αὖθις· ἔπειτα ἀπὸ ῥαφανίδων· πολλάκις δὲ καὶ ξυνεχέως πάντα γιγνέσθω. ἐς ἐλλέβορον ἄγοντα καιρῷ παντὶ, μᾶλλον δὲ ἕαρος καὶ φθινοπώρου διδόναι ἡμέραν ἀφ' ἡμέρας, καὶ αὖθις ἐς νέωτα.

Κῆν ἢ νοῦσος κρατυνθῇ, φαρμάκων ποτῶν ὁκόσα τις γιγνώσκει πιπύσκειν· ἀγαθὸν γὰρ φαρμακεύειν πολλὸν ἐς ὄνησιν. Καὶ γὰρ δὲ ὁκόσα γιγνώσκω γράφω· κεδρίης κύαθον ἕνα κράμβης δύο μίσγοντα διδόναι.

Ἄλλο· σιδηρίτιδος τοῦ χυλοῦ κύαθος εἷς, τριφυλλίου εἷς, οἴνου καὶ μέλιτος κύαθοι δύο.

Ἄλλο· ἐλέφαντος τοῦ ὀδόντος ῥινή-

¹⁾ μὴ fehlt in Hds. Conjectur von Erm. ²⁾ πολλόν Wig. πόλλ' Hds. ³⁾ Wil. Hds.: ἢ ἐπὶ τῷ ἰσχύῳ ἢ ἔλεξα ἔστω.

Aet. XIII 121 f.

Θεραπεία ἐλεφαντιῶντων· ὅτε τοίνυν προφαίνονται¹⁾ τοῦ πάθους τινὰ τῶν εἰρημένων σημεῖα, ἀνυπερθέτως αἷμα μεμερισμένως ἀπὸ τῶν δύο ἀγκῶνων χρὴ κενοῦν· ἀναζωπυρεῖται²⁾ γὰρ τρόπον τινὰ³⁾ τὸ ἔμφυτον θερμὸν, ὡς αἰσθητῶς κουφίσεσθαι τὸ σῶμα· ἔχεσθαι μέντοι τῆς συμμετρίας δεῖ ἐν τῇ κενώσει· καὶ γὰρ ἐν πολλῷ τῷ ἀχρήστῳ αἵματι ὀλίγον τὸ οἰκεῖόν ἐστι· μετὰ δὲ τὴν τοῦ αἵματος ἀφαιρέσιν ἐνδοθεισῶν ὀλίγων ἡμερῶν, τὴν κάτω κοιλίαν ὑπακτέον καὶ πρῶτόν γε χρησιέον τῷ διὰ τῆς κολοκυνθίδος πόλτῳ, ἐξ οὗ καὶ καταπότια διδόναι καρύοις Ποντικοῖς⁴⁾ ὅμοια τῇ . . . εἰ μὴ βούλονται δὲ ταῦτα λαμβάνειν, τῇ ἡμετέρᾳ ἱερᾷ⁵⁾ καθαίρειν δεῖ⁶⁾· θαυμασιῶς γὰρ⁷⁾ ποιεῖ ἐπ' αὐτῶν καὶ αὐτὰ μῆνα ἕκαστον διδομένη. Μετὰ δὲ ἡμέρας δέκα ὀρῶν γάλακτος σχιστοῦ χρήσασθαι οὐκ ἐλάττονι⁸⁾ τριῶν κοτυλῶν⁹⁾ οὐδὲ μὴν πλείονι τῶν πέντε¹⁰⁾ ἔστω δὲ ὄνειον εἰοῖόν τε¹¹⁾ τὸ γάλα, ἐξ οὗ τὸν ὀρῶν λαμβάνομεν. προσπλέκειν δὲ αὐτῷ χρὴ ἐλλεβόρου μέλανος τριώβολον καὶ σκαμμωνίας γρ. α', διδόντας ταῦτα¹²⁾ μετ' ὀλίγου ὀρῶν¹³⁾ νήσκει, καὶ ἔπειτα αὐτὸν τὸν ὀρῶν καθ' αὐτὸν προσάγοντας . . . μετὰ δὲ τὴν τούτων παραλήψιν ἑμέτους ἀπὸ τροφῆς παραλαμβάνειν, εἴτα καὶ ἀπὸ ῥαφανίδων

¹⁾ προφαίνονται W. P. ²⁾ ἀναζωπυροῦται W. ἀναζωοπεροῦνται P. ³⁾ fehlt in P. ⁴⁾ καρύου Ποντικοῦ P. ⁵⁾ τῇ ἱερᾷ τῇ ἡμετέρᾳ P. ⁶⁾ fehlt in P. ⁷⁾ für γὰρ hat P. δέ. ⁸⁾ ἐλαττον P. ⁹⁾ κοτυλῆς W. ¹⁰⁾ πλείον τῶν πέντε λαμβάνοντας P. ¹¹⁾ τε fehlt in W. ¹²⁾ ταῦ' ὀλίγου ὀρῶν P. ¹³⁾ ὀρῶν fehlt in W. vgl. Cornarius: „cum modico sero“.

ματος ὀλκῆς δραχμὴ ξὺν οἴνῳ Κρη-
σίῳ κυάθων δύο.

ἀτὰρ καὶ τῶν ἔχεων τῶν ἐρπειτῶν
[θηρίων]¹⁾ αἱ σάρκες, καὶ αἶδε ἐς ἀρτί-
σκους πεπλασμέναι πίνονται· ἀποτα-
μόντα δὲ χρὴ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς
οὐραίας ἐκάστου²⁾ ὁκόσον δακτύλους
τέσσαρας, τὸ λοιπὸν ἔψειν ἐς διά-
κρισιν³⁾ τῶν ἀκανθῶν. Τὰς δὲ
σάρκας ἀρτίσκους διαπλάσαντα ψύ-
χειν ἐν σκιῇ· πιπίσκειν δὲ τούσδε,
ὅκως καὶ τὴν σκίλλην· καὶ αὐτοὶ δὲ
οἱ ἔχιδες ὄψον ἐν δείπνῳ· ὥς ἰχθύας
δὲ χρὴ τούτους σκευάσαι. Ἦν δὲ
τὸ δι' ἐχιδνῶν τὸ ποικίλον παρέη
φάρμακον, ἀντὶ πάντων πίνειν τόδε.
ἴσχει γὰρ πάντα ὁμοῦ· ῥύπτειν δὲ
καὶ τὸ σκῆνος καὶ τοὺς ὄχθους λεά-
νειν⁴⁾. φάρμακα δὲ ἄλλα μυρία· τῶν
Κελτέων⁵⁾, οἳ νῦν καλέονται Γάλλοι⁶⁾,
τὰς νιτρώδεις⁷⁾ τὰς ποιητὰς σφαί-
ρας, ἣσι ῥύπτουσι τὰς ὀθόνας, σάπων
ἐπίκλην· τῇσι ῥύπτειν τὸ σκῆνος ἐν
λούτρῳ ἄριστον· καὶ ἀνδράχνη⁸⁾ καὶ
ἀείζωον ξὺν ὄξει, ἀτὰρ καὶ λαπά-
θου ῥιζέων ἀφέψημα ξὺν ἀπύρῳ
θείῳ ῥύπτει καλῶς· ποικίλον δὲ ἀλ-
κυονίου τοῦ λείου καὶ νίτρου καὶ τρυ-
γὸς ὄξεος κεκαυμένης καὶ στυπτηρίης
σχιστῆς καὶ θείου τοῦ ἀπύρου καὶ
κόστου καὶ ἱριδος καὶ πεπέριος. Τάχα
δὲ χρὴ πάντα μίσγειν, ἐκάστου τὸ πρὸς
δύναμιν, ἄλλο δὲ (<ἄλλῳ>⁹⁾ ἴσον, καὶ
τόδε καταπάσσοντα ἀνατρίβειν. Ἔς
δὲ τοὺς ὄχθους τοῦ προσώπου κλη-
μάτων τὴν σποδιὴν ξὺν τινὶ θηρίων

1) Wil. 2) ἐκάστου Wig. ἑκαστον
Hds. 3) Vgl. Gal. XII 318. 4) ἀλεαίνειν
Hds. verbessert von Wig. 5) Erm.
Κελτέων für das überlieferte Κελτίων
vgl. Plin. XXVIII 51. 6) Gal. XIV 80.
7) λιτρώδεις Hds. verbessert von Erm.
8) So Wig. für das überlieferte ἀν-
δράχνην. 9) von Erm. hinzugefügt.

νήστιν, κῖπειτα ἐπὶ τὸν ἐλλέβορον
ἐρχεσθαι¹⁾ οἶδα δέ τινα²⁾
καὶ τῶν σφόδρα κρατηθέντων θερα-
πευθέντα ὑπὸ τινος φαρμάκου τοι-
ούτου· ὄξους καλλίστου καὶ κεδρίας
ἄμα κύαθον α', κράμβης χυλοῦ κυά-
θους β' συγκεράσας δίδου νήστει
ἔωθεν, εἴτα πρὸς ἐσπέραν κρίθινον
ἄρτον δίδου σύμμετρον μετὰ τινος
τῶν κουφοτέρων πτηνῶν μαρ-
τυροῦσι δὲ³⁾ πολλοὶ καὶ τῇ σιδηρίτιδι
βοτάνῃ· δίδεται δὲ⁴⁾ <α' τῶν φύλ-
λων ξηρῶν λείων σὺν οἴνῳ αὐστηρῶ·
οἶδα ποιούσαν καὶ τὴν τρίφυλλον
βοτάνην τὴν ἀσφαλίζουσιν. δίδο-
ται δὲ καὶ ταυτῆς⁵⁾ <α' νήστει
λεαινομένη, ἐνὶ μὲν κυάθῳ οἴνου,
ἐνὶ δὲ ὄξους καὶ ἐνὶ μέλιτος. Καὶ
ἐλέφαντος δὲ ὅσπου⁶⁾ ῥίνημα ἢ κέρα-
τος ἐλαφείου ὅσον κοχλιάριον πολλά-
κις μίγνυται τῇ προειρημένη δόσει. . .
Ἡ δὲ δι' ἐχιδνῶν θηριακὴ Ἀνδρο-
μάχου ἐπιτομὴ πάσης φαρμακείας
ἐστὶ διδομένη μετὰ τὰς καθάρσεις ἐκ
διαλειμμάτων ὀλίγων. Θαυμαστὸν⁷⁾
δὲ ἐστὶ βοήθημα τοῖς ἐλεφαντιῶσιν
ἢ⁸⁾ τῶν ἐχιδνῶν βρωσίς. χρὴ δὲ
ἐσθίειν ταύτας τοιῶςδε σκευάζοντα·⁹⁾
πρῶτον μὲν ἀποκοπτομένης τῆς κε-
φαλῆς καὶ τῆς οὐρᾶς, εἴτα τοῦ δέρ-
ματος ἀφαιρεθέντος καὶ τῶν ἐντο-
σθίων πάντων ἐξαίρεθέντων καὶ ὕδατι
καθαρῶ δις καὶ τρίς περιπλυθείσης
τῆς σαρκὸς, ἐψοῦνται ἐν λοπάδι ταῖς
ἐγχέλυσι παραπλησίως ὕδατος ἐμβλη-
θέντος¹⁰⁾ αὐτάρκους καὶ ἐλαίου βραχέος
σὺν ἀνήθῳ καὶ πράσῳ. μετὰ δὲ τὴν
αὐτάρκη ἔψησιν ἀρτυέσθω ὁ ζωμὸς
ἀλσὶ συμμέτροις καὶ οὕτως διδόσθω

1) ἐλθεῖν P. 2) fehlt in P. 3) δέ
fehlt in W. 4) δὲ ὅσον <α P.
5) ταῦτα W. 6) fehlt in P. 7) θαυ-
μάσιον P. 8) fehlt in W. 9) σκευά-
ζοντας W. 10) μὲν βληθέντος W.

στέατι μίσγοντα κρίειν, λέοντος ἢ παρδάλιος ἢ ἄρκτου, ἣν δὲ μὴ, χηναλώπεκος· ὅμοιον γὰρ ἐν ἀνομοίῳ¹⁾ ὅκως πίθηκος ἀνθρώπῳ ἄριστον· καὶ ἀμμωνιακὸν τὸ θυμίημα ξὺν ὄξει καὶ ἀρνογλώσσου χυλός²⁾ ἢ πολυγόνου καὶ ὑποκυστίς καὶ λύκιον· ἣν δὲ πελιδναὶ ἔωσιν αἰσάρκες, προεγχαράσσειν ἐγχυλώσιος εἵνεκεν· ἣν δ' ἐπὶ τοῖσι δριμέσι ρεύμασιν ἀναδαρέντα προῦνεν τὰ μέρεα ἐθέλης, τήλιος ἀφέψημα ἢ πτισάνης χυλός³⁾, ῥύμμα μαλθακὸν· λίπας δὲ ῥόδιον⁴⁾ ἢ σχίνινον, λοῦτρα δὲ συνεχέα ξύμφορα ἐς ὑγρασμὸν καὶ ἐς διαπνοὴν τῶν κακῶν χυμῶν.

1) So Erm. Hds.: ἐν ἀνομοίῳ.

2) χυλῶ Hds. χυλός Erm. 3) χυλοῦ Hds. χυλός Erm. 4) ῥοδίνου ἢ σχινίνου Hds. verbessert von Erm.

ἐν ἡλίῳ καθεζομένῳ τῷ κάμνοντι προσφέρειν τε χρὴ ἔξωθεν τῇ ἐπιφανείᾳ τὸ ψίλωθρον ἐν βαλανείῳ . . . διὰ τοῦτο καὶ¹⁾ πτισάνης χυλῶ²⁾ σκευαζέσθω τὸ ψίλωθρον. ἀλλὰ³⁾ καὶ τὸ ἄρκτειον μάλιστα στέαρ ἢ ἀλωπέκειον, εἰ δὲ μὴ, ταύρειον σὺν κληματίνῃ τέφρᾳ ἀναμαχθὲν καὶ σὺν κονία στακτῇ εἰρηθὲν σπουδαίως ἀπολεπτύνει τοὺς ὄχθους· τοιοῦτῳ γὰρ τρόπῳ καὶ σάπων κατασκευάζεται καὶ χρηστέον αὐτῷ· μὴ παρόντος δὲ ἄρκτειου ἢ ἀλωπεκείου στέατος, ἀγαθὸν καὶ ἀνδράχνη λειωθεῖσα σὺν ὄξει καὶ τὸ λεπτὸν αἰίζων, ὃ καλοῦσιν οἱ Ῥωμαῖοι ἡλέκεβραν⁴⁾ . . . καλῶς δὲ ποιεῖ⁵⁾ καὶ στυπτηρία μεθ' ἁλῶν καὶ σανδαράχης ἴσων⁶⁾ ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ, μάλιστα⁷⁾ σχινίνῳ, εἰ δὲ μὴ, ῥοδίνῳ λειωθέντων καὶ τῷ⁸⁾ πρὸς ἀλφούς [δὲ] παρ' ἡμῖν συντιθεμένῳ⁹⁾ ξηρῷ σπουδαίως ἀποσμήχειν. οὗ¹⁰⁾ ἢ σκευασία ἔχει οὕτως· ἁλκυόνιον, νίτρον καὶ θεῖον ἄπυρον, μυρσίνης φύλλα ξηρὰ καὶ συκῆς ἀγρίας ἴσον ἐκάστου¹¹⁾ κόψας σήσας λειότατα σὺν ὄξει κατάχρειε καὶ σμῆχε ἐν βαλανείῳ.

1) καὶ fehlt in P., dafür διὰ. 2) χυλοῦ P. 3) ἀλλὰ fehlt in P. 4) ἡλέκεβραν W. ἡλεκέβορ P. vgl. Diosc. IV 89, 586. 5) καλῶς ποιεῖν W. καλῶς δὲ ποιεῖ P. 6) ἴσω P. 7) δέ P. 8) τῷ W. 9) τὸ πρὸς ἀλφοῖς δέ σοι συντεθεισόμενον P. 10) ἔστι δέ P. 11) ἴσα κόψας W. ἴσον ἐκάστῳ P.

Um über die Arbeitsweise des Aetius zur Klarheit zu gelangen, ist es notwendig, den parallelen Bericht eines dritten Autors, des Oribasius, heranzuziehen. Im 29. Kapitel des 45. Buches seiner

ἐβδομηκοντάβιβλος ἱατρικῶν συναγωγῶν¹⁾ behandelt dieser Arzt mit derselben Ausführlichkeit wie Aetius die Therapie dieser Krankheit in vielfach fast wörtlicher Übereinstimmung mit ihm. Trotzdem ist die nächstliegende Annahme der Abhängigkeit des Aetius von Oribasius auszuschließen wegen der größeren Reichhaltigkeit des Aetius und mehrerer Abweichungen im Einzelnen: beide beginnen die Behandlung mit dem Aderlaß; während sich aber Oribasius allgemein hält, empfiehlt Aetius in Übereinstimmung mit Aretaios im Gegensatz zu der Behandlung der überwiegend größeren Zahl von Krankheiten beide Ellenbogenvenen anzuschlagen. Der Zusatz des Aetius, daß die Hiera besonders wirksam sei, wenn sie monatlich einmal dem Kranken gereicht werde, fehlt bei Oribasius, ebenso die von ihm empfohlene Mischung der Molken mit Nieswurz und Skammoniumharz. Ferner ist Aetius ausführlicher in den Angaben über die Zubereitung der Nieswurz. Die Gewaltkur der Castration bei dieser Krankheit wird nur von Aetius erwähnt, während die zur Begründung derselben verwandte Thatsache, daß Castraten selten an dieser Krankheit leiden, auch dem Oribasius²⁾ bekannt ist. In der Beschreibung der φάρμακα und σμήγματα ist Aetius wieder bei bisweilen wörtlicher Übereinstimmung mit Oribasius viel reichhaltiger; so fehlt z. B. die ausführliche Besprechung des Vipernmittels ganz bei ihm. Endlich ist die Behandlung der für diese Krankheit notwendigen Diät bei Aetius³⁾ viel ausführlicher und vollständiger, kurz wer beide Berichte nebeneinander vergleichend durchläuft, wird sich davon überzeugen, daß beide aus derselben Quelle geschöpft haben. Freilich bin ich weit davon entfernt, die ganze Masse der von Aetius angeführten Mittel aus dieser Quelle herzuleiten: das σμήγμα des Oribasius z. B. hat er sicher direct entlehnt. Bei diesem Thatbestande ist der Schluß ganz unabweislich, daß der von Oribasius als Quellenschriftsteller genannte Philumenos die Hauptquelle des Aetius ist, nicht nur für die Therapie der Elephantiasis, sondern bei der engen und unlösbaren Zusammengehörigkeit der Beschreibung derselben mit dem folgenden auch für dieses Capitel (c. 120) d. h. mit andern Worten, daß Aetius den Archigenes nicht direkt benützt hat, sondern durch Vermittelung des Philumenos.

¹⁾ Orib. IV 65 f.

²⁾ Orib. IV 82, 13.

³⁾ Aet. XIII 125.

Was die Therapie des Philumenos anlangt, so folgt aus der oben nachgewiesenen Übereinstimmung mit Aretaios, daß er sie ebenso wie die Beschreibung der Krankheit entlehnt hat. An und für sich ist recht wohl glaublich, daß er auch in diesem Abschnitt seiner Darstellung dem Archigenes gefolgt ist. Um aber jeder Zweifelsucht von vornherein zu begegnen, seien hier mehrere directe Zeugnisse hervorgehoben, welche für verschiedene Behauptungen dieses Abschnitts den Archigenes als Quelle gewährleisten.

Gleich zu Anfang seiner Darstellung, nachdem er den Aderlaß und den Genuß von Coloquintenpillen empfohlen hat, fährt er fort: *εἰ μὴ βούλονται δὲ ταῦτα λαμβάνειν, τῇ ἡμετέρᾳ ἱερᾷ καθαίρειν δεῖ*. Von diesem im Altertum hochgeschätzten Laxans¹⁾ gab es verschiedene Präparate, von denen eins ausdrücklich dem Archigenes zugeschrieben wurde²⁾. Er konnte also mit Fug und Recht sagen: *τῇ ἡμετέρᾳ ἱερᾷ καθαίρειν δεῖ*. Das vorausgehende Purgans, die Coloquintenpillen, gehörte gleichfalls zu den beliebten Purgirmitteln dieses Arztes³⁾, sogar die hier verordnete Dose von 18 haselnußgroßen Pillen kehrt in seiner Therapie wieder⁴⁾. Die Beobachtung, daß die Castration zur Heilung dieser Krankheit dienlich sei, wird ausdrücklich von ihm bezeugt durch den Scholiasten zu Orib. IV 530, 3: *Τοιγαροῦν καὶ ὁ Ἀρχιγένης καὶ εὐνουχίζει τοὺς ἤδη ἀρξαμένους τῷ πάθει τούτῳ κατέχεσθαι*. Zudem wird er in diesem Abschnitt von Philumenos genannt: *οὐ γὰρ ἂν εὐροις, φησὶν Ἀρχιγένης, οὐδένα τῶν εὐνουχισθέντων (εὐνουχιζομένων P.) ἐλεφαντιῶντα οὐδὲ μὴν γυναικα (γυναικας P.) ῥαδίως· ὁθεν καὶ τῶν εὐτόλμων ἰατρῶν τινες ἐπεχείρησαν τῇ χειρουργίᾳ καὶ ὅσοι γε (deest P.) τῶν καμνόντων τὸν ἐκ τῆς χειρουργίας ἐξέφυγον κίνδυνον, τῇ ἀκολούθῳ θεραπειᾷ χρησάμενοι τελέως ἀπηλλάγη-*

¹⁾ Aet. III 111—116. Gal. XIII 129 ff. Scrib. Larg. c. 97, 41 ff. Das Mittel enthielt eine Reihe von kräftigen Purgantien, vor allem Coloquinten oder Aloe. Darnach hieß die eine *ἱερὰ διὰ κολοκυνθίδος*, die andere *ἱερὰ δι' ἁλόης*. Die Hiera des Andromachos, die wohlriechendes Bartgras, Holzbalsam, Mastixharz, Crocus, indische Narde, Haselwurz, Zimmt und Aloe enthielt, wurde zu Galens Zeiten *ἱερὰ πικρά* genannt (Gal. XIII 129). Es gab eine Hiera des Paccius Antiochus, Rufus, Archigenes, Galen und Iustus (Aet. a. a. O.).

²⁾ Aet. a. a. O. Orib. II 272.

³⁾ Orib. II 271 f. Aet. XII p. 13 Cast.

⁴⁾ Orib. a. a. O.

σαν τοῦ μοχθηροῦ πάθους. Die Verwendung des Vipernmittels¹⁾ gegen Elephantiasis war ebenfalls eine Neuerung des Archigenes²⁾: so verbreitet dieses Mittel in der pharmakologischen Litteratur der Alten war, besonders als Heilmittel gegen Nervenleiden und Mandelanschwellungen³⁾, seine Verwendung gegen den Ausschlag begegnet erst seit der Zeit des Archigenes (vgl. Soran bei Cael. Aur. M. Ch. IV 1).

Somit haben wir als Thatsache zu constatieren, daß Philumenos die Quelle des Aetius und Oribasius für die Behandlung der Elephantiasis ist und daß er sowol wie Aretaios den Archigenes benützt haben. Des Archigenes Behandlung dieser Krankheit ist maßgebend geworden für die Folgezeit: außer den beiden genannten Ärzten haben ihn Galen⁴⁾ und Soran⁵⁾ benützt. Bei letzterem, der ihn als *unum ex nostris* neben den Pneumatikern Magnus und Agathinos citiert⁶⁾, ist er unter den *alii* zu suchen, die geronnene Milch, das Mithridation und Vipernfleisch empfohlen⁷⁾. Berührung mit Archigenes weisen auch die am Schluss des Capitels über die Elephantiasis stehenden Vorschriften auf, die Haut des Kranken anzuschneiden, um die schlechte Flüssigkeit zum Abfluß zu bringen und den Kranken

1) Plin. XXIX 70. Diosc. II 18. Gal. XIV 265. XII 311. 317. Dies Mittel wurde in der Weise zubereitet, daß man am Kopf und Schwanzende drei resp. vier Finger breit abschnitt, die Eingeweide mit dem Rückgrat herausnahm und das übriggebliebene Fleisch in Wasser mit Gartendill (*ἄνηθον*) kochte, Weizenmehl hinzusetzte und im Schatten trocknete. Dioscorides a. a. O. d. h. Sextius Niger erklärte das Abschneiden von Kopf und Schwanz nach einem bestimmten Maße für *μυθώδης*. Wie es scheint, verdankt dies Mittel seine Verwendung in der Elephantiasis dem Zufall. Aretaios (caus. chr. m. II 13, 183) d. h. Archigenes und nach ihm Galen (XII 312, aus ihm Aet. II 170) berichten darüber genaueres: „Ein Kranker sah, wie eine Natter in ein Faß mit Most kroch und nachdem sie sich satt gesoffen, den Most und eine große Menge Gift ausspie. Als das Tier in dem Most erstickt war, trank der Kranke davon, ward trunken und fiel wie tot zur Erde. Darnach fielen ihm Haare, Nägel, Finger, kurz ein Glied nach dem andern aus, und es bildete sich neues Fleisch an den einzelnen Gliedern.“ Charakteristisch für Galen ist es, daß er dies Ereignis in Asien als junger Mensch selbst erlebt haben will.

2) Bezeugt ist dies allerdings nur in der Hds., die der lateinischen Übersetzung des Aetius von Cornarius, Basel 1542, zu Grunde lag. In den beiden Berliner Hds. W. und P. fehlt das Archigenescitat.

3) Diosc. a. a. O.

4) Gal. XI 143 ff. XII 311 f.

5) Cael. Aur. M. Ch. IV 1.

6) Cael. Aur. A. M. II 10.

7) Cael. Aur. M. Ch. IV 1.

bei der grossen Ansteckungsgefahr aus der Gemeinschaft der Menschen zu entfernen¹⁾).

Die Darmverschlingung (*εἰλεός*)²⁾ war seit Hippokrates³⁾ häufig genug Gegenstand ärztlicher Behandlung gewesen. Während aber die älteren Ärzte wie Hippokrates, Euryphon und Praxagoras den *εἰλεός* mit dem *χορδαψός* identifizierten, unterschied zuerst der Karystier Diokles, der Zeitgenosse des Plato, beide Bezeichnungen in der Weise, daß er unter *χορδαψός* die Erkrankung des Dünndarms, unter *εἰλεός* die des Dickdarms verstand⁴⁾. Diese Unterscheidung des Diokles hat sich in der Folgezeit nicht behauptet. Nach dem Zeugnis des Celsus⁵⁾ nannten die meisten Ärzte zu seiner Zeit die Erkrankung des Dickdarms *κολικόν*, während sie den Sitz des *εἰλεός* in den Dünndarm verlegten. Aretaios folgt in seiner Definition des *εἰλεός* dieser landläufigen Ansicht⁶⁾: er verstand darunter eine mit heftigen Schmerzen verbundene Entzündung des Dünndarms, die dadurch hervorgerufen wird, daß sich ein im Innern entwickeltes kaltes und träges Pneuma in den Gedärmen festsetzt. Den Sitz des *χορδαψός*⁷⁾ verlegte er in die untere Partie der Gedärme; er entsteht durch Compression und Erweichung der Gedärme und tritt äusserlich dadurch in die Erscheinung, daß der Unterleib anschwillt⁸⁾. Als Ursachen des *εἰλεός* nennt er das Übermaß im Essen, Genuß unverdaulicher, besonders fetter Speisen, Fäulnis der eingenommenen

¹⁾ Cael. Aur. a. a. O.: Alii quoque etiam cutis vulnerationem affectandam probant, qua corpus exhumoretur: neque cunctis commune iudicium et ignavis cognitum providentes, quod peiorante passione superficies corporis ulceretur. Alii aegrotum in ea civitate, quae nunquam fuerit isto morbo vexata, si fuerit peregrinus, excludendum probant, civem vero longius exulare aut locis mediterraneis et frigidis consistere, ab hominibus separatum, exinde revocari, si meliorem receperit valetudinem, quo possint ceteri cives nulla istius passionis contagione sauciari.

²⁾ Nach dem Zeugnis des Kallimachos nannten einige pythagoreische Ärzte in Sicilien die Krankheit „Verstopfung (*φοραγμός*)“, *siquidem obtrusis naturalibus ventris officiis fieri videatur*. Vgl. Cael. Aur. A. M. III 17.

³⁾ Hipp. *περὶ νόσων* III 304.

⁴⁾ Cels. IV 20. Cael. Aur. a. a. O.

⁵⁾ Cels. a. a. O.

⁶⁾ Aret. caus. acut. m. II 6, 45. Vgl. Ps. Gal. XIX 423.

⁷⁾ Interessant ist die Ableitung, die er von diesem Worte giebt: *χορδῆ = ἔντερα, ἔψησις = μάλαθξις*. Vgl. Cael. Aur. A. M. III 17, 172.

⁸⁾ Vgl. Cael. Aur. a. a. O.

Nahrung, Schlag auf den Unterleib, Erkältung oder endlich hastiges Trinken kalten Wassers bei schwitzigem Körper¹⁾. Beim *χορδαψός* pflegt eine mit Kot angefüllte Darmschlinge bis in den Hodensack hinabzugleiten und zwar so, daß sie nicht mehr in die Unterleibshöhle zurückgebracht werden kann. Nach seiner Angabe ist diese Krankheit bei Kindern häufig, aber weniger gefährlich; bei alten Leuten dagegen selten, aber gefährlich; am häufigsten tritt sie im Sommer auf. Bei der Beschreibung der Symptome unterscheidet er²⁾ drei Stadien: im ersten Stadium haben die Kranken einen windenden Schmerz, ihr Magen ist mit Flüssigkeit überfüllt, sie leiden an Abgeschlagenheit und Mattigkeit und werden von Aufstossen und heftigem Kollern im Magen geplagt. Nimmt die Krankheit zu, so leiden die Kranken an Kälte des ganzen Körpers, heftigen Schmerzen, großer Atemnot und quälendem Durst. Wenn endlich infolge der hochgradigen Verstopfung kalter Schweiß und Harnbeschwerden sich einstellen, so steht der Tod bevor.

Die von Aretaios vorgetragene Pathologie dieser Krankheit deckt sich wieder mit Aetius IX 28; ihre Übereinstimmung ist sogar in diesem Falle eine so völlige³⁾, daß beide Capitel hier Platz zu finden verdienen:

Aret. caus. ac. m. II 6, 45.

Ἐντέροισι γίνεται μὲν φλεγμονή, ὀδύνην ὀλεθρίην ἐμποιοῦσα. θνήσκουσι γὰρ μυρίοι στρόφοισι καρτεροῖσιν. ἐγγίγνεται δὲ καὶ πνεῦμα ψυχρὸν, ἀργὸν, σῦτε κάτω περῆσαι ῥηΐδιον οὔτε ἄνω ἀνελθόμεναι· μίμνει δὲ ἐπιπολὺ ἐλίσσόμενον ἐν ὀλίγῃσι τῶν ἄνω ἐλίξεσι· τούνεκε καὶ τὸ πάθος ἐπικλήσιν ἔσχεν εἰλεόν.

Aetius.

Περὶ εἰλεοῦ καὶ χορδαψοῦ.
Ἀρχιγένους¹⁾.

Ὁ εἰλεὸς πάθος ἐστὶν ἐντέρων ὀδύνην ὀλέθριον ἐπιφέρον²⁾. Αἰτία δὲ τοῦ πάθους συνεχὴς διαφθορὰ σιτίων πολλῶν τε καὶ ποικίλων καὶ

1) Vgl. Paul. Aeg. III 44. 2) ἐπιφέρων P.

1) Vgl. Cael. Aur. a. a. O.

2) Vgl. Cels. IV 20. Hipp. περὶ νόσων III 304. Vgl. außerdem Orib. II 238. IV 493. 575.

3) Auf die Abhängigkeit des Aretaios von Archigenes in diesem Kapitel hat bereits Io. Ernestus Hebenstreit in einem Leipziger Programm vom Jahre 1757 aufmerksam gemacht: Aetii Amideni *Ἀνεκδότων* lib. IX c. 28 exhibens tenuioris intestini morbum quem ileon et chordapsum dicunt. Den Nachweis dieser Schrift verdanke ich Herrn Dr. H. Schöne.

Κῆν πρὸς τοῖς στρόφοις δὲ καὶ πίεσις καὶ μάλθαξις τῶν ἐντέρων ἔη, καὶ πούλν τὸ ὑπογάστριον ὑπερίσχη, χορδαψὸς τὸ τοιοῦτόν ἐστιν οὖνομα· [δ']¹⁾ ἔψησις μὲν γὰρ ἡ μάλθαξις· χορδὴ δὲ ἐντέρων ἐπώνυμον . . . αἰτίη τοῦ εἰλεοῦ συνεχῆς μὲν διαφθορὴ σιτίων πολλῶν τε καὶ ποικίλων καὶ οὐ ξυνηθέων, καὶ ἄλλη ἐπ' ἄλλη ἀπειψίη, μάλιστα δ' ἐπὶ τοῖσι πιμελώδεσιν²⁾, ὁκοῖόν τι μέλαν σηπίης. Οὐκ ἀδόκητος δὲ πληγὴ ἢ ψύξις ἢ ψυχροποσίη ἐφ' ἰδρῶτι, ἄδην ἢ χανδόν· καὶ οἷσι δὲ ἔντερον ἐς τὸν ὄσχεον ξὺν κόπρῳ κατέβη καὶ οὐκ ἀνώσθη ἐς τὴν κοιλίην, ἀλλ' ἀνελήφθη βίη, τουτέοισιν ἔθος ἐπιφλεγμαίνειν τὰ κάτω ἔντερα. Ξύνηθες δὲ τὸ πάθος παιδίοισιν, οἷσίπερ ἂν καὶ ἀπειψίη ἢ, καὶ τὸ βλάβος διαδιδράσκουσι μᾶλλον, [δὲ]³⁾ διὰ τε τὸ ἔθος καὶ τὴν ὑγρότητα τῶν ἐντέρων· ὀλισθηρὰ γάρ· γέροντες δὲ οὐ μάλα μὲν πάσχουσι, περιγίγνονται δὲ ἥκιστα. ὦρη θέρους τίκτει μᾶλλον ἥρος, φθινόπωρον δὲ χειμῶνος, ἀμφοῖν δὲ ἐπὶ μᾶλλον θέρους. Πολλοὶ⁴⁾ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις στρόφοις θνήσκουσιν αὐτίκα· μετεξετέροις δὲ καὶ πῦος ἐγγίγνεται, καὶ αὐθις μελανθὲν [τότε]⁵⁾ τὸ ἔντερον καὶ διασαπὲν ἐξέπεσε, καὶ οὕτως ἐξέλιπον. Ξύνεστι δὲ αὐτοῖσιν, εἰ μὲν ἐπιεικῆς <ὁ>⁶⁾ εἰλεὸς εἴη, πόνος ἐλίσσόμενος, στομάχου πλάδος, ἔκλυσις, μαλακίη, ξρεύξιες κεναὶ καὶ οὐδὲν ὠφελοῦσαι, κοιλίη ὑποβορβορίζουσα φύσησιν, ὁδοιπορίη μέσφι ἔδρης, διέξοδοι δὲ ἀτελέες. Ἦν δὲ ἐπίτασιν⁷⁾ ἰσχη ὁ

ἄσυνήθων¹⁾ καὶ μάλιστα τῶν καταπιμέλων· συνίσταται δὲ καὶ ἐπὶ²⁾ πληγαῖς τισι καὶ ἐπὶ ψύξεσιν ἰσχυραῖς καὶ ἐπὶ ψυχροῦ ἀθρόα πόσει, μάλιστα ἐφ' ἰδρῶτι παραλαμβανομένη. συμβαίνει δὲ καὶ οἷς ἔντερον εἰς τὸν ὄσχεον σὺν τῇ κόπρῳ κατέβη, εἴτα ἀνεθλίβη μετὰ βίας καὶ ἐκ τούτου ἐφλέγμηνε. Γίγνεται δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς τῶν δηλητηρίων πόσεσι καὶ ὑπὸ σκληρᾶς κόπρου περὶ τὰ λεπτὰ ἔντερα ἐνσχεθείσης³⁾. Ἐφ' ἐνὸς δὲ τόπου τῆς ὁδύνης ἐνερειδούσης περὶ τὰ λεπτὰ τῶν ἐντέρων⁴⁾, ὡς σκληρίαν ὑποπίπτειν τῇ ἀφῇ, χορδαψὸν ἰδίως ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι, τοῦτ' ἐστι μάλθαξιν ἐντέρων, καὶ πολλοὶ ἐπὶ ταῖς ὁδύναις θνήσκουσιν αὐτίκα. Ἐτέροις δὲ διαπυΐσκειται⁵⁾ ἡ φλεγμονὴ καὶ αὐθις μελανθὲν τὸ ἔντερον καὶ διασαπὲν ἐκπίπτει καὶ οὕτως ἐκλείπουσι. σύνηθες δὲ τὸ πάθος παιδικῇ ἡλικίᾳ, ἐκφεύγουσι μέντοι διὰ τὴν φυσικὴν ὑγρότητα, γέρουσι δὲ οὐ πάνυ μὲν σύνηθες· ἔαν⁶⁾ δὲ περιπέσωσι τῷ πάθει, οὐ μάλα περιγίγνονται. παρέπεται δὲ τοῖς κάμνουσιν ὁδύνη περιειλουμένη, στομάχου πλάδος, ἔκλυσις, ξρυγαὶ κεναὶ μηδὲν ἐπικουφίζουσαι, βορβορυγμοὶ⁷⁾ τῶν ἐντέρων, ἐποχὴ παντελὴς κόπρου καὶ πνευμάτων. εἰ δὲ ἐπίτασιν λάβοι τὸ πάθος, πάντα ἀνέκφορα⁸⁾ γίγνεται· διὸ καὶ ἔμετος φλέγματος καὶ χολῆς, ψύξις τοῦ παντὸς σώματος, πόνος πολὺς καὶ⁹⁾ δύσπνοια. Εἰ δὲ καὶ θνήσκειν μέλλουσιν, ἰδρῶς ψυχρὸς καὶ δυσουρία, ὅ¹⁰⁾ δακτύλιος

¹⁾ Wil. ²⁾ Hds.: εἰλεώδεσι verbessert von Wig. ³⁾ Wil. ⁴⁾ Erm. Hds. πολλοῖσι. ⁵⁾ Erm. τε τὸ ἔντερον. ⁶⁾ Erm. ⁷⁾ Hds.: ἐπὶ πᾶσιν. Vgl. Aetius.

¹⁾ συνήθων W. ²⁾ ἐν P. ³⁾ ἐνσχεθείσης W. ⁴⁾ Die Worte ὡς — ἐντέρων fehlen in P. ⁵⁾ διαπυΐσκει W. P. ⁶⁾ εἰ W. ⁷⁾ βορβορυγμόν W. ⁸⁾ ἀνώφορα P. ⁹⁾ fehlt in P. ¹⁰⁾ fehlt in P.

ελλεός, πάντων ἄνω ἢ φορὴ, πνευμά-
των, φλέγματος, χολῆς. Ἐμοῦσι γοῦν
τάδε· ἔξωχοι, ψυχροὶ τὸ πᾶν σκῆ-
νος· πόνος πούλῦς, ἀναπνοὴ κακὴ,
διψαλέοι. Ἦν δὲ καὶ θνήσκειν μέλ-
λωσιν, ἰδρὼς ψυχρὸς, δυσουρίη,
ἔδρη ἀπολελημμένη, ὥς μηδὲ ἰσχνὸν
ἔλασμα διελάσαι, κόπων ἔμετοι κτλ.

ἔσφιγμένος, ὥς μηδε πυρῆνα μύλης
σχεδὸν ὑποδέχεσθαι· ἐνίοτε δὲ¹⁾
καὶ κόπος ἀνεμεῖται.

¹⁾ fehlt in P.

Trotz dieser fast wörtlichen Übereinstimmung beider Autoren ist die naheliegende Annahme der Benützung des Aretaios durch Aetius deshalb unzulässig, weil der Bericht des Aetius den keineswegs nebensächlichen Zusatz aufweist, daß auch der Genuß von Gift und verhärtete Kotmassen die Ursache der Krankheit bilden können¹⁾. Daß dieser Fall in der Quelle vorgesehen war, beweist der Umstand, daß Aetius im folgenden für denselben Verhaltensmaßregeln giebt und Recepte anführt²⁾. Beide Berichte erscheinen demnach einander gegenüber als selbständig: als Quelle hat der Mann zu gelten, den Aetius als Quellenschriftsteller nennt, Archigenes. Nach meiner obigen Darlegung ist soviel sicher, daß Aetius ihn nicht selbst eingesehen hat. Die Frage aber, woher er sein Excerpt entlehnt hat, vermag ich nicht zu entscheiden: man hat die Wahl zwischen Philumenos und Philagrios. In der Therapie ist der Bericht des Aetius wieder reichhaltiger und erschöpfender, die Darstellung des Aretaios³⁾ dagegen kürzer und flüchtiger. Die Hauptquelle des Aetius ist Archigenes, es folgt dies bei der engen und unlösbaren Zusammengehörigkeit einfach mit Notwendigkeit aus dem Archigenescitat. Daneben hat er wie gewöhnlich in der Therapie dieser Krankheit den Oribasius für mehrere Recepte benützt. Charakteristisch für seine Arbeitsweise ist es, daß er da, wo seine Hauptquelle Archigenes wieder einsetzt, diesen mit Namen anführt.

Ist eine Entzündung vorhanden, so empfehlen beide übereinstimmend den Aderlaß. Leidet der Kranke dagegen an Verstopfung, so verwerfen sie den Aderlaß und verordnen Brechmittel, Abführmittel, Einreibungen des Afters, Klystiere, zu denen sie Pflanzen-

¹⁾ Auch Soran führte den Genuß von Gift unter den Ursachen des ελλεός auf: vgl. Cael. Aur. A. M. III 17, 171. Vgl. Orib. IV 575.

²⁾ Aet. IX 28 p. 514 Cornarius.

³⁾ Aret. cur. acut. morb. II 5 p. 271.

säfte, schleimige Abkochungen, Öl, Honig und Ysop verwenden, warme Bähungen der leidenden Teile, Cataplasmen, Schröpfköpfe, die auf den Unterleib zu applicieren sind, ferner schmerzstillende Mittel wie das Theriak des Andromachos, und wenn der Schleim nicht nachläßt, weder Blähungen abgehen noch Stuhlgang erfolgt, die Hiera, die entweder das Erbrechen von Schleim und Galle herbeiführt oder den Kot nach unten abführt. Bezeichnend ist die enge Berührung beider Berichte an der Stelle, wo Archigenes von Aetius ausdrücklich als Quelle genannt wird. Ich setze die beiden Stellen her:

Aret. cur. ac. m. II 5, 273:

Προπίνειν δὲ κυμίνου ῥ' πηγάνου ἀφεψήματος καὶ [τοῦ]¹⁾ σίνωνος ἢ ξὺν τούτοισι τῶν φαρμάκων τῶν ἀνωδύνων τινά· μυρία δὲ ἄλλοισιν ἄλλα πείρη γεγόνασιν πιστά. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ δι' ἐχιδνῶν φάρμακον, μέζον τοῦ μέτρου πρὸς τὸ ξύνηθες ποθέν. Ἦν δὲ μήτε ὁ πόνος ἐνδιδῶ μήτε φῦσα μήτε κόπριον ἀναδοθῇ, τοῦ καθαριτηρίου τῆς ἱερῆς ὑπ' ἀνάγκης διδόναι· ἢ γὰρ ἀπηλάθῃ ξὺν φλέγματι καὶ χολῇ τὸ φάρμακον ἢ διήλθῃν ἐξάγον φύσας, σκύβαλα, φλέγμα, χολήν, τοῦ κακοῦ τὰς ἐντάσιαις.

¹⁾ Wil.

Aetius.

Ἐχρησάμεθα ἐπιτυχῶς ἐπὶ τῶν ἀφλεγμάντων εἰλεῶν, φησὶν Ἀρχιγένης, καὶ τῇ διὰ κολοκυνθίδος ἡμετέρα ἱερᾷ < β', ἐνίοτε δὲ καὶ γ' εἰς καταπότια ἀναπλάσαντες· ἢ γὰρ ἐξεμεῖται τὸ φάρμακον μετὰ φλέγματος πολλοῦ καὶ χολῆς ἢ ὑπελθὼν κατ' ἔντερον συνυπεξάγει ἑαυτῷ τὰ τὴν διάθεσιν ἐργαζόμενα αἷτια πάντα. Ἐμμενόντων δὲ τῶν ἀλγημάτων καὶ μάλιστα ἐφ' ὧν οἱ ἐνιέμενοι κλυστῆρες οὐχ ὑπεξέρχονται, διδόναι καὶ τὰς ἀνωδύνους¹⁾ καὶ τῷ πάθει ἀρμοζούσας²⁾ ἀντιδότους εἰς κοίτην. κοινὴ μὲν οὖν καὶ ἀρίστη ἢ διὰ δυοῖν³⁾ πεπέργων (Orib. IV 576) καὶ ἡ Ἀνδρομάχου δι' ἐχιδνῶν θηριακὴ . . .

¹⁾ τῶν ἀνωδύνων P. ²⁾ ἀρμοζόντων P. ³⁾ δύο W. Vgl. Orib. IV 576

Unter *πλευρῖτις* versteht Aretaios ¹⁾ eine Entzündung der dünnen, die Rippen bekleidenden Haut, die mit Fieber, Husten, verschiedenartigem Auswurf und heftigen, bis zum Schlüsselbein sich erstreckenden Schmerzen verbunden ist. Er betont dabei, daß nur in dem Falle, wenn diese Erscheinungen in ihrer Gesamtheit auftreten und auf derselben Ursache beruhen, diese Krankheit vorliege. Als ihre Symptome bezeichnet er Atemnot, Schlaflosigkeit, Appetit-

¹⁾ Aret. caus. acut. m. I 10 p. 20.

losigkeit, Röte der Wangen, trockenen Husten, Auswurf von galligen oder stark mit Blut gemischten Schleimmassen. Eine schlechte Prognose stellt er, wenn der blutige Auswurf nicht aufhört, weil sich in diesem Falle Delirien, Schlafsucht und Phantasieren einstellen. Tritt keine Genesung ein, so bildet sich ein Empyem, das an dem Frostschauder und den stechenden Schmerzen kenntlich sei. Vergleichen wir hiermit die Beschreibung, die Soran¹⁾ von dieser Krankheit giebt, so läßt sich die enge Berührung beider Berichte nicht verkennen; ja die Angaben des Soran über die Symptome decken sich mit Aretaios in dem Maße, daß ich den Schluß nicht von der Hand zu weisen wage, daß sich beide in der Pathologie der Krankheit derselben Quelle angeschlossen haben. Besonders hervorheben will ich die Wiederkehr der Notiz bei Soran, daß der Kranke nicht auf der gesunden Seite zu ruhen vermag, weil der Druck der entzündeten Membran den Schmerz vermehre²⁾, ferner daß die Krankheit häufig in Lungenentzündung übergehe oder sich zum Empyem entwickle und daß sich in diesem Falle Schüttelfrost und stechender Schmerz einstellen. Endlich mag darauf hingewiesen werden, daß beide in den Angaben über die Disposition der verschiedenen Alter und Jahreszeiten zu dieser Krankheit übereinstimmen³⁾.

Weit zwingender ist der Beweis, der sich für die Abhängigkeit der Therapie des Aretaios von einer älteren Quelle mit Hilfe des Aetius (VIII 68) erbringen läßt. Gleichzeitig werden wir dadurch in den Stand gesetzt, die gemeinsame Quelle zu benennen.

Die Behandlung leitet Aretaios mit einem Aderlaß ein, er empfiehlt eine Ellenbogenvene zu öffnen, jedoch nicht an der kranken Seite. Auch warnt er vor übermäßiger Blutentziehung, weil in diesem Falle die Gefahr entsteht, daß eine Lungenentzündung hinzutritt. Er rät den Aderlaß an demselben Tage zu wiederholen, wenn das Befinden des Kranken es gestattet und wenn eine längere Remission des Fiebers eingetreten ist; sonst empfiehlt er bis zum nächsten und übernächsten Tage zu warten. Zum äußeren Gebrauch bedient sich unser Autor eines mit warmem Öl angefeuchteten Wollumschlages, in dem Raute oder Dill abgekocht ist, und Übergießungen

¹⁾ Cael. Aur. A. M. II 14, 80.

²⁾ Aret. a. a. O. 20. Cael. Aur. a. a. O. 80.

³⁾ Aret. 23. Cael. Aur. A. M. II 13, 79f.

mit Öl. Außerdem wendet er Cataplasmen, erweichende Pflaster, Bähungen und Salben an, empfiehlt Schröpfköpfe und Klystiere. Das Heilverfahren des Aetius stimmt mit dem des Aretaios fast völlig überein. In erster Linie wendet er den Aderlaß an mit derselben Beschränkung wie Aretaios:

Aret. cur. ac. m. I 10, 232.

Μάλιστα μὲν ὧν αὐτῆμαρ φλέβα
τάμνειν· ἦν δὲ ἀπὸ πλήσιος σίτων
καὶ ποτῶν ἔη, ἐπ' ἀσιτίης μίαν ἡμέ-
ρην φυλάξαντα, ἀφαιρέειν ἀπ' ¹⁾ ἀγ-
κῶνος τῆς ἐν τῷ κοίλῳ φλεβὸς· τοῦ
μὲν ²⁾ κατ' ἔξιν τῇσι ἐτέρησι πλευ-
ρῇσι· κρέσσον γὰρ ἀπωτάτω ἄγειν.
Τὸ δὲ πληθὺς μὴ μέχρ' ἐλπιθοθυμίας·
περιπνευμονίην γὰρ ἐπιφοιτῆσαι
κίνδυνος, ἦν τὸ σῶμα ἐπιψυχθὲν τὴν
ψυχὴν ἐκλείπει. εἴσω γὰρ τὰ ὑγρὰ
ξυμβέει, τῆς ἐκτὸς ἀφαιρεθέντα θερ-
μῆς τε καὶ τάσιος, πνεύμων δὲ μα-
νός τε καὶ θερμὸς καὶ ἐς ὀλκὴν δυνα-
τώτατος· πλευρῶν τε γειτόνημα πνεύ-
μων καὶ κοινωνὸς ἀλγέων· ἀτὰρ καὶ
αἱ τοῦδε διαδέξεις οὐ μάλα περιγίγνον-
ται... χρὴ ὧν ἐπὶ ξυμμέτρῳ τῇ ῥοῇ
τοῦ αἵματος μεσηγὺ τὸν ἄνθρωπον
ξυλλέξαντα αὐθις ἀφαιρέειν, εἰ μὲν
εὖ ἔχοι, αὐτῆμαρ, τῆς ἐπανεσίος μα-
κρῆς γιγνομένης· ἦν δὲ μὴ, τῆς
ὑστέρης...

¹⁾ ὑπ' Hds. ²⁾ Wil. μὴ Hds.

Aetius VIII 68:

Nach einem kurzen Excerpt aus Galen (XIV 445. Orib. V 473) fährt unser Autor also fort:

Ἐπὶ ¹⁾ δὲ τῶν ὀξέως νοσοῦτων, ὡς
ποείρηται, εἰ ²⁾ περὶ ³⁾ μαζὸν καὶ ⁴⁾
κλεῖδα εἴη τὸ ἄλγημα, τέμνειν χρὴ
τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα, μὴ τοῦ κατ'
εὐθὺ ⁵⁾ βραχίονος τῆς φλεγμαινούσης
πλευρᾶς, ἀλλὰ τῆς ἀντικειμένης χει-
ρός· τὸ ⁶⁾ κενούμενον δὲ πληθὺς μὴ ⁷⁾
μέχρ' ἐλπιθοθυμίας· κίνδυνος γὰρ ἐκ
τούτου περιπνευμονίαν ἐπιγίγνεσθαι
ψυχομένου σφόδρα ⁸⁾ τοῦ σώματος.
ὁ πνεύμων γὰρ ⁹⁾ ἄραιος καὶ θερ-
μὸς ὑπάρχων καὶ γειτνιῶν τῷ πλευρῷ
ἐτοιμῶς τὴν νόσον ὑποδέχεται. χρὴ
οὖν καὶ ¹⁰⁾ σύμμετρον ἀφαιρεῖν καὶ
διαστήματος ἱκανοῦ γινομένου πάλιν
ἐπαφαιρεῖν σύμμετρον. εἰ δὲ φόβος
εἴη λειποθυμίας, τῇ ἐξῆς ἐπαφαιρεῖν.

¹⁾ Am Rande von W. steht: τοῦτο ἐναντίον τῷ Γαληνῷ. Am Rande von P. und in der ed. Ἀρχιγένοους. ²⁾ W. ed. P.: εἰ καί. ³⁾ W. ed. P.: περὶ τόν. ⁴⁾ W. ed. P.: ἢ τήν. ⁵⁾ W. ed. P.: κατέξιν. ⁶⁾ W. ed. P.: τὸ δέ. ⁷⁾ fehlt in P. ⁸⁾ W. ed. σφοδρῶς P. ⁹⁾ W. ed. πνεύμων δέ P. ¹⁰⁾ fehlt in P.

Dann sucht er den Leib durch Klystiere von den überflüssigen und schädlichen Säften zu befreien. Er empfiehlt ein Klystier aus Rautenöl, Terpentinharz und Butter, Aretaios beschränkt sich auf Rautenöl:

Aretaios 239:

χρὴ δὲ μηδὲ τὴν κάτω ἰητρείην
ὑπερορῆν, ἀνδράσι μὲν ἐς τὸ ἔντερον
πηγάνινον ἔλαιον ἐγχέοντα, γυναιξὶ
δὲ καὶ ἐς ὑστέρην.

Aetius:

ἔπειτα κλύζειν τὴν κοιλίαν· εἰ δὲ
μηδὲ οὕτω φέροιτο, ἐνέματι χρῆσθαι
ἀνυπερθέτως διὰ πηγανίνου ἑλαίου
ἐντακείσης αὐτῷ τερεβινθίνης καὶ
βουτύρου.

Ferner bedient sich unser Autor zum äußeren Gebrauch der warmen Bähungen, aus warmem Öl bestehend, in dem Raute, Dill und Alkannablüte abgekocht sind, und aufgelegter Schwefelwolle, die mit warmem Öl angefeuchtet ist.

Aretaios 233, 9:

ἐπὶ δὲ τῇ πλευρῇ καὶ ἔριον θέντα
μαλθακὸν ξὺν ἀλείφαι θερμῷ πη-
γάνου ἢ ἀνήθου ἀφεψήματος· καταιο-
νῆν δὲ τὸ πλευρὸν εὖ μάλα προση-
νέως.

236, 16: ἐπὶ δὲ τῷ πλευρῷ κέεσθαι
χρὴ ἔρια θυμιαθέντα θείῳ, λίπα
δεδευμένα, ἐνθα ἄνηθον ἔψηται ἢ
πήγανον, ξυνεχὲς δὲ τούτοις τὸ
πλευρὸν καταιονῆν . . .

Aetius:

ἔπειτα καταιονᾶν ἔξωθεν τὴν
πλευρὰν ἐλαίῳ θερμῷ, ἐν ᾧ πήγανον,
ἄνηθον, κύπρου ἄνθος ἐναφέψηται·
καὶ ἔριον τεθειωμένον ἢ αὐτὸ τὸ
θεῖον [ἔχον] ἐμπεπασμένον λεῖον
(λίνῳ W.) βρέχων (βρέχον P.) τῷ
θερμῷ ἐλαίῳ καὶ θυμοῦ θερμοῦ
λειοτάτου βραχὺ ἐμπάσας ἐπιτίθει
καὶ ἐπίδησον κούφως καὶ συνεχῶς.
Τῇ ἐμβροχῇ ταύτῃ κέχρησο μέχρι
τῆς τρίτης ἡμέρας, τῇ δὲ τετάρτῃ
κατάπλασμα προσαγέσθω διὰ γύρεως
καὶ λινοσπέρμου (λινοσπέρματος W.)
καὶ μέλιτος καὶ ἑλαίου πηγανίνου·
ἔστω δε πᾶν κοῦφον τὸ κατάπλασμα.

In der Zahl der Cataplasmata und der zusammengesetzten Mittel ist Aetius reichhaltiger; auch seine Angaben über die Bestandteile der einzelnen Mittel sind vollständiger. Zum ersten Cataplasma, das nach Aretaios (237, 4) aus Trespenmehl (αἰρώων ἄλευρον, Mehl von Lolium temulentum), Erysimon und aufgestreutem Natron besteht, fügt Aetius noch Bockshornklee (τῆλιν, Trigonella Foenum graecum) hinzu. Für den Fall, daß die Krankheit in Eiterung überzugehen droht, setzen beide dem Cataplasma Senf und Kachrys-Samen (κάγχρυς, Cachrys Libanotis) zu, Aetius außerdem Semen Cardamomi, Bertram (πύρεθρον Anthemis Pyrethrum) und Irismehl mit einem Zusatz von Wachs, Asphalt und Öl. Beide empfehlen zur Erwärmung der Cataplasmata warmes Öl in Blasen anzuwenden. Die Vorschriften über die Verwendung der Schröpfköpfe werden von

ihnen völlig übereinstimmend gegeben. Von den vier zusammengesetzten Mitteln kehren drei bei Aetius zum Teil in gröfserer Ausführlichkeit wieder:

1. Aret. 240, 4: Ἦν δὲ μὴ τροφῆς καιρὸς ἔη, ἔστω δὴ τι καὶ τῶν ποικίλων πικέριον ξὺν μέλιτι ἐψηθὲν ἐς σύστασιν.

Er empfiehlt dies Mittel zu Kugeln zu formen, sie unter die Zunge zu legen und zerfliessen zu lassen.

2. Aret. 240, 9 = 237, 1 fehlt bei Aetius.

3. Aret. 240, 12: ἀσίτω δὲ τὰ φαρμακώδεα· κνίδης καὶ λίνου τοῦ σπέρματος καὶ ἀμύλου καὶ κώνου τοῦ κοκκάλου λείου ἐκάστου κύαθον· καὶ ἀμυγδάλων τῶν πικρῶν πέντε καὶ εἴκοσι τὸν ἀριθμόν· τόσοι δὲ καὶ πεπέρσιος κόκκοι. φωχθέντα δὲ χρὴ λεῖα μέλιτι ἐς ἀνάλειγμα (Wil.) φυρῆν· τῶν δόσις μυστίλη μίη.

4. Aret. 240, 17: ἦν δὲ ὑγρὰ καὶ ἄπεπτα ἀνάγη, σμύρνης ὀλκῆς < δύο, κρόκου μία, πεπέρσιος κόκκοι δεκαπέντε, μέλιτος (Erm. cod. μέλιτι) φυρῆναι λίτροι μιῇ.

Aetius:

1. βούτυρον νεαρὸν μετ' ἴσου μέλιτος ἐψησας δίδου κοχλιάριον α'.

Unmittelbar vorher geht das dritte:

3. ἔκλειγμα ἐπιτήδειον τὸ τοιοῦτο· κνίδης σπέρματος, λινοσπέρμου, στροβίλων, ἀμύλου ἀνὰ κύαθου α', ἀμύγδαλα πικρὰ λελεπισμένα κε', πεπέρσιος κόκκοι λ' φρύξας ἐπ' ὀλίγον τὰ στροβίλια καὶ τὸ λινόσπερμον, εἴτα κόψας σήσας τὰ ἄλλα καὶ ἀναλαβὼν μέλιτι ἐψησας δίδου κοχλιάριον α' νήσται ἔκλειγμα¹⁾.

4. εἰ δὲ ὑγρὰ καὶ ἄπεπτα ἀνάγει, ἀρμόδιον τοῦτο· σμύρνης τρωγλίδος < β', κρόκου < β', πεπέρσιος κόκκοι ιε', μέλιτος ἀπηφρισμένου λι. α', ἀναλαβὼν δίδου κοχλιάριον τὸ ι' (S P.)²⁾.

¹⁾ Vgl. Gal. XIV 446.

²⁾ Dieses Mittel ist eine Erfindung des Apuleius Celsus, des Lehrers des Scribonius Largus. Vgl. Scrib. Larg. c. 94.

Eingehende Prüfung hat also ergeben, daſs der Bericht des Aetius durchgehends reichhaltiger ist. Demnach ist an Aretaios als Quelle desselben schlechterdings nicht zu denken; wir sind vielmehr zu der Folgerung gezwungen, daſs beide dieselbe Quelle benützt haben. Der Name der Quelle Ἀρχιγένης steht bei Aetius in P. am Rande und in der editio princeps (p. 175 b 30).

Die Ärzte der nachchristlichen Zeit unterschieden drei Arten von Kopfschmerz, den acuten oder die κεφαλαλγία, den chronischen oder die κεφαλαία und den halbseitigen oder ἡμικρανία, ἑτεροκρανία. Daſs die ältere Zeit diese Unterscheidung nicht kannte, beweist Celsus¹⁾, der unter κεφαλαία den acuten Kopfschmerz ver-

¹⁾ Cels. IV 2, 12.

steht und den langwierigen *ὕδροκέφαλος* nennt. Nach unserer Überlieferung ist Archigenes der erste, der diese Unterscheidung kennt¹⁾, nach seiner Zeit kehrt sie bei Soran²⁾, Galen³⁾, Alexander von Tralles⁴⁾ und den späteren Compilatoren wieder. Mit gewohnter Ausführlichkeit behandelt Aretaios⁵⁾ die Therapie der *κεφαλαία*, die zugleich für die Hemikranie gilt⁶⁾. Er eröffnet sein Verfahren mit dem Aderlaß; darnach empfiehlt er, um den Krankheitsstoff vom Kopfe zu entfernen, starke Purgirmittel, vor allem die Hierä, Klystiere, ferner die Arteriotomie und Schröpfköpfe. Zur Beseitigung des Schleimes wendet er Niesmittel (*πταρμικά*) und solche Mittel an, welche den Schleim durch den Mund abführen (*ἀποφλεγματισμοί*): als Niesmittel empfiehlt er Pfeffer, Wurzel vom Seifenkraut (*στρούθιον*), Bibergeil, denen er, um die Wirksamkeit zu erhöhen, Euphorbiumharz, Mostöl (*ἔλαιον γλεύκινον*), sikyonisches Öl und Styraxsalbe zusetzt, als *ἀποφλεγματισμοί* Senf, Samen von Daphne Gnidium (*οἱ Κνίδιοι κόκκοι*), Pfeffer und Läusekraut (*σταφὶς ἀγρία*), die er entweder kauen oder in einer Mischung mit Wasser und Honiggemisch zum Gurgeln verwenden läßt. Um die Transpiration zu befördern, rät er den Kopf mit warmem Wasser zu baden und zu übergießen. Besteht die Krankheit nach Anwendung dieser Mittel fort, so bedient er sich, nach voraufgegangenem Scheeren des Kopfes, der Cauterisation, unter Umständen bis auf den Knochen mit sorgfältiger Vermeidung der Muskeln, der Incisionen in die Kopfhaut, ebenfalls bis auf den Knochen und der Trepanation, ferner empfiehlt er reizende und ableitende Mittel wie Senf- und Pechpflaster, endlich als letztes und kräftigstes Mittel den Gebrauch von Nieswurz. Große Aufmerksamkeit widmet er der Diät und Lebensweise: alle scharfen Speisen verwirft er, ebenso alle den Kopf beschwerende Nahrung, während wohlriechende, urin- und blähungtreibende Gerichte von ihm empfohlen werden. Außerdem soll der Kranke sich viele Bewegung verschaffen, gymnastische Übungen vornehmen, fahren, reiten, besonders aus kalten Gegenden in warme und aus feuchten in trockene, baden und den Geschlechtsgegnuß vermeiden.

1) Gal. XII 533. 565. 593. Aet. VI 50.

2) Cael. Aur. M. Ch. I 1.

3) Gal. VIII 204f.

4) Alex. v. Tr. I 465 f. P. nach Galen.

5) Aret. cur. chr. m. I 1 p. 293. 6) Aret. 302.

Diese Vorschriften tragen durchaus das Gepräge der therapeutischen Doctrin des Archigenes. Der Zufall hat es gefügt, daß uns von einer Kopfkrankheit, dem Schwund des Gedächtnisses, die Therapie des Archigenes¹⁾ erhalten ist, die sich in den Hauptmomenten mit unserer Darstellung deckt. Archigenes empfiehlt in erster Linie den Aderlaß, der ja überhaupt zu den wichtigsten Grundlagen seiner Therapie gehört, doch warnt er wie Aretaios vor einer übermäßigen Blutentziehung und rät ihn lieber zu wiederholen. Diese Vorschriften über die Anwendung des Aderlasses decken sich mit denen, die er für die Behandlung der *πλευρῖτις* erteilt²⁾. Bei Galen heißt es (VIII 150): *ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν αὐτῆς (sc. ἐπιστολῆς πρὸς Μάρσον) μετὰ τὸ προοίμιον, ὁπότε τῆς θεραπεύσεως ἀρχεσθαι μέλλει, γέγραπται ταῦτα κατὰ λέξιν· „ἀφαίρεσιν μὲν οὖν αἵματος σύμμετρον καὶ ἐπαφαίρεσιν πεποιῆσθαι ἡμᾶς ἀρχομένης τῆς ἀποθλίψεως πέπεισμαι (?), εἰ μὴ τις ἀσθένεια γέγονεν ἐμποδών.“* Bei Aretaios 293, 18: *ξυντεκμαιρόμενον δὲ τὴν δύναμιν τὸ πλῆθος ἀφαιρέειν. ἄριστον δὲ μὴ ἐσάπαξ, ἢν' (Wil. ἦν Hds.) ἡ δύναμις τε ἀνέχεται τὴν πληθὺν τῆς ἀφαιρέσεως συνεχές τε τοῖσιν αὐτοῖσι μοχλεύεται ἢ νοῦσος.* Dann läßt Archigenes wie Aretaios den Kopf scheeren, Schröpfköpfe applicieren, trockene und solche mit Skarification, wobei er ebenfalls darauf aufmerksam macht, daß die mit Skarification wirksamer seien (Gal. VIII 154. Aret. 294). Für besonders wirksam erklärt er das Übergießen des Kopfes mit lauem Wasser und gebrauchte zur Abführung des Schleimes *ἀποφλεγματισμοί* aus Senf, Kresse, Samen von Daphne Gnidium und Läusekraut bestehend und Niesmittel (Gal. VIII 153. Aret. 295. 296). Cauterisation, Incisionen in die Kopfhaut wandte er ebenfalls an (Gal. VIII 154. Aret. 298), endlich läßt er das Senfpflaster applicieren (Gal. VIII 158. Aret. 299). Über das letzte Mittel, das von der methodischen Schule herrührt und den Zweck hat, die Metasynkrise herbeizuführen, hat Archigenes³⁾ eingehend gehandelt, es ist sogar ausdrücklich bezeugt, daß er es gegen chronischen Kopfschmerz und *ἐτεροκρανία* empfohlen habe.

1) Gal. VIII 150f. Er behandelte diese Krankheit im ersten Buch seiner Briefe in einem Brief an Marsus.

2) Aet. VIII 68 = Aret. 232. Vgl. Archigenes bei Aetius VIII 47.

3) Aet. III 181 = Antyll bei Orib. II 410f.

Aet. III 181: τὰ δ' ἄλλα πάντα μέρη τοῦ σώματος καὶ πάθη <χρόνια vgl. Orib. II 411> χαίρει τῷ βοηθήματι. ἔξαιρέτως δὲ τῇ κεφαλῇ ἐν ταῖς χρονίαις κεφαλαλγίαις καὶ ἑτεροκρανίαις ὁμοίως . . . ἐπιτήδειος . . .

Noch wichtiger aber ist die Übereinstimmung des Aretaios mit der kurzgefaßten Therapie, die Archigenes in seiner pharmakologischen Hauptschrift *περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων* von dieser Krankheit gegeben hat¹⁾. Er empfahl bei jedem Kopfschmerz, der nicht mit Fieber verbunden ist: Wasser, wenig Nahrung und Abführmittel: *κοινῶς ἐν ἀρχῇ ποιεῖ ὑδροποσία, ὀλιγοσιτία, κοιλίας ἐκλυσις*. Aret. 299, 13: *δίαιτα δὲ ἥ μὲν ἐφ' ἐκάστῳ τῶν ἀλγέων λεπτή, ὀλιγοσιτίη (ὀλιγοποτίη Hds.) καὶ ὑδροποτίη ἐπίπροσθεν μάλιστα ἄκεός τινος*. Ferner die Hiera (Gal. XII 537. Aret. 294), deren Dose 4 oder 5 Drachmen betrage (Gal. XII 450 Aret.), als *ἀποφλεγματισμοί* in Übereinstimmung mit Aretaios Senf, Ysop und Läusekraut (Gal. XII 565. Aret. 296). Außerdem wendet er Aderlaß an, indem er entweder eine Stirnvene öffnet oder aus den Venen im Innern der Nase Blut entzieht (Gal. XII 570. Aret. 294, 10. 297, 2) und Schröpfköpfe auf den Hinterkopf (Aret. 294, 13. Er nimmt wie Aretaios die Blutentziehung von den leidenden Teilen (Aret. 294, 11). Auch Cauterisation und das Applicieren eines Senfpflasters spielt bei ihm eine Rolle (Gal. XII 571. Aret. a. a. O.).

Vergleichen wir jetzt die Darstellung des Aretaios mit der von Aetius²⁾ erhaltenen Behandlung dieser Krankheit durch Archigenes, so wird jeder Zweifel an der Abhängigkeit des Aretaios von ihm schwinden. Ich hebe besonders hervor, daß beide die Arteriotomie empfehlen und zwar der Arterien hinter und vor den Ohren, daß von beiden die Cauterisation angewandt wird bis auf den Knochen, bei welcher Gelegenheit beide vor Verletzung der Muskeln warnen, daß bei beiden die Incision in die Kopfhaut oberhalb der Stirn als wirksames Mittel wiederkehrt, daß beide den weißen Helleboros für das letzte und kräftigste Mittel ansehen, daß endlich von beiden dieselben Diätvorschriften gegeben werden.

¹⁾ Gal. XII 533 f.

²⁾ Aet. VI 50 mit der Überschrift: *κοινὴ θεραπεία κεφαλαίας καὶ ἡμικρανίας ἐκ τῶν Ἀρχιγένους*.

295, 1: ἡ δὲ ἐς ὠτειλὴν ἦκη τὰ τρώματα, τὰς ἀρτηρίας ἐκτάμνειν. διπλαῖ δὲ, αἱ μὲν κατόπιν εἰσὶν ὧτων σμικρόν τι προσωτέρω, δῆλαι δὲ ταῖς διασφύξεσιν, αἱ δὲ τοῦ ὠτός ἐς τοῦμ- προσθεν, αὐτῶν πλησίον . . .

297, 16: ἦν δὲ ἐπὶ τούτοις ἡ κεφαλαλγία μέμνη, ἦν τε ἀποπαύηται, αὐτὸν χρὴ ἐς τέλος ἦκειν τῆς ἱητρείας· φιλυπόστροφον γὰρ κακὸν καὶ ἐν ἔδρῃ ἴσον τὰ πολλὰ φωλεύει. χρὴ ὦν ἀφαιρέοντα τὰς κόμας ξυρῶ — καὶ γὰρ τόδε κεφαλῇ ὀνηϊστόν — καίειν πυρίῃσι καυτήρων, ἐπιπολῆς μὲν ἐς μύας· ἦν δὲ μέσφι ὀστέου ἐθέλης, ἀπάνευθεν καὶ τῶν μυῶν· μύες γὰρ καυθέντες ἔασι σπασμῶν προκλήσεις ἔταμόν τινες ὑπὲρ μέτωπον κατὰ τὴν στεφάνην τὸ δέρμα ἄχρις ὀστέου καὶ τόδε ἐπιξέσαντες ἡ ἐπικόψαντες μέσφι διπλόης ἐς σάρκωσιν ἤγαγον. οἱ δὲ καὶ ἐσείρωσαν [τῷ ὀστέῳ]¹⁾ μέσφι μήνιγγος. εὐτολμα δὲ τὰ ἄκεα, ἀλλὰ χρῆσθαι, κῆν ἐπὶ πᾶσι μὲν ἡ κεφαλαλγία ἐπιμίμνη, ὁ δὲ νοσέων εὐθυμος ᾗ ὁ τόνος τοῦ σώματος ἀγαθός.

302, 4: ὁκόσοις δὲ ἐκ τῶνδε ἀφυκτος ἡ νοῦσος, ἐλλεβόρῳ χρῆσθαι, τῇ ἐσχάτῃ καὶ δυνατωτάτῃ πάντων ἀγωγῇ.

299, 15: ξύμπαν δὲ δριμέων μὲν ἄφρεσις, κρομμύων καὶ σκορόδων καὶ ὁποῦ τοῦ σιλφίου· σίνηπος δὲ μὴ πάγχυ. καὶ γὰρ τὸ δριμὺ αὐτοῦ πρὸς τῇ τοῦ στομάχου ἀρετῇ καὶ ἐς κεφαλὴν οὐκ ἄχαρι, φλέγμα χέον καὶ διαπνέον ἢ διελαῦνον κάτω. . . . Κρέσσων ἡ ἡδύοσμος ἡ βοτάνη καὶ γλήχων· πρὸς γὰρ²⁾ τοῖσιν εὐώδεσιν ἴσχουσί τι καὶ οὖρων ἀγωγὸν καὶ

Ἐπιμενούσης δὲ τῆς διαθέσεως, τέμνειν τὰς περὶ τὰ ὦτα ἀρτηρίας καὶ μαλίστα τὰς ἐν κροτάφοις. ἐχρήσαντο δὲ τινες ἐπὶ κεφαλαίας καὶ καύσει βαθείᾳ, φυλαττόμενοι μόνον μή τις τῶν μυῶν ὑποπέσῃ τῷ καυτήρι. ἐρείδεται δὲ καυτήρια πυρηνοειδῇ, ὅπου μᾶλλον ὀδυνῶνται¹⁾ καὶ ἐγχωρεῖ μέχρις ὀστέου καίειν πρὸς λεπίδος ἀπόστασιν. βάρβαροι²⁾ δὲ μηνοειδῇ διαίρεσιν διδόασιν περὶ τὸ ἔμπροσθεν³⁾ μέρος τῆς κεφαλῆς ἄνωτέρω τοῦ μετώπου ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ ὠτός μέχρι τοῦ δεξιοῦ, ἀπολύοντες τὸν περικράνιον ὑμένα καὶ ἐπιξέοντες τὸ ὀστέον τῆς κεφαλῆς ἐξασφαλίζεσθαι λέγοντες τὴν κεφαλὴν. καὶ οὐκ ἂν εἰκῇ⁴⁾ δόξῃ παρελῆφθαι ἡ χειρουργία τοῖς εἰδόσι τὴν δυσχέρειαν τοῦ κακοῦ, δι' ἣν οὐδὲ τὰ <τοιαῦτα>⁵⁾ βοηθήματα μείζονα τῆς χρείας ἔστι⁶⁾. ἐλλέβορος δὲ ὠφελεῖ οὐ χεῖρον καυτηρίων, εἰ μὴ⁷⁾ καὶ μᾶλλον . . . ἐγὼ δὲ καὶ τούτοις καὶ τοῖς ἐπιληπτικοῖς τὸν βολβὸν τοῦ λευκοῦ ἐλλεβόρου λεῖον καὶ χνοώδη ποιῶν δέδωκα < α' . . . προμεμελετηκυῖαν γὰρ ἤδη διάθεσιν καὶ ἐν αὐτοῖς, ὡς εἰπεῖν, τοῖς ὀστέοις πεπηγυῖαν οὐκ ἔστι ἀγωνιστικώτερος τρόπος ἄλλος

παρατεῖσθαι δὲ καὶ τὰς δριμυτέρας βρώσεις, οἷον κρομμύων, σκορόδων⁸⁾ καὶ τῶν ὁμοίων καὶ τὰς ξμνευματώδεις καὶ ὅσαι δυσδιέξοδοι, οἷον τυροί,

¹⁾ Wil. ²⁾ Erm. fehlt in Hds.

¹⁾ ὀδυνᾶται P. ed. ²⁾ φάρμακα W. von anderer Hand am Rande verbessert.

³⁾ ἔμπρόσθιον P. ed. ⁴⁾ μάτην εἰκῇ P.

⁵⁾ τὰ τοιαῦτα P. ed. Corn.: fehlt in W. ⁶⁾ ἔστι W. Corn. ἔσται P. ed.

⁷⁾ μή τι P. ed. ⁸⁾ κρόμμου, σκορόδων καὶ τὰ ὅμοια W.

φυσῶν [ἔξοδον]¹⁾. ... λαχάνων δὲ ἐφθῶν μὲν ὁκόσα οὖρων καὶ κοιλίας ὑπαγωγὰ ... ῥίξαι δὲ ποιηραὶ καὶ ἐφθαῖ, ῥαφανίδες, γογγυλίδες, σταφυλῖνοι· οὖρητικά μὲν, πλήσμια δέ· ... οἶνος λευκός, λεπτὸς .. τράγημα πᾶν κεφαλαλγές ... πλησμονὴ πάντων καὶ τῶν ὠφελούντων κακόν· κάκιον δὲ ἀπεψίη

¹⁾ Wil.

γάλα, ὕδνα¹⁾, μύκητες βολβοὶ, γογγυλίδες. αἰρεῖσθαι δὲ τὰ εὐκοίλια, εὐπεπτα²⁾, ψαφαρά, εὐστόμαχα³⁾, ἀπίμελα, ἄβρωμα, διουρητικά. παραιτητέον⁴⁾ δὲ καὶ μέλι καὶ τὰ γλυκέα πάντα. οἶνος δὲ λεπτὸς καὶ λευκός ἔστιν καὶ μὴ πάνυ παλαιὸς μηδὲ σφόδρα εὐώδης καὶ τῷ πλήθει σύμμετρος ...

¹⁾ ὕδνα W. cf. Gal. XII 460.

²⁾ ἄπεπτα W. P. εὐπεπτα ed. ³⁾ fehlt in P. ⁴⁾ ἀφιστέον P. φευκτέον ed. Corn.

Ein Kapitel des Aetius¹⁾, die Behandlung der Lungenentzündung (περιπνευμονία), scheint sich nicht in das von mir erwiesene Verhältnis des Aretaios zu ihm zu fügen. Auf den ersten Blick ist nämlich die Übereinstimmung desselben mit Aretaios in der Beschreibung der Symptome und in der Behandlung der Therapie eine so auffallend enge, daß es den Anschein gewinnt, als ob dasselbe wörtlich aus Aretaios abgeschrieben sei. Vergleicht man aber beide genauer, so wird jeder unbefangene Leser sich von der Unhaltbarkeit dieser Annahme überzeugen. Zur vollständigen Darlegung des Verhältnisses ist es notwendig, zunächst beide Massen in Gegenüberstellung herzusetzen.

Aret. caus. ac. m. II, 1, 25 f:

Ἡδε ἐστὶν ἣν καλέομεν περιπνευμονίην, φλεγμονὴ τοῦ πνεύμονος ξὺν ὀξείῃ πυρετῷ, εὖτε ξύνεστιν αὐτοῖσι βάρος τοῦ θώρακος, ἀπονία, ἣν μοῦνος φλεγμὴν πνεύμων ... ἣν δὲ καὶ τις τῶν ἀμφ' αὐτὸν ὑμένων ἐπιφλεγμὴν, οἷσι πρὸς τὸν θώρακα προσέρεται, ξύνεστι καὶ πόνος, ἀναπνοὴ κακὴ, θερμὴ, ἀνακαθίνυσθαι ἐθέλουσι σχῆμα ὀρθιον ἐς ἀναπνοήν ... ἐρυθροὶ τὰ πρόσωπα, ἔτι δὲ μᾶλλον τὰ μῆλα· τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν λαμυρώτατα καὶ πίονα. ῥὺς ἄκρη σιμὴ,

Aetius VIII 66:

Περὶ τῶν περιπνευμονικῶν.

Ἡ περιπνευμονία φλεγμονὴ ἐστὶ τοῦ πνεύμονος σὺν ὀξείῃ πυρετῷ. παρέπεται δὲ τοῖς πάσχουσι βάρος τοῦ θώρακος ἀνώδυνον· εἰ δὲ τῶν περὶ¹⁾ αὐτὸν ὑμένων φλεγμονὴ εἴη τῶν συνδεδεμένων κατὰ μῆκος τῷ θώρακι, τότε καὶ ὀδύνης αἰσθάνονται· δύσπνοια δὲ τούτοις συνεισβάλλει καὶ ἀνακαθίζειν βούλονται· ἐπιπίπτων γὰρ ὁ πνεύμων τῇ καρδίᾳ πνι-

¹⁾ παρ' αὐτῶν ed. cf. Aret.

¹⁾ Aet. VIII 66.

φλέβες ἐν κροτάφοισιν ἢ καὶ τραχήλῳ διηρμέναι, ἀποσιτή, σφυγμοὶ τὰ πρῶτα μεγάλοι, κενοὶ, πυκνότατοι, ὁκοῖόν τι συνεληλαμένοι. . . . ἔφ' ἣ (sc. θερμασίῃ) ἀναπνοὴ θερμὴ, δίψος, γλώσσης ξηρότης, ἐπιθυμίη ψυχροῦ ἢ ἔρος, γνώμης ἀπορίη, βῆξ ξηρὴ τὰ πολλὰ. Ἦν δέ τι ἀνάγεται, φλέγμα ἀφρῶδες ἢ ὑπόχολον κατακορὲς ἢ δίαιμον ἀνθηρόν σφόδρα· τόδε ἐστὶ [τὸ δίαιμον]¹⁾ τῶν ἄλλων κάκιον.

Ἦν δὲ ἐπὶ τὸ θανατῶδες ἐπιδιδῶ, ἀγρυπνίη, ὕπνοι σμικροὶ νωθροὶ κωματώδεις, φαντασίαι ἀξύνετοι, παράληροι τὴν γνώμην, ἐκστατικοὶ οὐ μάλα. ἀγνωσίη τῶν παρόντων κακῶν. . . . ἄκρα ψυχρὰ, ὄνυχες πελιδνοὶ, γρυποί²⁾· σφυγμοὶ μικροὶ, πυκνότατοι, ἐκλείποντες, εὔτε ἀγχοῦ τούτου ὀλεθρος· ἐβδομαῖοι γὰρ τὸ πλέον θνήσκουσιν.

Ἦν δέ κοτε ἐπαναφέρει ἡ νοῦσος καὶ τι ἐς ἀγαθὸν τρέπεται, αἰμορῶα γίη λάβρος ἐκ ῥινῶν, κοιλίης³⁾ ἐκτάραξις πολλῶν χολωδέων, ἐπ' ἀφρων. . . . ἐστὶ δὲ ὅτε καὶ ἐς οὖρα ἐτράπετο. . . . κῆν μὲν ἐς ἔντερον ἢ κύστιν τὸ ἀπὸ τῆς πλευρῆς παροχέτευθῃ πῦος, ἐς μὲν τὸ παραυτίκα ἐρῆϊσαν ἀπὸ τῆς περιπνευμονίης. . . . ἦν δὲ ἐς τὸν πνεύμονα ὁρμήσῃ τὸ πῦος, εἰσὶν οἱ ἀπεπνίγησαν. . .

¹⁾ Wil. ²⁾ Wig. ἀγρυπνοὶ Hds.
³⁾ κοιλίη Hds.

γμὸν ἐπιφέρει. ἐρυθρόν δὲ¹⁾ τούτοις τὸ πρόσωπον καὶ μάλιστα τὰ μῆλα· ῥὶς κατ' ἄκρον σιμουῖται, φλέβες ἐν κροτάφοις ἐπηρμέναι, ἀνορεξία, ἀναπνοὴ θερμὴ, γλώσσης ξηρότης, ψυχροῦ ὕδατος, μᾶλλον δὲ ἄερος ἐπιθυμία· βῆξ ξηρά. εἰ δὲ καὶ ἀναχθείη τι, ἀφρῶδες, κατάχολον, ἐστὶν ὅτε καὶ δίαιμον ἀνθηρόν σφόδρα, ὁ²⁾ καὶ κάκιστόν ἐστιν.

Εἰ δ' ἐπὶ τὸ θανατῶδες ῥέποιεν, ἀγρυπνία συνεδρεύει ἢ ὕπνοι σμικροὶ κωματώδεις· καὶ φαντασίαι παράληροι³⁾ τὴν γνώμην, οὐ πάνυ αἰσθανόμενοι τῶν παρόντων κακῶν. ἄκρα ψυχρὰ, ὄνυχες πελιδνοὶ καὶ γρυπούμενοι⁴⁾ τέταρταῖοι ἢ τὸ πλεῖστον ἐβδομαῖοι οὗτοι ἀποθνήσκουσιν.

Εἰ δ' ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν τρέποιτο ἡ νόσος, αἰμορῶα γίη λάβρος⁵⁾ ἐκ ῥινῶν ἀκολουθεῖ ἡ κοιλίας ἐκτάραξις πολλῶν χολωδῶν καὶ ἀφρωδῶν· ἐστὶ δ' ὅτε μεταβληθείσης εἰς πύον⁶⁾ τῆς φλεγμονῆς, διὰ γαστρὸς ἢ δι' οὖρων τὸ πύον ἐκκρίνεται, καὶ αὐτίκα τῶν ὀχληρῶν ῥύεται. εἰ δὲ εἰς τὸν πνεύμονα ὁρμήσειε, ἀθρόως ἢ ἀπέπνιξεν ἢ μετὰ πάνυ χαλεπῶν συμπτωμάτων εἰς φθίσιν μεθίσταται.

¹⁾ fehlt in ed. ²⁾ ὅτε W. ed.
³⁾ παράλληλοι ed. cf. Aret. ⁴⁾ Wil. γρυπούνται W. ⁵⁾ λαῦρος W. ed.
⁶⁾ πύος W. πύον ed.

Drei Sätze des Aetius fehlen bei Aretaios, nämlich die Bemerkungen, daß die Lunge, wenn sie auf das Herz drückt, Erstickungsfälle hervorruft, daß die Lungenkranken nicht nur nach kalter Luft, sondern auch nach kaltem Wasser Verlangen spüren und daß bei dieser Krankheit schon am vierten Tage der Tod eintritt. An sich sind diese Zusätze untergeordneter Natur, und man könnte leicht geneigt sein, sie als Zuthaten des den Aretaios excerpierenden Autors gelten zu lassen. An Bedeutung gewinnen sie erst dadurch, daß die

beiden ersten Notizen in der Beschreibung dieser Krankheit bei Soran (Cael. Aur. A. M. II 27) wiederkehren. Vergleicht man seine Beschreibung mit der des Aretaios, so bedarf es keiner angestregten Aufmerksamkeit, um wahrzunehmen, daß sie identisch ist mit der des Aretaios, daß sie in der Aufzählung der einzelnen Symptome abgesehen von ihrer größeren Reichhaltigkeit so völlig mit ihr zusammenfällt, wie es ohne Benützung derselben Quelle nicht leicht möglich gewesen wäre.

Cael. Aur. A. M. II 27:

Intellegitur (sc. peripneumonia) ex his quae concurrunt. Etenim peripneumonicos sequuntur febres acutae, gravado thoracis et sensus laborantium quodam difficultate laterum atque medium papillarum, iacendi etiam facultas supinae positionis atque paulo erectior, frequens etiam sedendi delectatio atque supralatus iacendi difficultas, ita ut praefocabilis esse sentiatur, vultus rubor, tanquam florens, oculorum veluti pinguis aspectus atque etiam splendor, scilicet in partibus albidis, quae praeter papulam videntur. . . . Sequitur eosdem etiam anhelitus celeritas, tussicula sanguinolenta atque fellea vel fumosa iactans sputa et in comparatione pleuriticorum fulviora vel spumosiore, spiratio difficilis, desiderium frigidi atque plurimi aeris haustu rapiendi, frigidi etiam potus appetitio, os siccum, lingua aspera . . . pulsus vehemens et celer, anxietas, iactatio, vigiliae iuges, ingemens atque turbulentus somnus. Peiorante passione thorax etiam extantior fiet . . . mentis alienatio . . . pulsus latens aut formicabilis, quem Graeci $\mu\upsilon\sigma\mu\eta\chi\acute{\iota}\zeta\omicron\nu\tau\alpha$ vocant . . . At si salutaribus prosperata signis passio coeperit in melius vergere, omnium supradictorum fiet paulatim deductio

Mithin gab es vor Soran eine mustergiltige Beschreibung dieser Krankheit, in welcher die bei Aretaios fehlenden, von Aetius aber

aufgenommenen Notizen von der durch das Liegen auf der Seite herbeigeführten Atemnot und von der Sucht der Lungenkranken, kaltes Wasser zu trinken, thatsächlich standen. Ich meine, durch diesen Thatbestand wird die Annahme, daß Aetius den Aretaios benützt habe, widerlegt und die Herleitung beider Berichte aus derselben Quelle zu einer fast an Gewißheit reichenden Höhe der Wahrscheinlichkeit erhoben. Der Name dieser gemeinsamen Quelle kann nach der voraufgehenden Untersuchung nicht zweifelhaft sein. Eine schwache Spur scheint auch bei Aetius auf den Namen zu führen. Zum Schluß seiner Therapie, die wieder abgesehen von einzelnen Zusätzen völlig der Darstellung des Aretaios¹⁾ entspricht, macht er darauf aufmerksam, daß sie vielfach dieselbe ist wie bei der Pleuritis; als letztes Mittel figurirt ein Umschlag aus Wachs, Terpentinharz, Hirschmark, Ysop, Butter und Iris. Dasselbe Mittel führt Aetius bei der Behandlung der Pleuritis aus Archigenes an:

Aet. VIII 66:

ἡ τὸ διὰ κηροῦ καὶ τερεβινθίνης
καὶ μυελοῦ ἐλαφείου καὶ ὑσσώπου
ὕγροῦ καὶ βουτύρου καὶ ἰριος λειο-
τάτης ἐπίθεμα προσαγέσθω· ἔστω
δὲ ἴσα τὰ πάντα. Ἐνίοτε καὶ νάρ-
δινον μύρον ἐμβάλλειν . . .

Aet. VIII 68:

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπιθέμασι χρηστέον
καὶ μάλιστα ἐν τῷ τῆς ἀναγωγῆς
καιρῷ οἷον τὸ τοιοῦτον· βουτύρου,
τερεβινθίνης, ὑσσώπου [φαρμάκου W.
deest P.], κηροῦ, μυελοῦ ἐλαφείου
καὶ ἰριος ἴσα, κυπρίνου ἐλαίου ἢ
πηγανίνου συµμέτρου ἐμβαλλομένου.

Die vorhergehende Untersuchung hat also ergeben, daß Aretaios in den beiden uns erhaltenen Schriften sich in sklavischer Weise an den bedeutendsten Arzt seiner Schule, den Archigenes, angeschlossen hat. Dies Resultat kann nur den befremden, der die Arbeitsweise der nachchristlichen Ärzte nicht kennt. Die medicinische Litteratur seit der Zeit des 2. Jh. ist im Wesentlichen eine excerpierende: das gilt in gleicher Weise für Ärzte wie Soran, Galen, Heliodor, Antyll, Philumenos, Philagrios sowie für die späteren Sammelwerke eines Oribasius, Aetius, Alexander von Tralles und Paulus von Aegina.

So überflüssig es nach der oben geführten Untersuchung scheinen mag, so angenehm ist es, das gefundene Resultat noch weiter bestätigt zu sehen. Bei der Epilepsie macht Aretaios einen Unterschied

¹⁾ Aret. cur. m. ac. II 1, 243 f.

zwischen dem epileptischen Anfall, den er zu den acuten Krankheiten rechnet (Aret. caus. m. ac. I, 1. cur. p. 216) und der chronischen Form dieses Leidens (Aret. caus. m. chr. I 4, 72, cur. p. 308f.). Er unterscheidet wieder zwei Arten der chronischen Epilepsie, von denen die eine im Kopf ihren Sitz hat, die andere in den entfernter vom Kopf liegenden Nerven entsteht und von dort nach dem Kopfe steigt¹⁾. In der Therapie dieser Krankheit empfiehlt er zum Teil dieselben Mittel, welche er gegen Kephalaia verordnet hatte: Blutentziehung aus der Ellenbogenvene und aus der geraden Stirnvene, Purgantien, Schröpfköpfe, Arteriotomie, Incisionen in die Kopfhaut, Cauterisation, Trepanation²⁾, darnach Rubefacientia. Von den letz-

¹⁾ Gal. VIII 193 fügt zu diesen zwei Arten noch eine dritte hinzu, welche im *στόμαχος* (oesophagus) ihren Sitz hat. Vgl. Alex. von Tralles I 536 (P.).

²⁾ Diese heroischen Kuren, die Alexander von Tralles a. a. O. verwirft, die Incisionen in die Kopfhaut, Cauterisation und Trepanation rühren von Themison her (Cael. Aur. M. Ch. I, 4). Incisionen in die Kopfhaut und Cauterisation empfiehlt auch Celsus III, 23, 115, wahrscheinlich nach Themison. Nach Celsus empfohlen einige Ärzte, das Blut von Fechtern gegen diese Krankheit zu trinken (Cels. a. a. O. 114, 34): dies Mittel war allgemein bekannt, wir lesen es bei Scrib. Larg. 17. Plin. XXVIII 4. Aret. 312 (er will selbst gesehen haben, wie ein Kranker es trank), Alex. v. Tralles I 565. Plinius ist wieder unabhängig von Celsus. Ich benütze diese Gelegenheit, um einiges Material zur Quellenanalyse des Celsus zu geben. Das charakteristische seiner Therapie ist die Verbindung von hippokratischer und asklepiadeischer Doktrin. Das zeigt sich z. B. in seiner Behandlung der angina (IV 7, 129). Seine Beschreibung der beiden Arten dieser Krankheit, der *συνάγχη* und *κυνάγχη* ist streng hippokratisch. Hippokrates versteht unter dieser Krankheit eine Entzündung des Rachens, die durch eine kalte, schleimartige Flüssigkeit hervorgerufen wird, welche besonders zur Winters- oder Frühlingszeit aus dem Kopfe in die Halsvenen strömt (*περὶ διαίτης ὀξέων* II 69 Kühn). Die Krankheit äußert sich in Erstickungsanfällen: der Kranke kann nicht schlucken, Rachen, Hals und Gesicht brennen ihm, die Augen treten heraus, sind starr auf einen Punkt gerichtet, Schluchzen stellt sich ein, das Sehvermögen und der Gehörssinn sind geschwächt, mit offenem Munde liegt er apathisch da und giebt Speichel von sich (*περὶ νόσων* II 300). Er unterscheidet verschiedene Arten: die gefährlichste ist diejenige, bei der sich weder im Rachen noch äußerlich am Halse ein Zeichen von Entzündung zeigt (I 114. *Κωαχὰ προγν.* I 290); sie verursacht große Schmerzen, Atmungsbeschwerden und Erstickungsanfälle (I 114) und führt entweder an demselben Tage oder nach 2—4 Tagen den Tod herbei. Langwieriger, aber minder gefährlich ist die Art, bei der nur der Rachen anschwillt und sich rötet oder Hals und Rachen zugleich. Der Kranke kommt mit dem Leben davon, wenn die Entzündung sich auf die

teren bezeichnet er als besonders wirksam das aus Canthariden bereitete Mittel, wobei er zum Schutz der Blase Milch zu trinken rät, weil die Canthariden nachteilig auf die Blase einwirken. Dies

äußeren Teile wirft, während bei einer Entzündung der Lunge die Krankheit Wahnsinn zur Folge hat (I 291. I 114f.). Die Parasyanche endlich betrachtete er als eine mildere Form der Kynanche (II 301). Die Vergleichung mit Celsus beweist dessen Abhängigkeit von Hippokrates. Die Behandlung des Celsus ist darauf gerichtet, den Körper von dem Krankheitsstoff zu befreien. Darum verordnet er zunächst einen Aderlaß, wenn die Kräfte des Kranken es gestatten, darnach Abführmittel, Schröpfköpfe, die er unter das Kinn oder in die Gegend des Schlundes zu applicieren empfiehlt, feuchte Umschläge, Gurgelmittel, bestehend aus einer Abkochung von Ysop, Katzenminze, Thymian, Wermuth, Kleien und trockenen Feigen, eine Salbe aus Ochsen-galle und dem Maulbeermittel zum Bestreichen des Gaumens. Als letztes Mittel wandte er die Laryngotomie an oder Öffnung der Gefäße unter der Zunge. Dies Heilverfahren stammte von Asklepiades her, der im 2. Buche seiner Schrift *περὶ ὀξέων παθῶν* diese Krankheit behandelt hatte (Cael. Aur. A. M. III 4):

Cels. IV 7, 129 28:

Quidquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est: secundum est ducere alvum. Cucurbitula quoque recte sub mento et circa fauces ad-movetur, ut id quod strangulat, evocet. Opus est deinde fomentis humidis; nam sicca spiritum elidunt. Ergo ad-movere spongias oportet ... Tum commodum est hyssopum vel nepetam vel thymum vel absinthium vel etiam furfures aut ficus aridas cum mulsa aqua decoquere eaque gargarizare; post haec palatum ungere vel felle taurino vel eo medicamento, quod ex moris est. ... Si per haec parum proficitur, ultimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, et in palato citra uvam, vel eas venas, quae sub lingua sunt ...

Cael. Aur. A. M. III, 4:

Asclepiades vero secundo libro celerum vel acutarum passionum inquit: synanchicis convenit sanguinis detractio atque ventris depurgatio et cataplasmata ... et gargarismata et superunctiones ... ut sunt ex hyssopo, origano et thymo .. absinthio, fici coctione ... felle taurino .. adiciens etiam cucurbitae usum cum scarificatione ... Tum phlebotomiam probat ex fronte faciendam vel angulis oculorum vel venis, quae sub lingua sunt, vel e brachio. At si maior, inquit, passio fuerit, dividendae sunt fauces, hoc est tonsillae et partes supra uvam constitutae.

Dafs Asklepiades bei der Bräune die Laryngotomie angewandt habe, bezeugen auferdem Gal. XIV 734: *Ἀσκληπιάδης δὲ ἐπὶ τῶν ἄκρως πνιγομένων καὶ λαρυγγιτομεῖ*. Plin. XXVI 17.

Zum Schlufs erwähnt Celsus zwei volkstümliche Mittel: das Fleisch einer jungen Schwalbe und einen Trank aus Meth und der Asche einer jungen eingepökelten Schwalbe. Das zweite Mittel (vgl. Scrib. Larg. 70. Aret. 226.

Mittel stammt von Archigenes her, der es gegen den Kopfschmerz, also auch gegen diese Form der Epilepsie angewandt hatte: vgl. Aet. VI 50:

Aet. VIII 47. Gal. XII 974) rührte von Asklepiades her nach dem Zeugnis des Galen XIV 942: Ἄλλο διὰ χελιδόνων ἄνευ βησσαῖ στοματικὸν διάχριστον, ὡς Ἀσκληπιάδης ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως. Ἄλλη, ποιεῖ καὶ συναγχικοῖς. χελιδόνων ἀγρίων κεκαυμένων τῆς σποδοῦ < δ'. κρόκου < α'. νάρδου Ἰνδικῆς < α', μέλιτι ἀναλάμβανε, ἢ κρᾶσις πρὸς τὰς ὑποκειμένας διαθέσεις. δεῖ δὲ τὰς χελιδόνας καίειν τὸν τρόπον τοῦτον. ἅλσιν καταπάσαντες τοὺς νεοττοὺς σὺν τοῖς πτεροῖς βάλλομεν εἰς ἄγγος κεραμεοῦν καὶ τοῦτο φριμώσαντες τίθεμεν ἐπ' ἀνθρώκων. Beide Mittel kehren bei Plinius wieder (XXX 30), der aber aus Celsus nicht geschöpft haben kann wegen seiner genaueren mit Dioskorides (II 60, 190) stimmenden Angabe des Quantums dieses Mittels. Diese Übereinstimmung bestätigt wieder meine schon vorher ausgesprochene Vermutung, daß Varro die gemeinsame Quelle ist: von ihm würde dann die Verbindung von hippokratischer Doctrin mit der des Asklepiades herrühren.

Der Lethargus und die Phrenitis sind zwei entgegengesetzte Leiden: beide sind nach Asklepiades Geisteskrankheiten mit dem Unterschiede, daß das Charakteristische der Phrenitis Aufregung, das des Lethargus Schlafsucht und Niedergeschlagenheit ist (Cael. Aur. A. M. II 1). Dieselbe Definition giebt Cels. III 20, 104. In seiner Behandlung der Lethargie ist er ebenfalls von Asklepiades abhängig:

Cels. III 20:

Hos aegros quidam subinde excitare nituntur, admotis iis, per quae sternutamenta evocantur, et iis quae odore foedo movent; qualis est pix cruda, lana succida, piper, veratium, castoreum, acetum, allium, cepa. Iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu eervinum; si id non est, quodlibet aliud . . . 105, 7: altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccae, aut hedera cum rosa et aceto. Praecipueque proficit, et ad excitandum hominem, naribus admotum, et ad morbum ipsum depellendum, capiti frontive impositum sinapi . . . vinum quoque cum tempestivo cibo datum non mediocriter adiuvat.

Cael. Aur. A. M. II 9:

Asclepiades primo libro de acutis passionibus scribens multa inquit adhibenda lethargicis quae phreniticis sunt ordinata. Nititur etiam iugiter demersos excitare sternutamentis et odoramentis castorei, rutae et aceti et spondylis et conyza et agno herbis: baccis etiam lauri . . . Iubet etiam ea adhiberi, quae epilepticis vel matrice praefocatis adhibuit odoranda, hoc est lanam vel capillos aut cervi cornu vel galbanum carbonibus imposita . . . omnium, inquit, praestantius atque operantius esse sinapi tritum cum aceto admixto atque hinc caput cataplasmandum et dandum manibus quod excitet aegrotantem . . . Potum dat bis in die vel ter et veniente nocte offert tanquam phreniticis vinum . . .

Daß das Verfahren des bithynischen Arztes nicht allgemeine Billigung fand, beweist Caelius Aurelianus, beweist ebenso Celsus, der die Äußerung

ἡμεῖς δὲ χρώμεθα τῷ διὰ τῶν κανθαρίδων καταχρίσματι (καταπλάσματι ed. Corn.) καὶ ποιεῖ παραδόξως πολλῷ χρόνῳ ἐξιχωρισθέντων ὑπὸ τοῦ φαρμάκου γιγνομένων ἐλκυδρίων. δεῖ δὲ προησφαλίσθαι τὴν κύστιν διὰ γαλακτοποσιῶν καὶ ἐμβροχῶν

eines Arztes Tharrias anführt, daß das Erwecken des Kranken während des Anfalles nicht ratsam sei. Dieser Tharrias, der bei Celsus noch einmal vorkommt (III 21, 109) ist sonach jünger als Asklepiades, andererseits ist er älter als Scribonius Largus, dessen Thraseas chirurgus kein anderer Arzt ist (c. 204. 208); bei Galen (XIII 741 = Scrib. Larg. c. 208) heißt er Tharseas. Vgl. Aet. VIII 65. Er lebte also frühestens in der letzten Zeit der Republik. Mitten zwischen dem Eigentum des Asklepiades bei Celsus steht die aus Herakleides von Tarent stammende Vorschrift, daß man den Kopf des Kranken abscheeren und ihn mit Wasser und einer Abkochung von Raute und Lorbeer bähnen müsse (vgl. Cels. 105, 5 = Cael. Aur. A. M. II 9). Ob das Zusammenarbeiten der Darstellung des Asklepiades, Tharrias und Herakleides von Celsus herrührt oder von seiner Quelle, läßt sich mit unserem Material nicht ausmachen.

In der Behandlung der Wassersucht weist die Darstellung des Celsus (III 21) wieder dieselbe Abhängigkeit von Asklepiades auf:

Cels. 106, 34:

Atque hic quoque quaecumque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est: multum ambulandum, currendum aliquid est; superiores maxime partes sic perfricandae, ut spiritum ipse contineat . . . cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis duri . . .

Cels. III 21, 108: *At si id vitium est, cui λευχοφλεγματία nomen est . . . utendumque frictione, madefactis tantum manibus aqua, cui sal et nitrum et olei paulum sit adiectum . . . Utilia etiam sunt cataplasmata, quae reprimunt . . . Incidendum quoque est super talum, quatuor fere digitis, ex parte interiore, qua per aliquot dies frequens humor feratur; atque ipsos tumores incidere altis*

Cael. Aur. M. Ch. III 8:

Asclepiades etiam libro quo de hydropneumate scripsit, parvo humore collecto, sive plurimo, necdum tamen pedibus aut cruribus infuso, athletarum regulam adhibendam probat, ex plurima deambulatione atque cursu et refrigeratione retento spiritu. Tunc cibo dandum panem diligenter elaboratum atque excercitum cum piscibus natura duris

In leucophlegmatia vero fricationes adhibet et cataplasmata frigerantia . . . et ex vesicis illisionem adhibendam probat. Laudat etiam punctiōnem quatuor digitis a talo distantem faciendam superius ab interiore parte, sicut in phlebotomia servatur, ut per eandem punctiōnem humore effuso corpora releventur; si minus, scarificatione altiore utendum . . . C. Aur. A. M. III 8, 485 resp. 355: Herodicus igitur,

διὰ τὸ ἐτοίμως αὐτὴν πολλάκις ἀδικεῖσθαι ἐκ τοῦ (τῶν P. ed.)
διὰ κανθαρίδων χρίσματος.

Es ist sicher kein Zufall, daß das Wenige, was wir von Archigenes Behandlung der Epilepsie wissen, sich mit Aretaios deckt. Der Schriftsteller, dem wir dies Wenige von seiner Therapie verdanken, ist Alexander von Tralles (I 561). Darnach riet er, Einreibungen mit Salben vorzunehmen, dem Kranken reichlich Wasser zu geben, dagegen den Genuß von Fleisch¹⁾ und den geschlechtlichen Verkehr²⁾ zu verbieten. Ferner gab er dem Kranken die Leber eines Wiesels ohne Galle mit einer halben Kotyle Wasser vermischt auf nüchternen Magen drei Tage lang zu trinken und berichtete, daß einige Ärzte mit einem Stück von der Möve, das sie verbrannt und als Getränk gereicht, die Krankheit geheilt hätten.

*plagis oportet ... Auctoresque multi
sunt, inflatis vesicis pulsandos tumo-
res esse.*

*ut Asclepiades memorat ... vesicis
bubulis repletis corpus vaporandum
probat vel aliis quibusque maioribus
inflatis tumentia loca pulsari iubet.
Sic etiam antiquissimus Euryphon.*

Die auctores multi, die das Schlagen der Geschwulst mit aufgeblähten Blasen empfahlen, stammen also ebenfalls aus Asklepiades: es waren Herodikos und Euryphon. In der späteren Zeit war dies Verfahren ganz geläufig: Archigenes und Herodot kennen es nach Aet. X 29: Δοκιμαστέον δὲ καὶ τὸ Ἡροδίκου βοήθημα· καὶ γὰρ βοηθεῖν δύναται οὐχ ἥττον τῆς τρίψεως. κύστεσι μὲν οὖν βοεῖαις ἢ ἄλλαις εὐμεγέθεσιν εὖ πεφυσημέναις κροῦε (κρούει W.) κούφως τοὺς ἐξοιδήσαντας τόπους, φησὶν Ἀρχιγένης καὶ Ἡρόδοτος· ἐπιπυκνοῦται γὰρ ἡ σὰρξ ἀλύπως οὔτε ἀλγήματος γιγνομένου (fehlt in P.) οὔτε ἀντιτυπίας σκληροτέρας ἀπαντώσης. Über die operative Entfernung der Wasseransammlung berichtet auch Aetius (X 30) nach Asklepiades, Antyll und Archigenes.

Endlich will ich noch darauf verweisen, daß die Ausführungen des Celsus (IV 13) betreffend die Behandlung der Pleuritis durchaus asclepiadeische Farbe tragen (Cael. Aur. A. M. II 22). Das Resultat dieses Excurses ist also, daß Asklepiades eine der Hauptquellen des Celsus für seine Therapie der Krankheiten ist; ob er ihn direct benützt hat, ist mir zweifelhaft.

¹⁾ Ebenso wie Asclepiades (Cael. Aur. M. Ch. I 4, 228) und nach ihm Celsus (III 23).

²⁾ Über diesen Punkt waren die Alten geteilter Meinung. Während Asklepiades (Cael. Aur. M. Ch. I 4, 228) und Rufus (Aet. III 8) den Beischlaf geradezu empfohlen, wurde er von andern Ärzten verboten: Cels. a. a. O., Gal. (VIII 341) u. a. Vgl. Daremberg Oribas. I 668.

Alex. v. Tralles a. a. O.:

Ἄλλοι δέ φασιν, ἐπιληπτικούς δια-
γνωσθέντας θεραπεύειν χρῆ, καθάπερ
Ἀρχιγένης παραινεῖ. προηγουμένως
οὖν ταῖς κατὰ τὴν δίαιταν καταλλή-
λοις χρηστέον ὑδροποσίαις· κρεῶν
ἀποχὴ καὶ [συνουσίας]¹⁾ ἀφροδισίων.
ἀλειμμάτων δὲ παραλήψεις γενόμεναι
παρ' ἐμπείρων παρατετήρηνται. τοῖς
δ' ἐπιληπτικοῖς ἀρμόδια καὶ ταῦτα·
γαλῆς ἥπαρ χωρὶς τῆς χολῆς μεθ'
ὑδατος ἡμικοτυλίου πότιζε νῆστιν
ἐφ' ἡμέρας γ'. λέγουσι δὲ τινες μέρος
αἰθυίας²⁾ τοῦ ὀρνέου κεκαυμένον ἐν
ποτῶ διδόμενον ἀνασκευάζειν τὴν
νόσον. καὶ ταῦτα μὲν ἐκ τῶν Ἀρχι-
γένους³⁾.

1) Wil. 2) Hds. μέρος ἀπὸ τοῦ ὀρνέου.

Bei dem epileptischen Anfall gab Archigenes den Rat, die einzelnen Körperteile festzuhalten und jedes Glied durch sanftes Bestreichen mit Fett ohne Anwendung von Gewalt zu erweichen und den verzerzten Gesichtsteilen die natürliche Form wiederzugehen³⁾. Hat der Anfall aufgehört, so empfiehlt er den Kopf des Kranken durch Tücher zu erwärmen. Ebenso Aretaios.

Alex. v. Tralles I 557:

Ἀρχιγένης μὲν οὖν ἐν τοῖς κατὰ
γένος παραινεῖ οὕτω λέγων· κατὰ δὲ
τοὺς παροξυσμοὺς διακρατεῖν δεῖ
πάντα τὰ μέρη, ὥσπερ καὶ τοὺς
περιοδικῶς ῥιγοῦντας, καὶ τῶν μελῶν
ἕκαστον λιπαραῖς ταῖς χερσὶν ἀπεν-
θύνειν μετὰ συμμέτρου συντονίας
μαλάσσοντας τὰ τε ὄμματα αὐτῶν
ἡσυχῇ καὶ καταψύχοντας, ἔτι τε φλε-

Aretaios:

314, 14: κρεῶν μάλιστα μὲν
ἀπείρχθω πάμπαν· εἰ δὲ μή γε, ἐν
τῇ θεραπείῃ . . .

315, 8: ὀργὴ δὲ καὶ λαγνείη κακόν·
καὶ γὰρ τὸ πρῆγμα τῆς νούσου φέρει
τὰ σύμβολα . . .

314, 1: ἄλειμμα μὴ κάρτα λιπαρὸν
τρίψις ἐν μελλήσει μὲν οὔσα, σκληρο-
τέρη δ' ἐς πύκνωσιν . . .

312, 3: λόγος ὅτι καὶ γυπὸς ἐγ-
κέφαλος καὶ αἰθύης ὠμῆς κραδίη καὶ
οἱ ἐνοικάδιοι γαλεοὶ βρωθέντες λύ-
ουσι τὴν νοῦσον . . .

Aret. 217:

Ἦν δὲ καὶ σπᾶται ἢ διαστρέφεται
τὴν κάτω γνάθον ἢ τὸ χεῖρε καὶ τὰ
σκέλεα ῥίπνεται καὶ ξύμπας τιταίνη-
ται οἱ ὦψ, ψηλαφίῃ ξὺν λίπαϊ μαλθάσ-
σειν ἀπιθύνειν τε τῆς ὀψιος τὰ διά-
στροφα· προηέως δὲ διακρατέειν, ὥς
μὴ διαστρέφεται τὰ ἥθεα. τὰ ψυχρὰ
πυριῆν ἐρίοισι παλαιοῖς, πιναροῖσι
τρύχεσι

1) Vgl. Pseudo-Dioskorides περὶ εὐπορίστων I 18, 102 (Sp.) Diosc. II, 27, 179.
Cael. Aur. M. Chr. I 4, 229.

2) Cael. Aur. a. a. O.

3) Diese Art der Behandlung kehrt bei Philumenos wieder (Orib. V 403);
er kennt auch die Forderung des Aretaios (217), durch Federn, die mit Iris-
salbe bestrichen sind, Erbrechen hervorzurufen. Philumenos wieder ist von
dem Arzte Poseidonios aus dem 4. Jh. (Sprengel, Gesch. der Arzneikunde
II³ 127) benützt: Aet. VI 13 = Orib. V 403.

βοτομεῖν αὐτοὺς κατὰ τὸν καιρὸν
τοῦτον. παυσάμενον δὲ συγχριστέον
καὶ θαλπτέον ἱματίοις τὴν κεφαλὴν
πολλῷ ἐλαίῳ καὶ θερμῷ συμβρέχοντας.

Das von mir beigebrachte Material wird genügen, um den Glauben an die Selbständigkeit des Aretaios zu erschüttern: eine ganze Reihe von Capiteln sind weiter nichts als ein in eine närrische Caricatur des Ionischen umgesetzter Archigenes. Ich halte darnach den weiteren Schluss für berechtigt, daß Archigenes, wenn nicht die einzige, so doch die Hauptquelle des Aretaios ist.

Die Frage nach dem Titel der benützten Schriften läßt sich mit Hilfe unserer Überlieferung beantworten. Galen ist es, der den Titel seiner pathologischen, Oribasius, der den Titel seiner therapeutischen Schrift erhalten hat: *τῶν ὀξέων καὶ χρόνιων παθολογικὰ* (Gal. VIII 203) und *θεραπεία τῶν ὀξέων καὶ χρόνιων παθῶν* (Orib. II 146), beide, wie es scheint, aus 4 Büchern bestehend. Das kurze Bruchstück aus seiner Pathologie behandelt den Schwindel (*σκότωμα*), der nach seiner Meinung infolge von Säfteanomalien des Kopfes und des Unterleibs entsteht. Als Symptome bezeichnet er im ersteren Falle Ohrensausen, Kopfschmerz, ein Gefühl von Schwere im Kopf, Schwächung des Geruchssinnes und anderer Sinne, im letzteren Falle Magenschmerzen und Erbrechen. Die Symptome kehren bei Aretaios (caus. m. chr. I 3, 70) wieder; daß er auch die beiden von Archigenes angegebenen Entstehungsursachen der Krankheit kannte, folgt aus seiner Therapie, wo er in der Behandlung einen Unterschied macht, je nachdem die Krankheit durch Säfteanomalien im Kopf oder durch Säfteüberfluß in der Leber, in der Milz oder in einem andern inneren Organ entstanden ist (cur. m. chr. I 3, 302f.).

Umfangreicher ist das von Oribasius aus seiner therapeutischen Schrift erhaltene Bruchstück. Die Bedeutung desselben liegt darin, daß es uns einen ungefähren Maßstab für die Beurteilung des Umfangs dieser Schrift an die Hand giebt. Es enthält eine eingehende Behandlung der Art der Vorbereitung der Kranken auf den Genuß der Nieswurz¹⁾, ferner genaue Angaben über die verschiedenen Arten

¹⁾ Man vergleiche damit die kümmerlichen Angaben des Plin. XXV 59. Er läßt den Körper sieben Tage lang auf den Genuß des Helleboros vor-

derselben und Vorschriften über seine Gebrauchsweise. Aus der Thatsache, daß er sogar darüber Vorschriften giebt¹⁾ wie sie Kranken wider ihren Willen beizubringen sei, folgt, daß die Nieswurz in seiner Therapie eine wichtige Rolle spielte; vollauf bestätigt wird diese Schlußfolgerung durch die Notiz des Galen, daß er eine eigene Schrift über die Nieswurz verfaßt habe²⁾. Diese Wertschätzung derselben als Brech- und Abführmittel ist allerdings keineswegs ihm allein eigen; sie findet sich schon bei älteren Ärzten. Es ist bekannt, daß Herophilos, der im Gegensatz zu Erasistratos auf Arzneimittel, einfache und zusammengesetzte, hohen Wert legte³⁾, sogar soweit in der Wertschätzung dieser Pflanze ging, daß er sie mit einem tapferen Heerführer verglich, weil sie im Innern alles aufrege und darnach unter den ersten ausrücke⁴⁾. Aber erst seit der Augusteischen Zeit beginnen Anhänger der methodischen und pneumatischen Schule eingehend über die Verwendung des Helleboros zu schreiben: ein Schüler des Asklepiades, Philonides⁵⁾, eröffnet den Reigen, ihm schlossen sich Themison⁶⁾ an, der Lehrer des Archigenes, Agathinos⁷⁾, Herodot⁸⁾, Rufus⁹⁾ Archigenes und Antyll¹⁰⁾. Aretaios verwendet beide Arten von Nieswurz, vornehmlich aber die

bereiten durch scharfe Speisen und Enthaltung vom Weingenuß, am dritten und vierten Tage durch Erbrechen und tags vorher durch Fasten.

¹⁾ Orib. II 59.

²⁾ Gal. XVI 124.

³⁾ Plut. quaest. symp. IV 1, 3 p. 633 c.

⁴⁾ Plin. XXV 58. Schon zu Hippokrates Zeit fing man an, sie als Abführmittel allgemein zu verordnen (Gal. XV 865. XVII b 781. Orib. II 108. 137. Vgl. Daremberg Orib. II 800), obgleich die Ärzte auf die Gefahr aufmerksam machten, die mit ihrer Verwendung verbunden war. Ktesias, der Leibarzt des Artaxerxes, bezeugt, daß zur Zeit seiner Vorfahren sie niemand anwandte, ohne den Kranken vorher sein Testament machen zu lassen, da die Art der Mischung und die Dosis unbekannt waren (Orib. II 182), und Mnesitheos gab den Rat, sie nur als letztes Mittel in verzweifelten Fällen zu reichen (Orib. a. a. O.). Dagegen empfahlen ihn Plistonikos, Diokles, Phylotimos und Dieuches als Purgans in der verschiedensten Zubereitung. Die Beschreibung beider Arten steht bei Theoph. (H. pl. IX 10).

⁵⁾ Diosc. IV 148 p. 629. Vgl. über ihn Hermes XXIII 563.

⁶⁾ Plin. XXV 58.

⁷⁾ Cael. Aur. A. M. III 16. Orib. II 158.

⁸⁾ Orib. II 163: *Περὶ δόσεως ἐλλεβόρου. Ἐκ τῶν Ἡροδότου ἐκ τοῦ περὶ κενουμένων βοηθημάτων.*

⁹⁾ Orib. II 108 f.

¹⁰⁾ Orib. II 167 f.

weise, bei einer ganzen Reihe von Krankheiten, wenn es gilt, ein heftiger wirkendes, den ganzen Organismus erschütterndes Brechmittel zur Anwendung zu bringen: so bei der Kephalaia (302), bei der Elephantiasis (346), bei der Melancholie (320), beim Schwindel (304) und bei der Gicht (339). Bei der Behandlung des Kopfschmerzes bezeichnet er ihn geradezu als das letzte und wirksamste Mittel (302) und zum Schluß der Therapie der Elephantiasis (346) giebt er eine kurze Schilderung seiner Wirkungsweise. Seine Vorschriften endlich über die Anwendungsart, die Bemessung der Dosis für kräftige und schwächliche Constitutionen (303. 320) stimmen durchaus mit denen des Archigenes überein. Sollte es bei diesem Sachverhalt reiner Zufall sein, daß Aretaios bei der Behandlung der Melancholie (320) das Versprechen giebt, an einem andern Orte die Art und Weise zu beschreiben, wie der Kranke auf den Genuß von Nieswurz vorzubereiten ist, ferner die Arten derselben, ihre Gebrauchsweise, Unterscheidungsmerkmale und die beim Brechen sonst noch gebräuchlichen Hilfsmittel zu behandeln d. h. mit andern Worten, daß er sich die Behandlung dessen für eine andere Gelegenheit aufspart, was Archigenes thatsächlich in seiner therapeutischen Schrift eingehend besprochen hat? Ich meine, diese Stelle enthält einen directen Hinweis darauf, daß Archigenes und kein anderer den Aretaios zu diesem Versprechen veranlaßt hat. Ob er es gehalten, wissen wir nicht, da uns von seinen Schriften nichts weiter erhalten ist.

Endlich will ich noch erwähnen, daß das kurze von dem arabischen Arzte Rhazes (10. Jh.) aus Rufus erhaltene Bruchstück des Archigenes¹⁾, in dem die Härte der Milz, welche die Verhärtung dieses Organs hervorruft, mit einem Steine verglichen wird, sich mit Aretaios (caus. m. chr. II 14, 110) deckt.

Das dargelegte Verhältnis des Aretaios zu Archigenes gestattet uns, die Frage nach der Lebenszeit des Aretaios endgiltig zu beantworten. Da der erste Arzt, der ihn benützt hat, Philagrios²⁾, spätestens dem Anfang des 4. Jhds. angehört, so muß er im Ausgang des zweiten oder im dritten Jhd. gelebt haben. Eine weitere Einschränkung seiner Lebenszeit gestattet der Umstand, daß er seine Schriften in ionischer Mundart verfaßt hat. Daraus schliesse ich, daß er

¹⁾ Rufus ed. Ruelle p. 496.

²⁾ Aus ihm stammen die Aetiussitate: vgl. Aet. VIII 47. XI 1.

der Zeit angehört, in der die archaisierende Richtung in der griechischen Litteratur herrschte d. h. jener Zeit, der Lukian¹⁾ vorwerfen konnte, daß sie ionisch schreibe, ohne es zu verstehen und in der Männer, wie Kephalion seine παντοδαπαὶ ἱστορίαι und Arrian seine Ἰνδική ionisch schrieben. Auf dieselbe Zeit weist eine bisher wenig beachtete Stelle seiner Pathologie. In der Beschreibung der Elephantiasis steht eine Beschreibung des Dickhäuters, nach dem diese Krankheit benannt ist. Mag dies Tier in seiner Heimat auch noch so selten gewesen sein, das wird Jedermann zugeben, daß eine so ausführlich gehaltene Beschreibung in einer pathologischen Schrift nichts zu suchen hat. Daß er sie aus einer andern Quelle entlehnt hat, beweist die Parallelüberlieferung bei Aetius. Ein erhöhtes Interesse erhält sie durch die Thatsache, daß sie ganz unverkennbare Anklänge an Oppian Cyn. II 489 ff. aufweist. Beide verfechten die Ansicht, daß die Stofszähne der Elephanten nicht Zähne, sondern Hörner seien, die allerdings zum Unterschied von den andern hörnertragenden Tieren vom Maule ausgingen (Opp. 491. Aret. 175, 9), beide heben in der Beschreibung die ungewöhnliche Gröfse des Tieres (Opp. 515. Aret. 174, 10), den Bau des Kopfes (Opp. 519. Aret. 175, 4), der Ohren (Opp. 520. Aret. 175, 7) und des Rüssels hervor (Opp. 521. Aret. 176, 1). Letzterer wird von beiden mit den Händen verglichen und von beiden die Bemerkung hinzugefügt, daß er sich desselben zum Fressen bedienen müfste, da er wegen der Länge seiner Beine, die das Tier hoch über der Erde emporhielten, mit dem Maule nicht fressen könne (Opp. 525. Aret. 176, 6 f.). Endlich heben beide in gleicher Weise die Rauhigkeit und ungemeine Dicke seiner Haut hervor (Opp. 527. Aret. 177, 9). Bei diesem Sachverhalt findet vielleicht die Vermutung Beifall, daß Aretaios aus derselben Vorlage geschöpft hat wie Oppian²⁾ d. h. aus der Schrift des unter Marc Aurel lebenden Amyntianos περὶ ἐλεφάντων.

¹⁾ Ärzte schrieben damals mit Vorliebe ionisch: Luc. quom. hist. sit conser. c. 16.

²⁾ Daß Oppian und Paus. V 12 den Amyntianos benützt haben, glaube ich Herm. XXVII 402 wahrscheinlich gemacht zu haben.

2. Galen.

Pseudogalens Schrift *ὄροι ἰατρικοί*.

Von den Schriften Galens verheißt die unter seinem Namen überlieferte Schrift *ὄροι ἰατρικοί* (Gal. XIX 346 ff.) eine reichliche Ausbeute für die Doctrin der pneumatischen Schule. Valentin Rose¹⁾ und nach ihm Philippson²⁾ und H. Diels³⁾ haben darauf aufmerksam gemacht, daß in ihr ein gut Stück der Doctrin des Athenaios enthalten sei. Diese Vermutung ist mit gewisser Einschränkung richtig: außer Athenaios sind in ihr die späteren Vertreter der pneumatischen Schule wie Agathinos, Archigenes, Leonidas und Heliodor benützt. Kurz, um das Resultat der folgenden Untersuchung vorwegzunehmen, die Schrift rührt von einem zum Synkretismus hinneigenden Pneumatiker frühestens aus dem 3. Jahrhundert her.

Der erste, der diese Schrift erwähnt und zugleich an ihrer Echtheit zweifelt, ist der Scholiast zu Oribasius IV 535, 32: *Καταρτισμὸν ὁ Γαληνὸς φησιν ἐν τῷ περὶ ὄρων μονοβίβλῳ, εἴπερ ἄρα καὶ γνήσιόν ἐστιν αὐτοῦ τὸ σύγγραμμα, μεταγωγὴν ὅσ τοῦ ἀπὸ τοῦ παρὰ φύσιν τόπου εἰς τὸν κατὰ φύσιν⁴⁾*. Da der Scholiast zeitlich nicht allzu tief herabzurücken ist, vornemlich deshalb, weil ihm die reichen Schätze der medicinischen Litteratur aus dem Anfange des 2. Jhds. noch in ziemlicher Vollständigkeit vorlagen⁵⁾ so fällt sein Urteil ins Gewicht. Eine erfreuliche Bestäti-

¹⁾ Anecdota gr. et graecol. II 170.

²⁾ De Philodemi libro qui est *περὶ σημείων καὶ σημειώσεων* et Epicureorum doctrina logica, Berl. Dissert. 1881 p. 66 A. 1.

³⁾ Über das physikalische System des Strabon, Sitzgsb. d. Berl. Akad. der Wiss. 1893, 102 A. 2.

⁴⁾ Vgl. Gal. XIX 461, 7. Außerdem schol. Orib. IV 536, 16 = Gal. XIX 461, 1. Orib. 539, 3 und 20 = Gal. 461, 12 (der Text des Galen ist nach dem Scholion zu emendieren). Orib. 539, 26 f. = Gal. 462, 1. Orib. 539, 9 = Gal. 462, 5 f. Orib. 530, 5 = Gal. 462, 9. Orib. 536, 13 = Gal. 444, 1. Orib. 539, 5 f. = Gal. 460, 12 f.

⁵⁾ Der Scholiast kannte noch des Antyll und Heliodor *χειρουργούμενα*, des Archigenes *σύνοψις τῶν χειρουργουμένων*, des Rufus Schrift *περὶ τῶν ἐκτὸς παθῶν*, den Soran und anderes. Vielleicht läßt sich für seine Zeit

gung erfährt es durch die Thatsache, daß Aretaios für die Definition von akutem und chronischem Kopfschmerz benützt ist:

Gal. XIX 417, 1:

Τὸ μὲν τῆς κεφαλῆς ἄλγος μὴ χρόνιον ἔστι κεφαλαλγία, χρόνιον δὲ κεφαλαία. ἦν ἀλγέη κεφαλὴ σχεδίως ἐπὶ προσκαίρῳ αἰτίη, κῆν ἐπὶ πλεῦνας, κεφαλαλγίη καλέεται. ἦν δὲ διεθίξῃ χρόνῳ μακρῷ τὸ ἄλγημα καὶ περιόδοισι μακροῖσι καὶ πολλῇσι, καὶ προσεπιγίγνηται μέζῳ τε καὶ πλεῦνον δυσάλθῃ, κεφαλαίην κικλίσκομεν.

Aret. p. 68.

Ἦν ἀλγέη κεφαλὴ σχεδίως ἐπὶ προσκαίρῳ αἰτίη, κῆν ἐπὶ πλεῦνας, κεφαλαλγίη καλέεται. ἦν δὲ διεθίξῃ χρόνῳ μακρῷ τὸ ἄλγημα καὶ περιόδοισι μακροῖσι καὶ πολλῇσι καὶ προσεπιγίγνηται μέζῳ τε καὶ πλεῦνον δυσάλθῃ, κεφαλαίην κικλίσκομεν.

Demnach hat der Verfasser der *ῥοι* frühestens im 3. Jh. gelebt. Ein bedeutender Arzt war er ganz gewiß nicht. Das Ganze macht den Eindruck einer zu praktischen Zwecken verfaßten Zusammenstellung der wichtigsten Lehren der Medicin in der Gestalt von Definitionen. Daß der Verfasser keine andere Absicht damit verfolgt habe, bezeugt er in der Vorrede (346): *Τὴν περὶ τῶν ῥων πραγματείαν πολυωφελεστάτην ὑπάρχουσαν πᾶσι τοῖς ἰατροῖς, μάλιστα δὲ τοῖς εἰσαγομένοις τῶν νέων, ἔκρινα, καθὼς ἡξίωσας, καὶ συναγαγεῖν καὶ ἀναγράψαι, ἰατρῶν ἄριστε Θεῦθρα κτλ.*

Was die Richtung des Verfassers anlangt, so sind besonders im ersten physikalischen Teile der Schrift Spuren des pneumatischen Systems ganz unverkennbar: das Pneuma, die eingepflanzte Wärme und die Mischung der Qualitäten kehren in den meisten der hierhin gehörigen *ῥοι* wieder. Auf der andern Seite sind die Lehren der methodischen Schule nicht unberücksichtigt geblieben: die Unterscheidung z. B. von *παθητικὰ* und *ὕλικὰ στοιχεῖα* (357, 6 f.) geht auf diese Schule zurück, bei der Definition der halbdreitägigen Fieber (402, 14) wird die Ansicht dieser Schule erwähnt, allerdings ohne vom Verfasser gebilligt zu werden, endlich finden auch die Ansichten der Dogmatiker (351, 3. 357, 14. 387, 1) und Empiriker (357, 18. 396, 12) Berücksichtigung. Diese Verschmelzung der ver-

ein Anhaltspunkt daraus gewinnen, daß schon in der Zeit des Aetius und Paulus von Aegina die Hauptkoryphäen der Chirurgie, Heliodor, Antyll und Archigenes nur noch aus den Compilationen des Philumenos und Philagrios bekannt waren.

schiedenen Schultheorieen zwingt uns zu der Annahme, daß der Verfasser ein Vertreter der eklektisch-pneumatischen Schule war, die bekanntlich in der Folgezeit die medicinische Wissenschaft beherrscht hat. Die beiden jüngsten Ärzte, die der Verfasser mit Namen erwähnt, sind die beiden Pneumatiker Athenaios und Agathinos, der Begründer der eklektischen Schule. Den ersteren, der an zwei Stellen (356, 6. 392, 13) citiert wird, hat er nach der Vorrede (347, 16) selber benützt, trotzdem er keine derartige Schrift verfaßt, sondern nur gelegentlich in seine Schriften Definitionen mit einge-mischt habe.

In der That läßt sich mit Hilfe der vorrätigen Bruchstücke des Athenaios eine nicht allzu kleine Zahl unleugbarer Entlehnungen aufdecken. Die Einteilung der Arzneikunde in Physiologie, Pathologie, Diätetik, Materia medica und Therapeutik (def. 11, 351) geht nach Gal. XIV 689 auf Athenaios zurück¹⁾, ebenso die herophileische Definition von *ιατρική* (def. 9, 351)²⁾. Die zweite Definition vom *ἡγεμονικόν* (def. 113, 378) ist nach Gal. X 929 ebenfalls Gut dieses Arztes³⁾. Die Sätze der Temperaturmischung der Lebensalter und deren Verhältniß zu den Jahreszeiten (def. 104, 373) dürften

¹⁾ Def. 11: *Μέρη τῆς ἱατρικῆς, ἃ καὶ εἶδη τινὲς ἐκάλεσαν, ἔστι πέντε· φυσιολογικόν, παθολογικόν, διαιτητικόν, ὑλικόν καὶ θεραπευτικόν.* Gal. XIV 689: *Μέρη ἱατρικῆς τὰ μὲν πρῶτά ἐστι τό τε φυσιολογικόν καὶ τὸ αἰτιολογικόν ἢ παθολογικόν καὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ σημειωτικόν καὶ τὸ θεραπευτικόν.* Ἀθήναιος δὲ ἀντὶ τοῦ σημειωτικοῦ τὸ ὑλικὸν τάττει, ὃ ἐστὶν ἐν τῷ θεραπευτικῷ· ἄνευ γὰρ τοῦ ὑλικοῦ τὸ θεραπευτικὸν οὐκ ἂν εἴη. Vgl. Philippson a. a. O. 66 A. 1. Der pathologische Zweig der medicinischen Wissenschaft (sonst *παθολογικόν* oder *αἰτιολογικόν*) führte in der pneumatischen Schule die Bezeichnung *παθολογικόν*: Rufus und Archigenes verfaßten ein *παθολογικὸν τῶν ὀξέων καὶ χρόνιων παθῶν* (Orib. IV 529 vgl. 63. Gal. VIII 203).

²⁾ Im cod. Pal. 297 p. 53 steht in einem Excerpt aus Galen *περὶ αἰρέσεων· τί ἐστὶν ἱατρική; τοῦτον γὰρ τὸν ὄρον Ἀθήναιος ὁ Ἀππιαλεὺς εἶπεν· ἱατρική ἐστὶν ἐπιστήμη [ιατρική] ὑγιεινῶν καὶ νοσερῶν καὶ οὐδετέρων.*

³⁾ Def. 113: *οἱ δὲ οὕτως· ἡγεμονικὸν ψυχῆς ἐστὶ τὸ κατάρχον τῆς ὅλης τοῦ ζώου διοικήσεως, τεταγμένον δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ [τοῦ ἐγκεφάλου in Glossem und stammt aus der ersten Definition von ἡγεμονικόν].* Gal. X 929: *Ἰδὼν γοῦν ποτε τῶν ἀπ' Ἀθηναίου τινὰ τὴν κεφαλὴν αἰονῶντα ῥοδίνῳ καὶ ὄξει μεμιγμένοις (bei der Phrenesie) ἐκώλυον ἀξιῶν ἐπιφέρειν τῷ θώρακι τὸ βοήθημα· βεβλάφθαι μὲν γὰρ τῷ παραφρονοῦντι τὸ ἡγεμονικόν, εἶναι δ' ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦτο κατὰ τὸν Ἀθήναιον κτλ.* Vgl. Gal. VIII 19. 149. Aret. 24f.

nach Galen (I 522)¹⁾ aus ihm entlehnt sein. Von den fünf Definitionen, die der Verfasser vom Pulse giebt, stammt die dritte (def. 110, 376) aus Athenaios (Gal. VIII 756)²⁾, während die erste dem Archigenes entlehnt ist (Gal. VIII 754). Die letzte von den Fieberdefinitionen (def. 185, 398) gehört ihm gleichfalls an (Gal. I 522)³⁾. Ferner beachte man, daß die Lehre des Athenaios auf die Stoa gegründet ist. Er benützte besonders den Chrysipp⁴⁾, dem er wahrscheinlich auch seine Vorliebe für Definitionen verdankt. Damit wäre die Quelle aufgedeckt, aus welcher dem Verfasser die stoischen Definitionen zugeflossen sind (def. 29, 355. def. 94, 370. def. 154, 392).

¹⁾ Beide Stellen mögen hier in Gegenüberstellung ihren Platz finden:

Gal. def. 104 p. 373, 18:

Τέσσαρες εἰσιν ἡλικίαι, πρώτη μὲν ἢ τῶν νέων· δευτέρα δὲ ἢ τῶν ἀκμαζόντων καὶ τρίτη ἢ τῶν μέσων καὶ τετάρτη ἢ τῶν γερόντων. οἱ νέοι μὲν θερμοὶ τὴν κρᾶσιν καὶ ὑγροὶ καὶ τῷ ἔαρι παραπλήσιοι· οἱ δὲ ἀκμαζόντες θερμοὶ καὶ ξηροὶ καὶ τὴν αὐτὴν κρᾶσιν τῷ θέρει προσκεκτημένοι. οἱ μέσοι ψυχροὶ καὶ ξηροὶ εἰσι τῇ κράσει ὅμοιοι τῷ φθινοπώρῳ. οἱ δὲ γέροντες ψυχροὶ καὶ ὑγροὶ καὶ τῷ χειμῶνι παραπλήσιοι.

Gal. I 522:

ἐπιμέμνηται δ' ἐνταῦθα (sc. οἱ ἀπ' Ἀθηναίου τοῦ Αἰταλέως) καὶ τῶν ὥρῶν τοῦ ἔτους, ὑγρὸν μὲν καὶ ψυχρὸν εἶναι τὸν χειμῶνα φάσκοντες, ξηρὸν δὲ καὶ θερμὸν τὸ θέρος καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν τὸ φθινόπωρον, εὐκρατον δ' ἅμα καὶ θερμὴν καὶ ὑγρὰν ὥραν καλοῦσι τὸ ἔαρ· οὕτω δὲ καὶ τῶν ἡλικιῶν τὴν παιδικὴν εὐκρατόν τε καὶ θερμὴν καὶ ὑγρὰν εἶναι φασι κτλ.

²⁾ Def. 110 p. 375, 16: Σφυγμός ἐστι διαστολὴ καὶ συστολὴ καρδίας καὶ ἀρτηριῶν φυσικὴ = Archigenes bei Gal. VIII 754: Ὁ γοῦν Ἀρχιγένης ἐξεργάσθαι δοκῶν τὸν περὶ τῶν σφυγμῶν λόγον ἐν ἐνὶ μεγάλῳ βιβλίῳ κατὰ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ τόνδε τὸν ὅρον ἔγραψε· σφυγμός ἐστι καρδίας καὶ ἀρτηριῶν διαστολὴ φυσικὴ τε καὶ συστολὴ φυσικὴ. p. 376, 3: σφυγμός ἐστι κίνησις φυσικὴ καὶ ἀπροαίρετος τοῦ ἐν καρδίᾳ καὶ ἀρτηρίαις θερμοῦ εἰς ἑαυτὸ καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ συγκινοῦσα ὁμοίως τὴν τε καρδίαν καὶ τὰς ἀρτηρίας = Athenaios bei Gal. VIII 756: Αὐτὸς δὲ ὁ τῆς αἰρέσεως αὐτῶν ἡγεμὼν Ἀθήναιος τὸν σφυγμὸν ὁρίζειται κίνησιν κατὰ διαστολὴν φυσικὴν καὶ ἀπροαίρετον τοῦ ἐν ἀρτηρίαις καὶ καρδίᾳ θερμοῦ, ἐξ ἑαυτοῦ τε καὶ εἰς ἑαυτὸ κινουμένου καὶ συγκινοῦσα καρδίαν καὶ ἀρτηρίας. . . .

³⁾ Def. 185 p. 398, 14: πυρετός ἐστι δυσκρασία τοῦ φυσικοῦ πνεύματος ἐπὶ τὸ θερμότερον καὶ ξηρότερον = Athenaios bei Gal. I 522: πρὸς δὴ τοὺς τοιούτους λόγους ἀπομαχόμενοι τινες τῶν ἀπ' Ἀθηναίου τοῦ Αἰταλέως ὁμόσε χωροῦσιν, οὔτε κατάστασιν ὑγρὰν καὶ θερμὴν μέμφεσθαι λέγοντες . . . ἀλλὰ πάντως ἢ θερμὸν καὶ ξηρὸν ὑπάρχειν, ὡς τὸν πυρετόν κτλ.

⁴⁾ Vgl. S. 10.

def. 439, 450). Stoisch ist die Definition von *ἐξίς* (def. 96, 372) d. h. jener Kraft, welche die Teile des Körpers zusammenhält, die von ihnen als die grösste Art des Pneuma aufgefaßt wurde¹⁾. Die stoische Definition von *φύσις*, unter der das künstlerisch schaffende feurige Pneuma verstanden wurde, welches das rastlose Entstehen vermittelt²⁾, steht bei Gal. def. 95 p. 371, 4. Die zweite und letzte der Definitionen von *φύσις*, die zusammengehören, tragen ebenfalls durchaus stoische Farbe: der Ausdruck *κατὰ σπερματικὸν λόγον* ist ein spezifisch stoischer³⁾. Außerdem beweisen die Bruchstücke des Athenaios, daß er doxographisches Interesse hatte⁴⁾: Aristoteles, der in unserer Schrift an drei Stellen (355. 366. 457) citiert wird und dem z. B. die Definition des Syllogismus entlehnt ist⁵⁾, ist von Athenaios häufig genug benützt⁶⁾ worden, besonders in seiner Entwicklungslehre, ebenso Plato (def. 29, 355. def. 86, 368. def. 439, 449. def. 462, 457), Empedokles (def. 99, 372), Hippokrates (def. 99, 372. def. 138, 388. def. 139, 388. def. 439, 449. def. 462, 457). Asklepiades von Bithynien (def. 99, 373, def. 116, 379. def. 439, 450. def. 445, 452) und Diokles (def. 439, 449). Zur Gewissheit läßt sich freilich die Zurückführung dieses reichhaltigen doxographischen Materials auf Athenaios nicht erheben, immerhin gewinnt sie dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß er für uns der einzige Pneumatiker ist, bei dem sich Benützung dieser Schriftsteller nachweisen läßt.

Außerdem trägt eine ganze Reihe von Definitionen ganz unverkennbar pneumatisches Gepräge. Die Unterscheidung von drei Bestandteilen des Körpers, den festen, flüssigen und dem Pneuma (def. 33, 356), ist dieser Schule eigen (Aret. caus. ac. m. II 3, 40). Die Definition der Lunge (def. 47, 359): *Πνεύμων ἐστὶν ἀρτηριώδης ἐκ τῶν λείων καὶ τραχειῶν ἀρτηριῶν σομφότερος, ὄργανον ἀναπνευστικόν* berührt sich nahe mit Aret. caus. ac. m. II 1, 25: *μανὸς*

¹⁾ Die Definition stammt vielleicht von Chrysipp: Zeller III¹, 192. Stein, die Psychologie der Stoa I 90, 153.

²⁾ Vgl. Diog. Laert. VII 156: *Λοκεῖ δ' αὐτοῖς τὴν μὲν φύσιν εἶναι πῦρ τεχνικὸν ὁδῶ βαδίζον εἰς γένεσιν, ὅπερ ἐστὶ πνεῦμα πυροειδὲς καὶ τεχνοειδὲς* = def. 95: *Φύσις ἐστὶ πῦρ τεχνικὸν ὁδῶ βαδίζον εἰς γένεσιν καὶ ἐξ ἑαυτοῦ ἐνεργητικῶς κινούμενον*. Stein a. a. O. 42 A. 56.

³⁾ Vgl. Diog. Laert. VII 148. ⁴⁾ Vgl. S. 10.

⁵⁾ Vgl. Zeller II² 226 A. 3. def. 19 p. 354, 4.

⁶⁾ Vgl. S. 10 A. 4.

μὲν γὰρ τὴν οὐσίην, εἰρίοισιν ἔκελος. ἀρτηρίαι δὲ διελήλανται τραχεῖαι, χονδρώδεις . . . Die Leber ist nach def. 51, 360 ein Blutconcrement, venös und dient der Blutbereitung (ἐξαιμάτωσις). Vgl. Aret. caus. ac. m. II 7, 48: ἔστι γὰρ αἵματος πάγος τὸ πλεῖστον ἥπαρ . . . ῥίξωσις γὰρ φλεβῶν ἥπαρ γίγνεται . . . ἔργον γὰρ αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὴν ἐξαιμάτωσιν οὐκ ἔστιν ἀνάπαυλα οὐδὲ ἀμβολή. Die Behauptung, daß die Arterien mehr πνεῦμα, die Venen dagegen mehr Blut enthalten (def. 73. 74, 365) beruht auf pneumatischer Lehre. Vgl. Rufus 183 (Ruelle): φλέβες μὲν εἰσιν ἀγγεῖα περιεκτικὰ αἵματος, διὰ ὧν τὸ αἷμα εἰς πάντα τοὺς τοῦ σώματος τόπους παραπέμπεται· ἀρτηρίαι δὲ εἰσιν ἀγγεῖα περιεκτικὰ αἵματος μὲν ποσῶς, πνεύματος δὲ πλέον πολὺν, ἐν οἷς ὁ σφυγμὸς γίγνεται. Archigenes und seine Anhänger hatten die Ansicht verfochten, daß das Herz und die Arterien in der Systole des Pulses Luft einnehmen und das unrein gewordene in der Diastole wieder abgeben (Gal. V 162f. VIII 713. IX 424). Mit dieser Ansicht verknüpft sich von selbst die von unserm Autor vorgetragene Anschauung (def. 74, 366). Wenn er in den unmittelbar sich anschließenden Worten die Bedeutung der umgebenden Luft darin sieht, daß sie das innerorganische Pneuma abkühlt und gleichzeitig erhält, so beruht diese Anschauung gleichfalls auf pneumatischer Lehre (Antyll bei Orib. I 461).

Am deutlichsten tritt aber die Abhängigkeit des Verfassers der ὄροι von der pneumatischen Schule in seiner Pulstheorie entgegen. Es ist bekannt¹⁾, daß die spitzfindige Ausbildung dieser Lehre das zweifelhafte Verdienst der Pneumatiker ist, insbesondere des Archigenes, der in einer umfangreichen Schrift περὶ σφυγμῶν diese Theorie bis ins Einzelne behandelt hat.

Durch einen glücklichen Zufall ist uns in einem Scholion zu der Pseudogalenischen Schrift περὶ σφυγμῶν πρὸς Ἀντώνιον φιλομαθῆ καὶ φιλόσοφον (Gal. XIX 629 f.) die Pulseinteilung des Archigenes erhalten (Rufus 231). Darnach unterschied er in seiner Pulslehre zehn Kategorieen: Τὰ δέκα γένη τῶν σφυγμῶν ἐκ τῶν Ἀρχιγένους· α', τὸ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς (dazu rechnete er den μέγας und μικρὸς σφυγμός vgl. Gal. VIII 455f. XIX 629)· β', τὸ παρὰ τὸ ποιὸν τῆς κινήσεως (ταχὺς, βραδὺς σφυγμός)· γ',

¹⁾ Sprengel a. a. O. 104.

τὸ παρὰ τὸν τόνον τῆς δυνάμεως (σφοδρὸς, ἀμυδρὸς σφυγμός vgl. Gal. VIII 647)· δ', τὸ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς πληγῆς (βαρὺς, ἀβαρής Gal. VIII 659?)· ε', τὸ παρὰ τὸν χρόνον τῆς ἡσυχίας (πυκνὸς, ἀραιὸς σφυγμός)· ς', τὸ παρὰ τὴν σύστασιν (μαλακὸς, σκληρὸς σφυγμός vgl. Gal. VIII 578)· ζ', τὸ παρὰ τὴν ὁμαλότητα καὶ ἀνωμαλίαν (ὁμαλὸς, ἀνώματος σφυγμός)· η', τὸ παρὰ τὴν τάξιν καὶ ἀταξίαν· θ', τὸ παρὰ τὸ πλήθος καὶ τὸ κενόν· ι', τὸ παρὰ τὸν ῥυθμόν. Außerdem ist uns bezeugt, daß er innerhalb jeder Gattung drei Hauptarten unterschied, nämlich zwei Extreme und einen in der Mitte zwischen beiden Extremen liegenden Puls (μέσος Gal. VIII 591. 602. 603). Vergleicht man mit dieser Einteilung des Archigenes die Darstellung des Pseudogalen, so leidet es meines Erachtens keinen Zweifel, daß eben diese Einteilung unserm Autor vorschwebte (def. 208, 404f.). Im Einzelnen giebt sich die Abhängigkeit von Archigenes noch deutlicher zu erkennen. Aus seinen Definitionen des langen, breiten und hohen Pulses, die er als Unterarten der ersten Kategorie betrachtete (Gal. VIII 602), ergeben sich ohne weiteres die von unserm Autor vorgetragenen Definitionen des großen und kleinen Pulses (def. 208, 404f.). Ferner berühren sich die Definitionen des vollen und leeren¹⁾, starken und schwachen²⁾, unregelmäßigen und ungleichförmigen³⁾ Pulses so nahe mit denen

¹⁾ Def. 209 p. 404, 13: *Κενός ἐστι σφυγμός, καθ' ὃν αὐτῆς τε τῆς ἀρτηρίας ἢ περιοχῇ παντάπασιν ἰσχνή καὶ πομφολυγώδης ἐστὶν καὶ τὸ ἔγχυμα ἀμαυρόν καὶ ἐξίτηλον, ὥστε καὶ ἐάν τις πιέσῃ τοῖς δακτύλοις κενεμβατήσεως ἀντίληψιν ὑποπίπτειν* = Archigenes bei Gal. VIII 931: *κενός δὲ ὁ πομφολυγώδης τὴν ἔγερσιν τῆς ἀρτηρίας ποιούμενος, ὥστε κατὰ τὸν ἐπιπρισμὸν τῶν δακτύλων κενεμβατήσιν ὑποπίπτειν*. Vgl. Gal. VIII 509. Def. 209 p. 404, 9: *Πλήρης ἐστὶ σφυγμός ὁ διάμεστος πρὸς τὴν ἀφὴν ὑποπίπτων, ὥστε καὶ αὐτὸν μὲν τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας ἐπισημότερον δοκεῖν γεγονέναι· μάλιστα δὲ τὸ ἐντὸς αὐτῆς μεστότερόν τε καὶ σωματωδέστερον καταλαμβάνεσθαι* = Archigenes Gal. VIII 931: *ἐστὶ δὲ πλήρης σφυγμός ὁ νασιότεραν ἐπιδεικνὺς τὴν ἀρτηρίαν καὶ τὴν ὑπόπτωσιν αὐτῆς διασεσαγμένην ἐγχύλως*.

²⁾ Def. 213 p. 406, 5f.: *Σφοδρὸς ἐστὶ σφυγμός ὁ τὴν κίνησιν εὐτονον ἔχων καὶ βιαίαν ποιούμενος τὴν πληγὴν. Ἀμυδρὸς ἐστὶν ὁ ἐκλυτον ἔχων τὸν τόνον καὶ τὴν πληγὴν ποιούμενος ἀσθενῆ* = Archigenes bei Gal. VIII 647: *σφοδρὸς μὲν οὖν σφυγμός ὁ μείζονα τόνον ἔχων τῆς κινήσεως καὶ ῥοιζώδης ὢν· ἀμυδρὸς δὲ ὁ ἐκκελυμένον τὸν τόνον ἔχων καὶ ἀσύστροφον τὴν πληγὴν*. Vgl. Agathinos bei Gal. VIII 937.

³⁾ Def. 217 p. 407, 16f.: *Ἀταξία σφυγμοῦ ἐστὶν ἀκαταστασία τῆς κατὰ τοὺς σφυγμοὺς διαφορᾶς*. Def. 219 p. 408, 7: *Ἀνωμαλία σφυγμοῦ ἐστὶν*

des Archigenes, daß ihre Entlehnung aus seiner Pulslehre unzweifelhaft erscheint.

Wenn demnach in der ganzen Anlage der von unserm Autor vorgetragenen Pulslehre sowie in mehreren Einzeldefinitionen noch mit unserem knappen Fragmentenbestand die Spuren der Doctrin des Archigenes aufgedeckt werden konnten, so glaube ich zu der Annahme berechtigt zu sein, daß uns in dieser Theorie im wesentlichen Überreste der Pulslehre dieses berühmten Pneumatikers mit Zuthaten aus andern Pneumatikern vorliegen.

Den Definitionen der chirurgisch zu behandelnden Erkrankungen des menschlichen Körpers liegt die Doctrin der pneumatischen Chirurgie zu Grunde. Unter *ἀθήρωμα* versteht der Verfasser (def. 375 p. 440, 14) eine Geschwulst, deren Inhalt aus einer breiartigen Masse (*ἀθήρα*) besteht. Nach Pollux (IV 197), der in den Definitionen der äußeren Krankheiten methodische Überlieferung (Soran) repräsentiert, wurde diese Art von Geschwulst *γαγγλίον* benannt. Um so mehr fällt die Übereinstimmung unseres Autors mit den Ansichten der pneumatischen Chirurgen ins Gewicht, von denen nachweislich Leonidas (Aet. XV 7)¹⁾ und Antyll (Orib. IV 9, 9 nach Leonidas) dieselbe Erklärung gaben:

def. 375 p. 440, 14:	Orib. (aus Antyll):	Aetius:
<i>ἀθήρωμά ἐστι χιτῶν νευρώδης ἀθερωδὲς ὑγρὸν περιέχων.</i>	<i>τὸ ἀθήρωμά ἐστιν ὑγρὸν ἀργόν τε καὶ λευκὸν περιεχόμενον ἐν χιτῶνι.</i>	<i>περὶ ἀθερωμάτων καὶ μελικηρίδων. Λεωνίδου²⁾. Τὸ μὲν ἀθήρωμά ἐστιν</i>
	Vgl. schol. IV 527, 3: <i>ὄγκος ὁμόχρους, ἀνώδυνος, ἐν χιτῶνι νευρώσει (sc. Ἀντυλλος) ἀπὸ τοῦ τὸ περιεχόμενον εἶναι τῇ παρ' Αἰγυπτίοις λεγομένη ἀθήρα· ἔψημα δ' ἐστὶ γινόμενον παρ' αὐτοῖς ἐκ πυρίνου λευκοῦ ἀλεύρου.</i>	<i>ὄγκος ὁμόχρους, ἀνώδυνος, ἐν χιτῶνι νευρώσει περιέχων ἀργοῦ ὑγροῦ συλλογὴν εἰκοτός (εἰκοτές W.) τῇ λεγομένη ἀθήρα (ἀνθηρᾷ W.) τῇ ἐξ ἀλεύρου ἐψουμένου σκευαζομένη.</i>
		Vgl. Paul. Aeg. VI 36 (aus Antyll).

ἀνισότης σφυγμῶν κατὰ τινὰ τῶν παρεπομένων αὐτοῖς διαφορῶν = Archigenes bei Gal. VIII 626: *Ἀνωμαλία μὲν ἀνισότης σφυγμῶν κατὰ τινὰ τῶν παρεπομένων αὐτοῖς διαφορῶν· ἀταξία δὲ ἀσυστασία χρονικὴ κατὰ τινὰ τῶν τοῦ σφυγμοῦ διαφορῶν.*

¹⁾ Vgl. Cels. VII 6.

²⁾ Natürlich ist Leonidas nicht direkt von Aetius benützt, sondern, wie es scheint, durch Vermittelung des Philagrios: Vgl. Aet. XV 9.

Die Definition der Fettgeschwulst (def. 376 p. 440, 15): *στεάτωμα ἐστὶ παρὰ φύσιν πιμελῆς συναύξεσις* deckt sich mit Leonidas (Aet. XV 8): *Τὸ στεάτωμα πιμελή ἐστὶ παρὰ φύσιν ηὔξημένη κατὰ τὴν τοπικὴν ιδιότητα* und mit Heliodor (schol. Orib. IV 526, 6): *ὁ δὲ Ἡλιοδωρος ἐν πρώτῳ Χειρουργουμένων φησὶν ὅτι πιμελή ἐστὶ παρὰ φύσιν μεμεγεθοποιημένη . . .* Antyll gab dieselbe Erklärung: Vgl. schol. Orib. IV 526, 4. Paul. Aeg. VI 36. Cels. VII 6. Poll. IV 203.

Die Honiggeschwulst (*μελικηρίς*), die mit den vorher genannten gewöhnlich zusammen behandelt wird, fehlt bei unserm Autor. Nicht identisch ist das *κηρίον* (def. 391 p. 443, 1): *Κηρίον ἐστὶν ἔλκος συνεχεῖς ἔχον κατατρήσεις, ἐξ ὧν μελιτωδὲς ὑγρὸν ἐκκρίνεται*. Die abweichende Definition des Soran (Poll. IV 201) bestätigt wieder die Zusammengehörigkeit des Pseudogalen mit Leonidas (Aet. XV 11): *τὸ καλούμενον κηρίον ἔλκος ἐστὶν ὀγκῶδες (ὠμῶδες W.) καὶ ῥευματιζόμενον· φθειρόμενον γὰρ τὸ ἐπικείμενον δέρμα κατατιτράται καὶ ἰχώρ <ἀπορᾶ>ρεῖ· μελιτωδὲς δὲ ἐστὶν ὑγρὸν τὸ ἐκκρινόμενον λεπτὸν· διὸ καὶ κηρίον κέκληται διὰ τε τὸ σχῆμα τῶν διατρήσεων καὶ τὴν ἰδέαν τοῦ ἐκκρινόμενου ὑγροῦ* und mit Heliodor (schol. Orib. IV 526, 13): *Τὰ δὲ κηρία οὕτως ὠνομάσθαι ἐν α' Χειρουργουμένων λέγει (sc. ὁ Ἡλιοδωρος) κατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπὸ τοῦ ἐν τοῖς μελιτουργείοις κηρίου· ὥς γὰρ ἐκεῖνο κατατρήσεις ἔχει, δι' ὧν τὸ μέλι ἀπορᾶρεῖ, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ἔλκους φθειρομένη ἢ σὰρξ μελιτοειδῆ ἰχώρα ἐκκρίνει*.

Eine fernere Benützung pneumatischer Doctrin giebt sich in den Definitionen kund, die der Verfasser der *ὄροι* von den verschiedenen Darmbrucharten (def. 423 f. p. 447f.) giebt. Er unterscheidet 9 Arten: *ὑδροκήλη, ἐντεροκήλη, ὑδρεντεροκήλη, κιρσοκήλη, ὑδροκιρσοκήλη, πωροκήλη, ἐπιπλοκήλη, ἐντεροεπιπλοκήλη* und *ἐντεροπωροκήλη*. Die Definition der letzten Art ist infolge der schlechten Überlieferung ausgefallen. Die Parallelüberlieferung bei Pollux (Soran) IV 203 kennt diese hohe Ausbildung der Bruchlehre nicht: es werden hier nur vier Arten erwähnt: *ἐντεροκήλη, ὑδροκήλη, πωροκήλη* und *σαρκοκήλη*. Dafs sie der pneumatischen Schule angehört, folgt aus Oribasius (d. h. Antyll - Heliodor), der in den leider ausgefallenen Partien des 50. Buches seiner Compilation folgende 7 Arten behandelt hat: c. 28: *περὶ ὑδροκηλικῶν*. c. 36: *περὶ κιρσοκήλης*. c. 38: *περὶ πωροκήλης*. c. 39: *περὶ*

έντεροκήλης. c. 60: περὶ ἐπιπλοκήλης. c. 61: περὶ έντεροεπιπλοκήλης. c. 62: περὶ ύδροέντεροκήλης¹⁾). Die kurzen Definitionen des Pseudogalen decken sich mit Paulus von Aegina, der ebenfalls auf pneumatischer Doctrin beruht (Antyll oder Leonidas durch Vermittelung eines Compilators, nicht des Oribasius, sondern vielleicht des Philumenos), wovon eine Gegenüberstellung jeden überzeugen wird:

def. 424 p. 447, 11:

‘Υδροκήλη ἐστὶν ἀργοῦ ὑγροῦ σύστασις κατὰ μέρος τοῦ ὀσχεοῦ.

def. 425 p. 447, 13:

Έντεροκήλη ἐστὶν έντέρου κατολίσθησις εἰς τὸ ὀσχεον κατὰ βραχὺ ἢ ἀθρόως. αἰτίαι δὲ έντεροκήλης ἢ προκαταρκτικὴ έντασις ἢ πληγὴ, συνεκτικὴ δὲ ἐπέκτασις ἢ ῥήξις τοῦ περιτοναίου.

def. 427 p. 448, 3:

Κιρσοκήλη ἐστὶν ἀνευρυσμὸς καὶ μεγεθοποίησις τινων ἢ πάντων τῶν τρεφόντων τὸν δίδυμον ἀγγείων.

Paul. Aeg. VI 62 p. 261 (ed. Brian):

Ἀργὸν ὑγρὸν συλλεγόμενον περὶ τὸ μέρος τῶν τὸν ὀσχεον διαπλεκόντων σωματίων ὄγκον τε ἀπεργαζόμενον αἰσθητὸν ταύτης τῆς ὀνομασίας τετύχηκε.

Paul. Aeg. VI 65 p. 276:

Έντεροκήλη ἐστὶν εἰς ὀσχεον έντέρου κατολίσθησις. Γίνεται δὲ ἢ διὰ ῥήξιν τοῦ περιτοναίου ῥαγέντος κατὰ τὸν τοῦ κενεῶνος τόπον ἢ δι' ἐπέκτασιν (ἐκπέτασιν E. ἐπέκτασιν X.) αὐτοῦ τοῦ περιτοναίου. Ἀμφότερα μὲν οὖν, ἢ ῥήξις φημι καὶ ἢ ἐπέκτασις (EX), γίνονται βίας τινὸς προηγησαμένης, οἷον πληγῆς ἢ πηδήματος ἢ κραυγῆς. Ἡ δὲ κατ' ἐπέκτασιν ἰδίως καὶ διὰ πάρεσιν καὶ δι' ἐτέρας τοῦ σώματος ἀσθενείας γίνεται. Vgl. Aet. XIV 23 (aus Leonidas).

Paul. Aeg. VI 64 p. 272:

Τὰ μὲν κατὰ τὸν ὀσχεον ἢ τοὺς δαρτοὺς ἀγγεῖα κιρσούμενα κιρσοὺς ἀπλῶς ὀνομάζουσι. Τὰ δ' ἄλλα τὰ τρέφοντα τὸν δίδυμον ἐὰν ἀποκιρσωθῇ, κιρσοκήλην τὸ πάθος προσγορεύουσι. Τὰ δὲ σημεῖα τούτων εὐδηλα· σύστασις γὰρ ὀγκωδεστέρα ... καὶ χάλασμα τοῦ διδύμου προφαίνεται ... Daß Leonidas Quelle ist, folgt aus Paul. Aeg. p. 274: Ὁ δὲ Λεωνίδης φησὶν ὡς, ἐὰν μὲν τινα

¹⁾ Vgl. Orib. IV 680 f.

τῶν τρεφόντων τὸν δίδυμον ἀγγείων
ἀποκιρσωθῇ, οὕτω δεῖ πράττειν. Εἰ
δὲ πάντα

def. 429 p. 448, 8:

Πωροκήλη ἐστὶ πύρων σύστασις
κατὰ τι μέρος τοῦ ὀστέου.

Paul. Aeg. VI 63, 270;

Οἱ δὲ πῶροι κατὰ τε τὸν δίδυμον
καὶ κατὰ τὸν ἐλυτροειδῆ συνίσταν-
ται . . .

def. 430. 431. p. 448, 10:

Ἐπιπλοκήλη ἐστὶν ὀλίσθησις ἐπί-
πλου κατὰ τὸ μέρος τοῦ ὀστέου.

Ἐντεροεπιπλοκήλη ἐστὶν ὀλίσθησις
ἐντέρου τε καὶ ἐπίπλου κατὰ τὸ μέρος
τοῦ ὀστέου.

Paul. Aeg. VI 65, 278:

Εἰ μὲν οὖν τοῦ περιτοναίου ῥα-
γέντος ἐπίπλους μόνον ἐκπέσῃ κατὰ
τὸν ὀσχεον, ἐπιπλοκήλη προσαγο-
ρεῖται τὸ πάθος· εἰ δὲ καὶ ἔντερον,
ἐπιπλοεντεροκίκλη.

Eine feste Theorie setzt seine Lehre von den Schädelbrüchen voraus (def. 316f. p. 431, 13f.). Der Verfasser unterscheidet 8 Arten¹⁾: ῥωγμή, ἐγκοπὴ, ἐγγείσωμα, ἐμπίεσμα, καμάρωσις, ἀποσκεπαρισμός, ἀπήχημα und θλάσμα mit dem Bemerkten, daß einige Chirurgen nur 6 Arten gelten ließen, indem sie das θλάσμα überhaupt nicht für einen Bruch hielten und das ἀπήχημα als besondere Art der ῥωγμή faßten. Es liegt auf der Hand, daß die Achtteilung die ursprüngliche war und daß sie erst den Anlaß zur Bildung der sechsteiligen Theorie gegeben hat. Eine weitere Frage ist die, von wem diese beiden Theorien ausgebildet sind. In unserer Überlieferung ist Soran der erste, der eine genaue Unterscheidung der Schädelbrüche²⁾ kennt. Wollte man nun aber die auf den ersten Blick auffällige Übereinstimmung der Namen der einzelnen Schädelbrucharten mit denen Pseudogalens zu der Annahme verwerten, daß Soran die Quelle desselben gewesen, so würde eine genauere Betrachtung und Vergleichung der einzelnen Definitionen bald davon überzeugen, daß sie durch keinerlei Interpretationsmittel mit jenem Resultat in Einklang zu setzen sind. Die einzige Übereinstimmung besteht darin, daß ihm die sechsteilige Schädelbruchtheorie bereits

¹⁾ Def. 316, p. 431, 13: Διαφοραὶ τῶν ἐν κεφαλῇ καταγμάτων ὅκτι εἰσι· ῥωγμή, ἐγκοπὴ (ἐκκοπή Hds.), ἐγγείσωμα (ἐγγίσωμα Hds.), ἐμπίεσμα (ἐκπίεσμα Hds.), καμάρωσις, ἀποσκεπαρισμός, ἀπήχημα (ἀπαγμα Hds.), θλάσμα, [ἀπήχημα]. ἔνιοι δὲ τὸ μὲν θλάσμα εἶναι οὐ θέλουσι, τὸ δὲ ἀπήχημα τῇ ῥωγμῇ ὑπάγουσι.

²⁾ Physici et medici graeci minores ed. Ideler Vol. I, 248 f. Pseudo-Soran quaest. med. def. 219ff. in Roses Anecdota II 269.

bekannt ist: seine Definitionen berühren sich mit den vorliegenden höchstens im Allgemeinen. Dagegen kommen wir mit Paulus von Aegina einen Schritt weiter, der im 6. Buche seiner Compilation c. 90 dieselbe Theorie ausführlich behandelt. Eine Vergleichung derselben mit Pseudogalen läßt deutlich erkennen, daß die Quelle des Paulus identisch ist mit dem Vertreter der zweiten von Pseudogalen vorgetragenen Theorie. Der Gewährsmann des Paulus läßt nur sechs Arten von Schädelbrüchen gelten: ῥωγμή, ἐγκοπή, ἀποσκεπαρισμός, ἐμπίσμα, ἐγγείσωμα, καμάρωσις und polemisiert gegen die Vertreter der Ansicht, daß die θλάσις und das ἀπήχημα ebenfalls zu ihnen zu rechnen seien, mit derselben Begründung wie Pseudogalen, die sich nur durch die größere Ausführlichkeit von der vorliegenden unterscheidet. Den Namen dieser Quelle der sechsteiligen Theorie erfahren wir von Oribasius (IV 154 ff.) bei dem dieselbe Einteilung, allerdings mit Unterdrückung des Namens der einen Art (ἀποσκεπαρισμός) und dieselben Definitionen in fast wörtlicher Übereinstimmung mit Paulus und Pseudogalen wiederkehren:

Def. 317 p. 431, 18:

Paul. Aeg. VI 90, 366:

vgl. Orib. IV 155.

Ῥωγμή ἐστὶν ὁσίου διακοπή ἐπιπόλαιος <ἢ> βαθεῖα (εὐθεῖα Hds.) καὶ ἦτοι στενὴ ῥ πλατεῖα.

Vgl. Soran a. a. O. 248, 6.

Τοῦ δὲ κατάγματος τῆς κεφαλῆς αἱ διαφοραὶ εἰσὶν αὗται· ῥωγμή, ἐγκοπή, ἐμπίσμα, ἐγγείσωμα, καμάρωσις, ἐπὶ δὲ τῶν νηπίων καὶ θλάσις. Ῥωγμή μὲν οὖν ἐστὶ διαίρεσις τοῦ κρανίου ἐπιπόλαιος ἢ βαθεῖα, μηδαμῶς ἕως ἔξω μετακινήθεντος τοῦ πεπονθότος ὀστέου.

def. 318: Ἐγκοπή ἐστὶν ὁσίου διακοπή μετὰ τοῦ ἀνάκλαστον (ἄλλασθον Hds.) εἶναι τὸ πεπονθὸς ὁσίου.

Ἐγκοπή δὲ ἐστὶ διαίρεσις τοῦ κρανίου μετὰ ἀνακλασμοῦ τοῦ πεπονθότος. Εἰ δὲ καὶ ἀποθραυσθεῖν τὸ πεπονθὸς,

Orib. 163: Ἡ ἐγκοπή

ἐστὶ τοῦ κρανίου μετὰ ἀνακλασμοῦ τοῦ πεπονθότος, ἐστὶ δὲ ὅτε

def. 321: Ἀποσκεπαρισμός ἐστὶν ὁσίου ἀποκοπή μετὰ τοῦ <τὸ> ἀποκεκομμένον ὁσίου (ὁσίου Hds.) τεθραῦσθαι.

ἀποσκεπαρισμὸν τινες τοῦ πεπονθότος ὁσίου τὸ πάθος προσαγορεύου- σιν.

καὶ μετὰ ἀποθραύσεως τοῦ πεπονθότος ὁσίου.

def. 319: Ἐγγείσωμά Ἐγγείσωμα δέ ἐστι Orib. 165, 6: Τὸ ἐγγεί-
 ἐστιν ὅστοῦ διακοπὴ τοῦ ὀστέου διαίρεσις σωμα διαίρεσις ἐστιν
 μετὰ τοῦ τὸ διακεκομ- μετὰ τοῦ τὸ πεπονθὸς ὀστέου τοῦ κρανίου μετὰ
 μένον (διακείμενον Hds.) ὅστοῦν ὑπεληλυθῆναι τῷ τοῦ τὸ κατεαγὸς ὀστοῦν
 εἰς τὸ βάθος ὑποκεχω- (τοῦ Hds.) κατὰ φύσιν ὑποκεχωρηκέναι κάτω καὶ
 ρηκέναι καὶ ὑπεληλυθῆναι κάτω πρὸς τὴν μήνιγγα. ὑπεληλυθῆναι τῷ κατὰ
 (ὑπεληλυθῆναι Hds.) τῷ φύσιν.
 ἀπαθεῖ ὅστις.

def. 320: Ἐμπίεσμα Ἐμπίεσμα δέ ἐστι πο- Orib. 164, 6: Τὸ ἐμ-
 ἐστιν ὅστοῦ πολυμερὲς λυμερὲς τοῦ ὀστέου διαί- πίεσμα πολυμερὲς ἐστι
 διακοπὴ μετὰ τοῦ τὰ ρεσις μετὰ τοῦ τὰ κατε- τοῦ κρανίου διαίρεσις
 σιναρὰ (τάσιν δρᾶν Hds. αγότα ὀστιάρια ὑποκεχω- κατὰ τι μέρος μετὰ τοῦ
 ΤΑΣΙΝΔΡΑ) τῶν ὀστέων ρηκέναι κάτω πρὸς τὴν τὰ κατεαγότα ὀστιάρια
 εἰς τὸ βάθος ὑποκεχω- μήνιγγα. ὑποκεχωρηκέναι κάτω ὡς
 ρηκέναι καὶ θλίβειν τὴν πρὸς τὴν μήνιγγα.

def. 322: Καμάρωσις Καμάρωσις δέ ἐστι Orib. 164, 1: Ἡ καμύ-
 ἐστιν ὅστοῦ διακοπὴ μετὰ διαίρεσις τοῦ κρανίου ρωσις διαίρεσις ἐστι τοῦ
 τοῦ <τὸ> σιναρὸν ὅστοῦν μεθ' ὑψώσεως τῶν πε- κρανίου μετὰ ὑψώσεως
 ἀνακεκλᾶσθαι ἐξ ἀμφο- πονθότων <ὀστέων> ... τῶν πεπονθότων ὀστέ-
 τέρων καὶ παραπλησίως ων ...
 καμάραις ἐσχηματίσθαι.

def. 323: Ἀπήχημά ἐστιν ὅστοῦ
 διακοπὴ ἐπιπόλαιος ἢ καὶ βαθεῖα
 κατ' ἀντικείμενα μέρη τοῦ τραύματος.
 Vgl. def. 316.

Paul. Aeg. 368: Τινὲς δὲ ταύταις ταῖς
 διαφοραῖς καὶ τὸ ἀπήχημα προστεθεί-
 κασιν, ὅπερ ἐστὶ κατ' αὐτοὺς ῥῆξις
 κρανίου κατὰ τὰ ἀντικείμενα τῶν
 πεπληγμένων γενομένη μερῶν. Πλα-
 νῶνται δὲ οὗτοι

def. 324: Θλάσμα ἐστὶν ὑποχώρησις
 τοῦ ὀστοῦ τοῦ κρανίου εἰς τὸ βάθος
 δίχα κατάγματος. γίνεται δὲ ἐπὶ
 τῆς παιδικῆς μάλιστα ἡλικίας· νοή-
 σεις δὲ σαφέστερον τὸ εἰρημένον ἐπὶ
 τῶν κασσιτερίνων σκευῶν τοῦτο συμ-
 βαῖνον θεασάμενος.

368: Ἡ δὲ θλάσις οὐκ ἐστὶ διαί-
 ρεσις. τοῦ ὀστέου καὶ ταύτῃ ἂν τις
 εὐλόγως οὐδὲ κατάγμα φαίη τὴν τοι-
 αύτην διάθεσιν· ἀλλ' ἐστὶν ὡς νεῦσις
 καὶ οἶον κάμψις ἐπὶ τὰ ἔνδον τοῦ
 κρανίου κοιλαινομένου χωρὶς τοῦ λυ-
 θῆναι τὴν συνέχειαν, καθάπερ ἐπὶ
 τῶν χαλκῶν τε καὶ ὠμοβυσσίνων
 ἀγγείων ἔξωθεν πληττομένων γίνεται.
 Vgl. Orib. 167, 9.

Ich schliesse aus dieser Übereinstimmung, daß Paulus von Aegina
 in seiner Lehre von der Sechsteilung der Schädelbrüche demselben
 Gewährsmann folgt wie Oribasius d. h. nach dem Zeugnis des

Scholiasten¹⁾ dem Heliodor. Da die achteilige Theorie älter ist, so nehme ich sie für den älteren Leonidas in Anspruch, gegen den Heliodor, trotzdem er ihn benützt hat²⁾, auch sonst polemisiert³⁾.

Von weiteren Übereinstimmungen des Pseudogalen mit der pneumatischen Tradition des Oribasius mögen hier folgende Platz finden:

1. Def. 389 p. 442, 14: *Πῶρός ἐστὶν οὐσία λιθώδης, <ἀπηνής> καὶ ἀπόκριτος*. Orib. IV 11: *Ὁ κυρίως λεγόμενος πῶρος οὐσία λιθώδης ἐστὶν ἀλλόκοτος, ἀπηνής...* (naeh dem Scholiasten 527, 10 aus Buch I der Chirurgie des Heliodor).

2. Def. 380 p. 441, 6: *Γαγγλίον ἐστὶ νεύρου παρὰ φύσιν συστροφὴ σωματοπεποιημένη*. Orib. IV 15, 12: *Τὸ γαγγλίον νεύρου ἐστὶ συναγωγὴ πλεονάζον ἐν τοῖς καρποῖς, γινόμενον δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσιν* (aus Heliodor Buch I: schol. 527, 16). Vgl. dagegen Poll. IV 197: *γαγγλίον ἀπόστημα ἄπονον ὑπὸ λευκῷ καὶ νευρώδει χιτῶνι κτλ.* Paul. Aeg. VI 39, 184 stammt aus derselben Quelle wie Oribasius (Philumenos?), Aet. XV 9, der ebenfalls mit beiden übereinstimmt, nach dem Autorenlemma aus Philagrios.

3. Def. 402 p. 444, 7: *Θύμος ἐστὶν ἔκφυσις σαρκὸς τραχείας ὁμοία τοῖς ἐδωδίμοις θύμοις περὶ αἰδοίῳ καὶ ἔδρᾳ γινομένη*. Orib. IV 19, 6: *Θύμος ἔλκος ἐστὶν ὑπερσαρκῶν τραχεῖα καὶ ψαθυρὰ σαρκί· γίνεται δὲ ἐν τε ἔδρᾳ καὶ αἰδοίοις καὶ τοῖς ἄλλοις τόποις πᾶσιν κτλ.* Vgl. Poll. IV 194. Quelle des Heliodor oder Antyll, aus dem Oribasius stammt, ist Leonidas nach Aet. XIV 4 vgl. mit XIV 13, der auch dieselbe Etymologie giebt. Paul. Aeg. 71, 292 stammt aus Philumenos (vgl. Aet. XVI 105).

4. Def. 438 p. 449, 12: *Ἡλός ἐστὶν ἔλκος ἐν πέλματι περιφερὲς καὶ τετυλωμένον*. Orib. IV 20, 10 (aus Antyll oder Heliodor): *οἱ δὲ ἥλοι γίνονται μάλιστα μὲν ἐν τοῖς ποσίν· εἰσὶ δὲ σκληρότητες ὑπερέχουσιν πέλματος, περιεῤῥωγνῆται κτλ.* Paul. Aeg. VI 87, 344: *Ὁ μὲν ἥλος τύλος ἐστὶ περιφερής, λευκός, ὁμοιωμένος ἥλου κεφαλῇ, κατὰ πᾶν τοῦ σώματος μέρος συνιστάμενος, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς πέλμασι τῶν ποδῶν καὶ τοῖς δακτύλοις*. Paulus geht vielleicht auf Leonidas zurück: Aet. XIV 4. Vgl. XIV 82. Vgl. schol. Nic. Ther. 272. Poll. IV 195.

¹⁾ Vgl. schol. Orib. IV 531, 6. 7. Heliodor wird vorher von Orib. p. 147 citiert.

²⁾ Schol. Orib. IV 527, 25 = Leonidas bei Aetius XV 5.

³⁾ Vgl. Orib. IV 201, 4 mit Aet. VI 1 (aus Leonidas).

5. Def. 400 p. 444, 3: Ἀκροχορδῶν ἐστὶν ἔκφυσις περιφερῆ τε καὶ διάστενον ἔχουσα βάσιν. Heliodor bei Orib. 21, 5: Ἔστι δὲ ἡ μὲν ἀκροχορδῶν σαρκώδης ὑπεροχὴ λεία, στενὴ βάσει κε-
 χρημένη. Paul. Aeg. VI 87, 346: Ἡ δὲ ἀκροχορδῶν ἐπανάστασις ἐστὶ μικρὰ τῆς ἐπιφανείας, ἄπονος, τυλώδης, περιφερῆς κατὰ τὸ πλεῖστον, τὴν δὲ βάσιν ἔχουσα στενὴν ὥς δοκεῖν ἐκκρεμᾶ-
 σθαι. Vgl. Aet. XIV 4. Dagegen Pollux IV 195: ἀκροχορδῶν ἀπο-
 μὲν τῆς ῥίζης λεπτὴ ἔκφυσις, περὶ δὲ τὸ ἄκρον παχυνομένη, μάλιστα ἐπὶ παιδίῳ.

6. Def. 401 p. 444, 5: Μυρμηκία ἔκφυσις ἐστὶ παχεῖα καὶ μὴ διάστενον ἔχουσα βάσιν. Paul. Aeg. VI 87, 344: Ἡ δὲ μυρ-
 μηκία ἐπανάστασις ἐστὶ τῆς ἐπιφανείας μικρὰ, τυλώδης, στρογ-
 γύλη, παχεῖα, κατὰ βάσιν ἐγκαθήμενη . . . Heliodor bei Orib. IV 21:
 Ἡ δὲ μυρμηκία τραχεῖα ὑπεροχὴ ἐνεῖδιζομένη τῷ σώματι. Vgl.
 Aet. XIV 4. Poll. IV 195: μυρμηκία ἔκφυσις στερεὰ καὶ τραχεῖα,
 τυλώδης, ἔναιμος, περὶ τὰ ἄκρα καὶ τὰ ἔσω τῆς χειρός.

7. Def. 399 p. 444, 1: Ἀγκύλη ἐστὶ πίεσις τῶν περὶ τὸν τράχηλον ἢ τὰ ἄρθρα τενόντων, δι' ἣν ἐμποδίζεται ἡ ἐνέργεια. Antyll bei Orib. IV 22: Τὸ προσαγορευόμενον ἀγκύλιον σχεδὸν ἐν πᾶσι τοῖς ἐπὶ πολὺ καμπτομένοις μέρεσι τοῦ σώματος γίνε-
 ται· καὶ γὰρ περὶ τράχηλον συνίσταται καὶ περὶ μασχάλην καὶ
 περὶ ἀγκῶνα περὶ τε δακτύλους· συνίσταται δὲ καὶ περὶ βου-
 βῶνα καὶ ἰγνύαν καὶ περὶ τὴν τοῦ ποδὸς πρὸς κνήμην συναφήν.
 Ἔστι μὲν οὖν συνολκὴ σωμάτων φύσει καμπτομένων καὶ ἐκτει-
 νομένων, ἐκ δὲ τοῦ πάθους συναγομένων οὕτως, ὥστε ἐκτείνε-
 σθαι μὴ δύνασθαι. Γίνεται δὲ ἥτοι τῶν νεύρων τῶν κάμπτειν
 τὰ σώματα πεφυκότων συνταθέντων διὰ πάθος, ἢ ἐκ γενετῆς
 οὕτω φύντων . . . Vgl. Poll. IV 196.

8. Def. 378 p. 441, 1. Ἀνεύρυσμά ἐστὶ φλεβώδους ἀγγείου ἀνευρυσμὸς ἢ πνευματικῆς ὕλης παρασπορὰ ὑπὸ τῆς σαρκὸς κατὰ διαπήδησιν ἀναδιδομένης. Aet. XV 9 (aus Leonidas): κοι-
 νῶς δὲ τὸ ἀνεύρυσμά ἐστι (ἢ ἀνεύρησις W. am Rande von anderer
 Hand: αἰτιόν ἐστὶν τοῦ ἀνευρύσματος. P: κοινὸς δὲ αἴτιον τοῦ
 ἀνευρύσματος) κατὰ διήθησιν τοῦ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αἵματος
 καὶ πνεύματος ἢ κατὰ ἀναστόμωσιν τῶν ἀρτηριῶν ἢ κατὰ ῥῆ-
 ξιν. τὸ δὲ κατὰ βραχὺ ἐκκρινόμενον αἷμα καὶ πνεῦμα ἀθροί-
 ζεται ὑπὸ τὸ δέρμα.

9. Def. 388 p. 442, 12: Κολόβωμά ἐστιν ἔκκοψις μορίου κατὰ τι μέρος τοῦ σώματος. Antyll bei Orib. IV 56: "Ἔστι μὲν τὸ κολόβωμα ἑλλειψις μορίου ἢ τινος δέρματος καλύπτοντος τὰ σώματα.

10. Def. 395 p. 443, 11: Τερηδὼν ἐστιν ὁστιοῦ κατὰτρησις ἀπὸ φθορᾶς. τὸ δὲ ὄνομα τῷ πάθει ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων τρημάτων οἷονεῖ τις τρηδὼν οὔσα. Heliodor bei Orib. IV 187: Τὴν τοῦ κρανίου φθορὰν καὶ τῶν ἄλλων ὀστέων συνήθως οἱ ἰατροὶ τερηδόνα προσηγόρευσαν. Die Erklärung des Namens war bei Heliodor eine andere. schol. IV 533, 34: Ὅτι κατὰ μεταφορὰν τῶν προσιζουσῶν τερηδόνων τοῖς πλοίοις εἴρηται τὸ πάθος, ὡς αὐτός φησιν· ὥσπερ γὰρ ἐκεῖναι διεσθίουσι τὸ ξύλον, οὕτω καὶ τὸ πάθος φθείρει τὰ ὀστέα. Ὁ δὲ Γαληνὸς ἐν τῷ περὶ αἰτίας νοσημάτων φησὶν (VII 38)· τὸ δὲ τῆς τερηδόνης ὄνομα πλεονάζειν πῶς δοκεῖ τῷ στοιχείῳ· παρὰ γὰρ τὸ τρημα συγκεῖσθαι πεπίστευται, καθάπερ τρηδὼν τις οὔσα. Vgl. Poll. IV 192.

11. Def. 390 p. 442, 15: Ὑδροκέφαλόν ἐστιν ὑδατώδους ὑγροῦ ἢ αἵματος τοῦ τρυγώδους συλλογὴ κατὰ τι μέρος τῶν τὴν κεφαλὴν πλεκόντων σωμάτων. Leonidas bei Aet. VI (XV 12 im cod. Weig.): περὶ ὑδροκεφάλων· Λεωνίδους. Ὑδροκέφαλον προσηγόρευται ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ ὑδατώδους ὑγροῦ συλλεγομένου· κατὰ τὸ πλεῖστον μὲν (δέ W) ὑδατῶδες συλλέγεται, ἐνίοτε δὲ καὶ τρυγῶδες καὶ δίαιμον. Vgl. Antyll bei Orib. IV 201. Paul. Aeg. VI 3.

12. Def. 394 p. 443, 8: Διονυσίσκοι εἰσὶν ὀστώδεις ὑπεροχαὶ ἐγγὺς κροτάφων γιγνόμεναι. λέγονται δὲ κέρατα ἀπὸ τῶν κερασφορούντων ζώων κεκλημένα. Heliodor bei Orib. IV 204, 14: Ὀστώδης ἐπίφυσις ἐν παντὶ μὲν γίνεται μέρει τοῦ σώματος, πλεοναζόντως δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ, μάλιστα δὲ πλησίον τῶν κροτάφων. Ὅταν δὲ δύο ἐπιφύσεις γένωνται πλησιάζουσιν τοῖς κροτάφοις, κέρατα ταῦτά τινες εἰώθασιν ὀνομάζειν, ἐνιοὶ δὲ διονυσίσκους τοὺς οὕτω πεπονθότας ἀνθρώπους προσηγόρευσαν. Heliodor beim Schol. 534, 9: Κέρατα μὲν λέγεται ἀπὸ τῆς τῶν κερμάτων ἐκφύσεως τῶν γινομένων τοῖς ἀλόγοις ζώοις. Διονυσίσκους δὲ αὐτοὺς προσαγορεύουσιν ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν θεὸν ἐμφερείας, ὡς αὐτός φησιν ἐν τοῖς χειρουργουμένοις. cf. Poll. IV, 205.

13. Def. 413 p. 445, 8: Ὑποσπαδίας ἐστὶ πάθος, ἐφ' οὗ ἡ βάλανος ἐφείλκυσται. ἢ ἐστὶ πάθος, ἐφ' οὗ ἡ βάλανος ἀποκέ-

κλείται (ἀπόκειται Hds.) καὶ τὸ τῆς οὐρήθρας τρῆμα (τρίμμα Hds.) ὑκόκειται. Antyll und Heliodor bei Orib. IV 463, 13: Ἐκ γενετῆς ἐνίοις ἢ βάλανος οὐ τέτρηται κατὰ φύσιν, ἀλλὰ ὑπὸ τῷ κυνὶ καλουμένῳ κατὰ τὸν ἀπαρτισμὸν τῆς βαλάνου τὸ τρῆμά ἐστιν... Ποτὲ μὲν οὖν πόρρω τοῦ κυνὸς εὐρίσκεται τὸ τρῆμα κατὰ μέσσην τὴν οὐρήθραν πρὸς τῇ τοῦ καυλοῦ βάσει... ποτὲ δὲ κατὰ τὸν λεγόμενον κύνα... Vgl. schol. 540, 14: Ἀπὸ τῶν Ἀντύλλου χειρουργουμένων, βιβλίον β', κατὰ τὸ γ' μέρος. Ὑποσπαδιαίαν δὲ λέγεσθαι φησιν αὐτὴν ὁ Ἡλιοδώρος ἐν τῷ δ' τῶν Χειρουργουμένων παρὰ τὸ σπᾶσθαι τὴν βάλανον. Vgl. Paul. Aeg. VI 54, 238 (aus derselben Quelle wie Oribasius: Philumenos?).

14. Def. 415 p. 445, 14: Φίμος ἐστὶν ἢ τῶν πόρων φυσικῶν κατάκλεισις. διαφοραὶ δὲ τοῦ φίμου δύο· ἢ γὰρ ἐκ φύσεως ἢ ἐξ ἐπιγενήματος ἐλκώσεως προηγησαμένης γίνεται. Def. 416: περιφίμωσις (παραφίμωσις Hds.) ἐστὶν ἀποσυρέντος τοῦ τῆς βαλάνου νεύρου, ὥς μηκέτι ἐπισῦραι τὴν πόσθην δύνασθαι. Antyll bei Orib. IV 466, 5: Λιπτὸν τὸ τῆς φιμώσεως ἐστὶν· ποτὲ μὲν γὰρ ἢ πόσθη καλύψασα τὴν βάλανον ἀποσύρεσθαι πάλιν ἀδυνατεῖ· ποτὲ δὲ ἀπαχθεῖσα ὀπίσω, οὐκέτι ἐπάγεται. Τοῦτο τὸ εἶδος ἰδίως περιφίμωσις προσαγορεύεται. Ἡ μὲν οὖν πρώτη διαφορὰ γίνεται διὰ οὐλήν ἐν πόσθῃ γενομένην, ἢ διὰ σαρκὸς ἔκφυσιν. Vgl. Paul. Aeg. VI 55, 240.

15. Def. 420 p. 446, 16: Κονδύλωνά ἐστι δακτυλίου στολιδώδης (στολίδος Hds.) ἐπανάστασις μετὰ φλεγμονῆς. Paul. Aeg. VI 80, 328: Τὸ ἐν τῷ δακτυλίῳ κονδύλωμα κατὰ τὸν τόπον μόνον τῶν ἐν τοῖς γυναικείοις διενήνοχε, στολιδῶδες ὄν καὶ αὐτὸ, τῆς ἔδρας ἐπανάστασις, ἢ φλεγμονῆς ἢ ῥαγάδος προηγησαμένης. Vgl. Aet. XIV 3.

16. Def. 412 p. 445, 7: Φύγεθρόν (φύγεθρον Hds.) ἐστὶ κατὰ βουβῶνα γινόμενον ἀπόστημα. Heliodor beim Schol. Orib. III 687, 12: Ὁ Ἡλιοδώρος ἐν τρίτῳ Χειρουργουμένων, κεφαλαίῳ περὶ τῶν κατὰ τοὺς βουβῶνας ἀποστημάτων φησὶν ὡς οἱ μὲν φύγεθρα, οἱ δὲ φύματα προσηγόρευσαν... Vgl. Orib. III 611. Poll. IV 191.

Mit gleicher Sicherheit drängt sich bei der Vergleichung der Definitionen der inneren Krankheiten mit Aretaios die Wahrnehmung auf, daß ihre Übereinstimmung mit jenem Pneumatiker nicht ein

Spiel des Zufalls sein kann, sondern auf den Einfluss pneumatischer Doctrin zurückgeführt werden muß.

Aretaios (caus. ac. m. II 3, 38) betrachtete nach dem Vorgange des Asklepiades (C. Aur. A. M. II 31) die *συγκοπή* oder *καρδιακή διάθεσις* als eine Affection des Herzens, bei der die Bande, welche die Lebenskraft zusammenhalten (der *τόνος*), gelöst werde, nicht als ein Magenleiden: *οὐδὲ τὴν συγκοπὴν ἄπιστον τῆς καρδίας νοῦσον ἔμμεναι ἢ αὐτὴν σίνος τῆς ἐν αὐτῇ τοῦ ζῆν δυνάμιος . . . ἔστι γὰρ τὸ πάθος λύσις τῶν δεσμῶν τῆς εἰς ζωὴν δυνάμιος . . .* p. 41: *ἣν δὲ τῆς φύσιος ὁ δεσμός, τουτέστι ὁ τόνος, λυθῇ, τότε γίγνεται τὸ πάθος.* Pseudogalen def. 265 p. 420, 15 referiert beide Ansichten.

Die Cholera ist nach unserm Autor (def. 266 p. 421, 9) ein *acutes* Leiden, bei dem sich galliges Erbrechen, Durchfälle, Wadenkrämpfe, Erkaltung der Extremitäten und ein kleiner, schwacher Puls einstellt. Die Beschreibung des Aretaios (caus. ac. m. II 5, 43) stimmt damit überein:

def. 266 p. 421, 9:

χολέρα ἐστὶ πάθος ὃξὺν μετ' ἐμέτων πολλῶν χολωδῶν καὶ ὑποχωρήσεων τῆς κοιλίας μετὰ τοῦ συνέλκεσθαι τὰς γαστροκνημίας καὶ καταψύχεσθαι τὰ ἄκρα. γίνονται δὲ ἐπ' αὐτῶν οἱ σφυγμοὶ μικρότεροι καὶ ἀμυδροίτεροι.

Aretaios:

Ἡ χολέρα . . . ὀξύτατον κακόν· διεκθέει δὲ ὑπερθεῖν μὲν ἐς ἔμετον τὰ ἐν τῷ στομάχῳ ἀλιζόμενα· διὰ δὲ τῆς κάτω διεξόδου τὰ ἐν τῇ κοιλίῃ καὶ τοῖς ἐντέροις ὑγρά . . . ἣν δὲ τάδε ἀποκλυσθῇ, φλεγματώδεα, ἔπειτα χολώδεα . . . σπασμοὶ, ξυνολκαὶ μυῶν τῶν ἐν τῇ κνήμῃ καὶ βραχιόνων . . . ἄκρα ψυχρά . . . σφυγμοὶ σμικρότατοι καὶ πυκνότατοι . . .

In der Definition des Brennfiebers (def. 188 p. 399, 7) decken sich die von Pseudogalen angegebenen Symptome: beissende Hitze des ganzen Körpers, trockene Zunge, Verlangen nach Kälte, vermehrte Respiration, Wärme der ausgeatmeten Luft, mit Aretaios caus. ac. II 4, 41:

def. 188 p. 399, 7:

Καῦσός ἐστιν ὁ μετὰ πυρώσεως πολλῆς γινόμενος ἀναστολὴν μηδεμίαν τῷ σώματι παρέχων, γλῶσσαν ἐπιξηραίνων, μελαίνων, ἐπιθυμίαν ψυχροῦ παρέχων μετὰ ἀναπνοῆς μεγάλης καὶ θερμῆς τὸ σῶμα ἐπ' ἄλγος διατιθεῖς.

Aretaios:

Περὶ καύσων. Πῦρ μὲν πάντη καὶ δριμὺ καὶ λεπτὸν, μάλιστα δὲ τὰ εἶσω, ἀναπνοὴ θερμὴ ὡς ἐκ πυρὸς, ἥερος ὀλκὴ μεγάλη, ψυχροῦ ἐπιθυμία, γλώσσης ξηρότης.

Unter *περιπνευμονία* versteht unser Autor (def. 269 p. 419, 12) eine Entzündung der Lunge, mit der heftiges Fieber und Atemnot verbunden ist und bei der sich die Wangen des Kranken röten. Vgl. Aretaios caus. ac. m. II 1 p. 25:

def. 269 p. 419, 12:

Περιπνευμονία ἐστὶ φλεγμονὴ πνεύμονος μετὰ πυρετοῦ ὀξέος καὶ δυσπνοίας· γίνεται δὲ ἐπ' αὐτῶν καὶ ξνερευθῇ τὰ μῆλα.

Aretaios:

Ἐπὶ δὲ μεγάλῳ πάθει, ὁκοῖον ἡ φλεγμονὴ (sc. τοῦ πνεύμονος), πνιγμός, ἀφωνίη, ἀπνοια, ὀλεθρος αὐτίκα· ἡ δὲ ἐστὶν ἣν καλέομεν περιπνευμονίην, φλεγμονὴ τοῦ πνεύμονος, ξὺν ὀξεί πυρετῷ ... ξουθοὶ τὰ πρόσωπα, ἐπὶ δὲ μᾶλλον τὰ μῆλα ...

Der *τέτανος* besteht in einer Spannung der Sehnen und Muskeln. Er unterscheidet sich vom *ὀπισθότονος* und *ἐμπροσθότονος* dadurch, daß bei ihm der Körper gestreckt wird und so steif, daß er den Hals weder drehen noch wenden kann, daß Ober- und Unterkiefer und die Zähne fest auf einander geprefst werden. Ist der Körper des Kranken nach hinten gebogen, so heißt das Leiden *ὀπισθότονος*, im umgekehrten Falle *ἐμπροσθότονος*. Vgl. def. 237. 238. 239. p. 413, 13f. = Aretaios caus. ac. m. I 6 p. 6f. Vgl. Aet. VI 38, 39 (Archigenes).

Die *ὕστερικὴ πνίξις* entsteht nach der Definition Pseudogalens durch eine Bewegung des Uterus entweder nach oben oder nach unten, wobei Stimmlosigkeit eintritt, der Atem derart abgeschnitten ist, daß die Inspirationen gar nicht bemerkbar sind, der Puls endlich schwach und langsam ist (def. 300 p. 428, 15). Die von ihm angegebenen Symptome kehren bei Aretaios wieder (caus. ac. m. II 11, 60):

def. 300 p. 428, 15:

Ὑστερικὴ πνίξις ἐστὶ πάθος δι' ἀναδρομὴν ὑστέρας γιγνόμενον ἢ κατὰπτωσιν καὶ ἀφωνίαν ἐπιφέρον (-ει Hds.), ὥστε καὶ τὴν ἀναπνοὴν αὐταῖς οὐκ ἐκδηλον γίνεσθαι, μετεωρίζεσθαι τε τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὸν σφυγμὸν ἔχειν ἀμυδρὸν καὶ βραδύν.

Aretaios:

κινέεται γὰρ (sc. ἡ μήτηρ) ἐξ ἐσωτῆς ἔνθα καὶ ἔνθα ἐπὶ τὰς λαγόνas· ἀτὰρ καὶ ἐς τὰ ἄνω ... γίγνεται δὲ καὶ προπετεστέρη ἐς τὰ κάτω ... σφυγμοὶ διαλείποντες, ἄτακτοι, ἐκλείποντες, πνίξις καρτερή, ἀφωνίη, ἀναισθησίη, ἡ ἀναπνοὴ ἄσημος, [ἀσαφής Wil.] ...

Vgl. Aet. XVI 68 *περὶ ὕστερικῆς πνιγός* (aus Archigenes durch Vermittelung des Philumenos).

Zum Schluß verweise ich noch auf folgende Übereinstimmungen:
 def. 260. 261 p. 419, 15 = Aret. caus. chr. m. I 8 p. 91 f. def. 264
 p. 420, 11 = Aret. caus. ac. m. I 10, 20. def. 273 p. 423, 4 = Aret.
 caus. ac. m. II 6, 45. def. 289 p. 426, 12 = Aret. caus. ac. m. II 12, 63.

Galens Schriften *περὶ διαφορᾶς πυρετῶν, περὶ τῶν
 πεπονηθότων τόπων* und *περὶ σπέρματος* B. II.

Die Art der Quellenbenützung ist in den einzelnen Schriften des Galen verschieden. Die einen sind flüchtig hingeworfene Compilationen, wie der Commentar zu der hippokratischen Schrift *περὶ χυμῶν*¹⁾ und seine verschiedenen Schriften über Arzneimittellehre, in denen nach Art der nachchristlichen Compilatoren große Excerptenmassen in mechanischer Wörtlichkeit an einander gereiht sind. Die Analyse derselben ist einfach. Anders steht es mit den Schriften, in denen Galen seine eigenen Gedanken mit denen seiner Quelle verwebt. Bei seiner geradezu verblüffenden Redseligkeit wird es uns nicht Wunder nehmen, daß auch über die Art seiner Quellenbenützung in diesen Schriften eine Bemerkung aus seiner Feder geflossen ist. In seiner Schrift *περὶ κρίσεων* (IX 670 f.) teilt er seinen Lesern mit, daß er zur Vermeidung von unnötiger Weiterschweifigkeit sich damit begnüge, die falschen Ansichten seiner Vorgänger zu berichtigen und das Fehlende zu ergänzen: *ταῦτ' οὖν ἅπαντα εἰ μεταφέρειν εἰς τόνδε τὸν λόγον ἐπιχειρήσαιμι, καὶ τοῦτοις ἔτι προσθεῖναι τὰ ὑφ' ἡμῶν εἰρημένα, μέμψονται τῷ μήκει τῆς πραγματείας. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν πυρετῶν διαφορᾶς, εἰ πάντα κατὰ τόνδε τὸν λόγον ἐπεξίτοιμι, πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι μηκύνειν αὐτοῖς δόξω. τὸ μὲν οὖν δύνασθαι διαφυγεῖν ἐπήρειαν γράμμα μηδὲν οὕτως ἦν παλαιὸν, ὥστε καὶ Πλάτων αὐτοῦ μέμνηται. τὸ δ' οὕτω τούτων ἐχόντων ἐκλέγεσθαι μέσον εἶδος λόγων, ἄριστον εἶναί μοι φαίνεται. τί δὲ τὸ μέσον ἐστὶν δεικνὺς μὲν ἃ χρὴ γινώσκειν ἐξ ἀνάγκης τὸν μέλλοντα καλῶς προγνώσεσθαι λύσιν νοσήμανος, ὅποια τέ τις ἔσοιτο καὶ καθ' ὄντινα χρόνον. οὐχ ἅπαντα δ' αὐτὰ νῦν ἐπεξερχόμενος, ἀλλ' ὅσα ἀσαφῶς εἴρηται τοῖς ἔμπροσθεν ἐξηγούμενος, ὅσα δὲ παραλέλειπται, προστιθείς. τὸ δ' ἦτοι τὰ καλῶς*

¹⁾ V. Rose, *Anecdota gr. et graecol.* I 22 f.

θ' ἅμα καὶ σαφῶς εἰρημένα μεταγράφειν, ἢ τοῖς ψευδῶς εἰρημένοις ἀντιλέγειν, ὥς εἰς μακρολογίαν ἀπάγον, ἐφνλαξάμην. Diese Mitteilung hat meines Erachtens darin ihren Grund, daß er für diesmal von seinem gewöhnlichen Verfahren abgewichen ist, welches darin bestand, daß er das Gute seiner Quelle verwertete, mit andern Worten, daß er seine Quelle da, wo die Ansichten derselben seine Billigung fanden, ebenfalls excerpierte.

Mit diesem Zeugnis des Galen gewinnen wir einen festen Anhalt für die Beurteilung seiner sorgfältig durchgearbeiteten Schriften. Wir wären demnach allen Unbequemlichkeiten einer Quellenanalyse überhoben, wenn er sich dazu verstanden hätte, hier und da seine Quelle mit Namen zu nennen. Statt dessen unterläßt er jeglichen citierenden Fingerzeig und erwähnt seine Quelle nur da, wo er gegen sie polemisiert. Zu dieser Kategorie von Schriften gehören die drei erwähnten.

Die Pathologie verdankt der pneumatischen Schule eine Reihe neuer Theorien, welche in der Folgezeit herrschend geworden sind. In erster Linie die Lehre von den Fiebern. Der Stifter der Schule, Athenaios, ferner Agathinos, Herodot und Archigenes haben an ihrer Vervollkommnung gearbeitet. Der letztere verfaßte eine umfängliche Schrift *περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως* in 10 Büchern¹⁾, in welcher er die Errungenschaften seiner Schule zusammenstellte. Diese Schrift, von der es auch eine Epitome gab, veranlaßte den Galen zur Abfassung seiner zwei Bücher *περὶ διαφορᾶς πυρετῶν*²⁾, die in übersichtlicher Gliederung nach den Rubriken der einzelnen Fieberarten ein Bild von dieser Lehre geben. Bisher hat man diese Schrift für Galens eigenes System verwertet³⁾ in der Voraussetzung, daß die von ihm vorgetragenen Lehren wirklich von ihm herrühren. So berechtigt dies Verfahren an sich sein mag, glaube ich doch den Nachweis führen zu können, daß er nichts Wesentliches zur Ausbildung dieser Theorie beigetragen hat trotz seiner Versicherung, daß man aus den Schriften anderer nichts lernen könne, weder über das dreitägige Fieber, noch über eine

¹⁾ Gal. IX 381. 668 f.: τὰ γοῦν Ἀρχιγένους περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως δέκα βιβλία μακρὰ φάσκοντες εἶναι, μόνην ἀναγινώσκειν ἐπιχειροῦσι τὴν ἐπιτομὴν οὐδὲ ταύτην ἅπαντες, ἀλλ' εἰσὶν οἱ καὶ ταύτης ἔτι βραχυτέρον τι ζητοῦσι ...

²⁾ Gal. VII 273 f.

³⁾ Sprengel a. a. O. II³ 167.

andere der unzählig vielen Fieberarten¹⁾, daß sich vielmehr seine Thätigkeit im Wesentlichen darauf beschränkt hat, die Lehren der pneumatischen Schule in Einzelheiten zu modificieren und weiter auszubilden²⁾.

Zunächst bezeugt Galen selbst, daß er in dieser Schrift, abgesehen vom Eintagsfieber, im Wesentlichen mit den Theorien der Pneumatiker übereinstimme (VII 295f.): *ἐπεὶ δὲ τῶν λοιμωδῶν ἐμνημόνευσα πυρετῶν ὑπὸ σηπεδόνοσ ἀπάντων γινομένων, ἄξιον ἐπιστάντα τὸν λόγον ἐν τῷδε διασκέψασθαι περὶ παλαιοῦ δόγματος, ἅπαντα πυρετὸν ἐπὶ τῇ τῶν χυμῶν σήψει φάσκοντος γίνεσθαι. κινδυνεύει γὰρ οὖν δοξάζειν ὧδε καὶ ὁ τῶν ἀπ' Ἀθηναίου χορὸς, ἄνδρες οὐχὶ φαυλότατοι τὰ τ' ἄλλα τῆς τέχνης καὶ οὐχ ἥκιστα πυρετῶν ἐπιστήμης, περὶ ὧν καὶ γὰρ τόγε πλεῖστον αὐτοῖς σύμφημι, πλὴν ἐν τι παρίημι, τοὺς ἐφημέρους ὀνομαζομένους πυρετούς.*

Die Schrift, mit deren Hilfe diese Übereinstimmung für eine Stelle genauer nachgewiesen werden kann, ist der unter dem Namen des Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς ἱατρός überlieferte Tractat *περὶ πυρετῶν*³⁾. Es ist bereits des öfteren ausgesprochen worden⁴⁾, daß diese Schrift mit dem berühmten Aristotelescommentator Alexander von Aphrodisias nicht das mindeste zu thun hat. Dem widerspricht, daß der Verfasser ausdrücklich ἱατρός genannt wird, natürlich zur Unterscheidung von dem gleichnamigen ἐξηγητῆς τοῦ Ἀριστοτέλους, dem widerspricht noch weit nachdrücklicher die ganze geistige Richtung dieses Mannes. Es enthält nämlich jener Tractat so unverkennbare Spuren der pneumatischen Lehre, daß ich kein Bedenken trage, ihn dieser Schule zuzuweisen.

Er unterscheidet drei Bestandteile des Körpers, feste, flüssige, und pneumatische (c. 14 p. 91, 23. Gal. XIX 356, 16. Aret. caus. ac. m. II 3, 40), das Pneuma wird von ihm nach Art der späteren Pneumatiker mit dem ἐμφυτον θερμὸν identificiert (Gal. XIX 357, 1), das Herz gilt ihm als Sitz der eingepflanzten Wärme (82, 20f. Gal. XIX 360, 4), die mit den Einzelwesen zusammen ent-

¹⁾ Gal. IX 647. Vgl. Gal. VII 369.

²⁾ Gal. VII 369.

³⁾ Ich citiere nach Seiten-Zeilen- und Capitelzahl der phys. et med. gr. min. ed. Ideler I 81f.

⁴⁾ Zeller IV 791 A. 2.

steht (85, 26 f.) und sich von hier aus durch das Pneuma und das Blut dem ganzen Körper mitteilt (83, 5 f. Gal. XIX 360). Er kennt die Lehre von der Dyskrasie; die eingepflanzte Wärme beruht nach ihm auf der normalen Mischung der Qualitäten, bei der die Wärme überwiegt (86, 57), während die widernatürliche Wärme auf Dyskrasie beruht. Pneumatisch ist die Zurückführung der beim Fieber entstehenden Dyskrasie auf Wärme und Trockenheit (82, 29 f. Gal. I 522. XIX 398, 14), die Unterscheidung des *φυσικὸν* oder *ζωτικὸν πνεῦμα* (84, 37), die Definition der Krankheit als widernatürlichen Zustandes, durch den die körperlichen Functionen gestört werden (Gal. XIX 384, 15. 386, 7. VIII 14 ff.), die Behauptung, daß das Zustandekommen von Wahrnehmung, Bewegung, Ernährung, Entwicklung und Zeugung durch die eingepflanzte Wärme oder das Pneuma bedingt ist (85, 6 f. Gal. XIX 355, 15. 371, 15), endlich die Lehre von den Ursachen, die in seiner Untersuchung einen breiten Raum einnimmt (c. 27 f. Gal. XIX 392, 5 f.). Will man den Rückschluß von dem Inhalt der Schrift auf die geistige Richtung des Verfassers gelten lassen, so war er Pneumatiker. Über seine Zeit läßt sich soviel ausmachen, daß er nach dem Pneumatiker Aretaios gelebt hat, den er an 3 Stellen citiert (c. 16 p. 92, 18. c. 24 p. 97, 15. c. 30 p. 105, 3) d. h. nach dem 2. Jh. n. Chr.

Diese Schrift Alexanders weist in der Einteilung der Fieberarten eine so große Übereinstimmung mit den von Galen in seiner erwähnten Schrift vorgetragenen Lehren auf, daß der Gedanke an ein nahes verwandtschaftliches Verhältnis der beiderseitigen Berichte unabweislich ist. Beide Schriftsteller kennen drei Einteilungsprincipien. Da das Wesen des Fiebers in der abnormen Steigerung der Wärme besteht, so ist ein Einteilungsprincip mit dem Gradunterschied der Wärme gegeben. Je nachdem sie in höherem oder geringerem Grade auftritt, unterscheiden sie 2 Arten, die *πυρετοὶ μεγάλοι* und *μικροί*. Da ferner das Fieber an einen bestimmten Stoff gebunden ist, so ist ein zweites Einteilungsprincip durch die verschiedenen Formen gegeben, in denen die Materie in unserem Körper auftritt. Mit Zugrundelegung der bekannten pneumatischen Theorie von den dreierlei verschiedenen Stoffarten in unserm Körper¹⁾, den festen

¹⁾ Es verdient darauf hingewiesen zu werden, daß bei beiden in demselben Zusammenhang die Berufung auf Hippokrates wiederkehrt (Alex. c. 17

(στερεά), flüssigen (ύγρὰ) und luftförmigen (ἀερώδης οὐσία), unterschieden sie, je nachdem einer dieser Teile von der Krankheitsveränderung betroffen wird, Eintagsfieber, septische und hektische Fieber. Ein drittes Einteilungsprincip bildet die Art der Bewegung der Wärme: die Arten, die nach diesem Princip zu unterscheiden sind, fehlen bei Galen, Alexander erwähnt sie: es sind die langsamen und schnellen, die intermittierenden und continuierenden Fieber (91, 27f.). Die Übereinstimmung beider Autoren ist sogar zum Teil eine wörtliche, wovon eine Gegenüberstellung jeden Unbefangenen überzeugen wird:

Alex. c. 15 p. 91, 27:

Τριῶν τοίνυν ἐν ἡμῖν ὄντων, στερεῶν, ὑγρῶν καὶ τῆς ἀεράδους οὐσίας, καὶ τῶν μὲν μορίων τοῦ ἡμετέρου σώματος ὄντων τῶν στερεῶν, τῶν δὲ χυμῶν τῶν ὑγρῶν, τοῦ δὲ φυσικοῦ πνεύματος τῆς ἀερώδους οὐσίας, συμβαίνει τὴν παρὰ φύσιν θερμότητα ἄλλοτε μὲν ἐξ ἄλλου τῶν εἰρημένων ἄρχεσθαι, ἐπινέμεσθαι δὲ καὶ συνδιατιθέναι τῷ πεπονθότι τὰ λοιπὰ δύο γένη, εἰ μὴ φθάσειε λυθῆναι πρότερον καὶ διαφορηθῆναι· κἀντεῦθεν τρεῖς ἡμῖν καὶ παρὰ τὴν ὕλην διαφοραὶ τῶν πυρετῶν ἀναφαίνονται. Μία μὲν, καθ' ἣν ἡ ἀερώδης μὲν οὐσία μόνη τεθέρμασται ἱκανῶς, τὰ δὲ ὑγρὰ καὶ τὰ στερεὰ θερμαίνεται μὲν καὶ αὐτὰ, ἐκτεθέρμασται (Wil. ἔτι τεθ. Hds.) δὲ οὐπω· διαφέρει γὰρ οὐ μικρῶ τὸ θερμαίνεσθαι τοῦ τεθερμάσθαι· τὸ μὲν γὰρ γίνεται, δυνάμει τέ ἐστι ξυμπεφυρμένον αἰεὶ, καὶ οὐπω ἐντελεχεία τὸ εἶναι ἔχει, τὸ δὲ γέγονεν ἤδη, καὶ οὐποτε (Wil. οὔτε Hds.) δυνάμει ξυμπέφυρται, καὶ ἐνεργεία ἐστὶν· ἄλλη δὲ, καθ' ἣν τῶν ὑγρῶν μὲν ἡ οὐσία τεθέρμασται, τεθέρμασται δὲ οὐπω οὐθ' ἡ ἀερώδης οὐσία οὔτε τὰ στε-

Galen VII 275 f.

Αἱ δὲ παρὰ τὴν ὕλην, ἐν ἣ τὸ παρὰ φύσιν τοῦτο θερμὸν, οἰκειόταται διαφοραὶ τῆς παρὰ φύσιν θερμοσίας εἰσὶν, ἥτοι τὸ σῶμα τῆς καρδίας αὐτὸ κατειληφείας αὐτῆς ἢ τοὺς περιεχομένους ἐν ταῖς κοιλίαις αὐτῆς χυμούς. λοιπὴ δὲ καὶ τρίτη τις ἐπ' αὐταῖς διαφορά, τῆς ἀερώδους οὐσίας μόνης ἐκτεθερμασμένης ἱκανῶς, τῶν δὲ ὑγρῶν καὶ στερεῶν σωμάτων θερμοιμένων μὲν ἔτι, ἐκτεθερμασμένων δὲ οὐδέπω. διαφέρει γὰρ οὐ σμικρῶ τὸ θερμαίνεσθαι τι τοῦ τεθερμάσθαι

c. 2 p. 277: Ἀρχεται μὲν οὖν ἡ παρὰ φύσιν αὕτη θερμότης, ἥνπερ καὶ πυρετὸν ὀνομάζομεν, ἄλλοτε ἐξ ἄλλου τῶν εἰρημένων, ἐπινέμεται δὲ καὶ συνδιατίθησι τῷ πεπονθότι τὰ λοιπὰ δύο γένη

p. 278, 16: . . . καὶ εἰ μὴ φθάσειε λυθῆναι, συνδιατίθησιν ὡσαύτως κἀκεῖνα τῷ χρόνῳ.

p. 93, 16. Gal. 278), in dessen μόρια ἴσχοντα, ἴσχόμενα und ἐνορμῶντα die pneumatische Dreiteilung wiedergefunden wurde.

ρεά· θερμαίνεται γε μὴν ἔτι καὶ
οὐπω τεθέρμασται· τρίτη δὲ καὶ ἐσ-
χάτη, καθ' ἣν τεθέρμασται μὲν ἤδη
τὰ στερεὰ, τὰ δ' ἄλλα θερμαίνεται
μὲν, οὐ τεθέρμασται δέ.

Dazu kommt bei Alexander endlich noch ein viertes dem Hippokrates¹⁾ entnommenes Einteilungsprincip nach den Symptomen der widernatürlichen Wärme (Alex. 93, 35), nach dem die Fieber in *ἐξέρουθροι*, *ἐξωχροι* und *πελιοί* eingeteilt wurden.

Aus der steten Bewegung der eingepflanzten Wärme erklärt es sich, daß die einzelnen Fieberarten leicht in einander übergehen; am leichtesten teilt sich die widernatürliche Hitze der Säfte dem Pneuma und die der festen Teile den Säften und dem Pneuma mit, während die festen Teile ungleich schwerer in Mitleidenschaft gezogen werden, da die festen Substanzen nicht so leicht der Veränderung unterworfen sind wie die dünnen (Alex. c. 16. c. 19. Gal. 277, 17f.). Es ist deshalb genau zu bestimmen, welche Teile wirklich erhitzt sind, da ein wesentlicher Unterschied zwischen der bestehenden und der beginnenden Hitze besteht. (Alex. 91, 36 ff. Gal. 276). Nach dem Teile, der wirklich erhitzt ist, wird die Fieberart benannt: sind z. B. die luftartigen Teile erhitzt, während die übrigen Teile von der Hitze angegriffen sind, so hat man es mit den Eintagsfiebern zu thun u. s. w. (Gal. 276. Alex. 91, 36 ff.). Vergleicht man diese beiden Parteien, so wird man ohne weiteres zugeben, daß die Darstellung Alexanders gegenüber dem stark gekürzten Bericht des Galen durchaus den Eindruck des Ursprünglichen macht: demnach ist die Möglichkeit der Abhängigkeit des Verfassers von Galen von der Hand zu weisen.

Es folgt bei beiden ein Beispiel zur Veranschaulichung dieses Herganges (Alex. c. 16 p. 92, 14f. Gal. 276). Der Zweck ist bei beiden derselbe, das Beispiel dagegen verschieden.

Diese Stelle verhilft uns zur Bestimmung der Quelle Alexanders. Da er ausdrücklich bezeugt, daß er sein Beispiel dem Aretaios entlehnt hat, so folgt aus dem unlöslichen Zusammenhang desselben mit der vorhergehenden Darlegung, daß sie derselben Quelle entnommen ist. Eine wichtige Bestätigung dafür erhalten wir durch

¹⁾ Vgl. Gal. VII 275. XVII A 870 f.

Cap. 30. Alexander bestreitet hier die Behauptung des Aretaios, daß das eigentümliche Kennzeichen des septischen Fiebers darin bestehe, daß keine offenbare Gelegenheitsursache wie bei den andern beiden Fieberarten vorhergehe. Ich schreibe diese Worte wegen ihrer Wichtigkeit aus: *Παραιτοῦμαι δὲ ἐνταῦθα τὸν Ἀρεταῖον καὶ ἑτέρους, ἰδίαν εἰπόντας διάγνωσιν τῶν ἐπὶ χυμοῖς πυρετῶν καὶ οὐκ ἀχώριστον τὸ μηδὲν τῶν προκαταρκτικῶν αἰτιῶν ἡγήσασθαι τῶν τοιούτων πυρετῶν, ὅτι καὶ οὐδετέρῳ τῶν ἄλλων γενῶν τοῦθ' ὑπάρχει, διὰ τὸ τοὺς μὲν ἐφημέρους ἅπαντας ἐπὶ ταῖς προκαταρκτικαῖς αἰτίαις συνίστασθαι, τοὺς δὲ ἐκτικούς, ὅταν ἄνευ τούτων γένωνται, μηδὲ ἐξ ἀρχῆς εἰσβάλλειν, καίτοι μηδενὸς οἴου τ' ὄντος, οὐ πυρετοῦ μόνον, ἀλλ' οὐδὲ νοσήματος οὔτινοςοῦν, ἄνευ τινὸς τῶν προκαταρχόντων ἄρχεσθαι.* Ganz dieselbe Ansicht, die Aretaios hier vertritt, lesen wir bei Galen (304, 11): *Αἱ διαγνώσεις δὲ τῶν ἐπὶ σήψει χυμῶν πυρετῶν αἰτιαίδε. πρώτη μὲν ἀπασῶν οὐκ ἀχώριστος μὲν, ἴδιος δὲ τὸ μηδὲν τῶν προκαταρκτικῶν αἰτιῶν ἡγήσασθαι τῶν τοιούτων πυρετῶν· οὐδετέρῳ γὰρ τῶν ἄλλων γενῶν τοῦθ' ὑπάρχει διὰ τὸ τοὺς ἐφημέρους ἅπαντας ἐπὶ ταῖς προκαταρκτικαῖς αἰτίαις συνίστασθαι, τοὺς δ' ἐκτικούς, ὅταν ἄνευ τούτων γένωνται, μηδέποτε' ἐξ ἀρχῆς εἰσβάλλειν, ὥσθ' ὅταν ἄνευ προκαταρχούσης αἰτίας ὑπάρξῃται τις πυρέττειν, εἰδέναι τούτου τὴν αἰτίαν τοῦ πάθους ἐν τοῖς χυμοῖς ὑπάρχειν.* Da die Übereinstimmung zwischen Aretaios und Galen eine wörtliche ist, so ergibt sich für uns als eine zweifellose Thatsache, daß für die Partien, in denen Alexander und Galen übereinstimmen, Aretaios als Quelle anzusetzen ist, der thatsächlich eine Schrift *περὶ πυρετῶν* verfaßt hat¹⁾. Ferner schliesse ich daraus, daß Aretaios diese Schrift nicht im ionischen Dialekt verfaßt hat, weil sonst die enge Übereinstimmung mit Galen nicht zu erklären ist.

Wie ist nun aber die Übereinstimmung zwischen ihm und Galen zu erklären? Der nächstliegende Gedanke ist der, daß er den Galen benützt hat. Dem widerspricht aber der oben geführte Nachweis, daß er in seiner Pathologie und Therapie trotz mannigfacher Über-

¹⁾ Aret. p. 185: *ὅκόσα μὲν ὦν ἐν πυρετῶν θεραπείῃ γίγνεται κατὰ τὴν τούτων διαφορὴν καὶ κατὰ τὴν τῶν νοσημάτων ἰδέην καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς ποικιλίην, τούτων τὰ πλείω ἐν τοῖσι ἀμφὶ πυρετῶν λόγοισι λελέξεται κτλ.*

einstimmungen mit Galen nicht diesem, sondern dem Archigenes gefolgt ist. Ferner erinnere ich an den Umstand, auf den ich bereits aufmerksam gemacht habe, daß die Darstellung Alexanders auch da, wo sie sich mit Galen berührt, durchaus den Eindruck des Ursprünglichen macht. Endlich wäre es doch höchst auffallend und der Manier dieser späten Excerptoren durchaus widersprechend, wenn man annehmen wollte, daß Aretaios nur einzelne Sätze dem Galen entnommen und die grössere übrige Masse einer andern Quelle entlehnt habe. Die Sache liegt vielmehr so: Galen und Aretaios schöpfen aus derselben Quelle und diese Quelle ist dieselbe, die Aretaios in seiner Pathologie und Therapie benützt hat, nämlich das umfängliche Werk des Archigenes *περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως*. Er ist also der Arzt, auf den die Worte des Galen zu beziehen sind (295): *περὶ ὧν* (sc. *πυρετῶν*) *καὶ γὰρ τό γε πλεῖστον αὐτοῖς σύμφημι*, mit andern Worten die Quelle, aus der seine Fiebertheorie im Wesentlichen stammt.

Hat die vorhergehende Untersuchung gezeigt, wie Galen den Archigenes auszunützen liebte, so wird es um so weniger auffallen, daß er sich in seiner Schrift *περὶ πεπονθότων τόπων* dem Archigenes anschliesst, da dieser Arzt dasselbe Thema vor ihm ausführlich behandelt hat. Galen rühmt sogar diese Schrift, die aus drei Büchern bestand, als die beste auf diesem Gebiet¹⁾. Gleichwohl hat er uns die Möglichkeit genommen, den Umfang der Benützung des Archigenes aus seinen Citaten nachzuweisen. Er erwähnt ihn in dieser Schrift an 11 Stellen, aber nur, um gegen seine Theorieen zu Felde zu ziehen. Insbesondere ist es seine Lehre von den verschiedenen Arten der Schmerzempfindung, die den Spott des Galen herausfordert. Archigenes hatte die Ansicht vertreten, daß man durch die Arten der Schmerzempfindung den Sitz der Krankheit bestimmen könne²⁾ und in spitzfindiger Weise eine große Zahl von verschiedenen Arten unterschieden. — Ferner hatte er die Theorie der Sympathie in allen ihren Consequenzen verfochten, deren Wesen darin besteht, daß ein Körperteil in seiner Function dadurch beein-

¹⁾ Gal. IX 670: *Καὶ γὰρ δὴ καὶ περὶ πεπονθότων τόπων Ἀρχιγένει γέγραπται βιβλία τρία, πάντων τῶν ἔμπροσθεν εἰς τὴν αὐτὴν πραγματείαν γεγραμμένων ἄριστα.*

²⁾ Gal. VIII 70. 73. 86. 90. 110.

trächtigt wird, daß er, ohne selbst erkrankt zu sein, von einer andern Krankheit in Mitleidenschaft gezogen wird¹⁾. Als Beispiel führte er unter anderm die Trübung der Augen an, die sich bei der Ansammlung von feinteiligen Speiseresten im Magenmunde einstellt und die ihren Grund darin hat, daß Gase der im Magen enthaltenen Flüssigkeiten zum Kopfe emporsteigen²⁾. Endlich gab seine echt pneumatische Theorie von der Verlegung des *ἡγεμονικόν* ins Herz dem Galen reichlich Gelegenheit zur Polemik³⁾. Trotz dieser wiederholten Polemik gegen ihn, die den Zweck hat, die wunden Punkte in seiner örtlichen Pathologie nachzuweisen, hat er es nicht verschmäht, das Gute, was Archigenes bot, aus ihm zu entlehnen. Er behandelt (VIII 414) den hysterischen Erstickungsanfall in wörtlicher Übereinstimmung mit Aetius (XVI 68), dessen unmittelbare Quelle mit Hilfe des Oribasius (V 539) benannt werden kann:

Orib. V 539:

*Περὶ ὑστερικῶν πνιγός· ἐκ τῶν
Φιλουμένου.*

Περὶ τὴν πρώτην συναίσθησιν ἣ καὶ ἡδὴ κατειλημμένης τῇ ὑστερικῇ πνιγῇ, διαδέσμοις τὰ ἄκρα χρὴ καταλαμβάνειν καὶ τρίβειν ἰγνύας ἰσχυρῶς, μετὰ δὲ τῶν διαδέσμων καὶ κνήμας καὶ ὅλα τὰ σκέλη, ὁσφραντά τε τῇ ῥινὶ τὰ δυσώδη προσφέρειν. Καὶ σικύας δὲ κολλᾶν προσήκει βουβῶσι καὶ μηροῖς καὶ ὑπογαστρίῳ· ἐνιέναι δὲ δεῖ καὶ διὰ κλυσιτῆρος ἐν τοῖς μηχανομένοις τὰ τῶν πνευμάτων ἀγωγὰ καὶ τῷ δακτυλίῳ καὶ τῷ κόλπῳ τῷ γυναικείῳ προστιθέναι, οἷόν ἐστι τόδε· πήγανον λειοτριβεῖται σὺν μέλιτι καὶ προσλαμβάνει βραχὺ κυμίνου καὶ νίτρου καὶ χρίεται ἀψιλὲς κατὰ ἐκατέρων τῶν τόπων. Καὶ εἰς αὐτὴν δὲ τὴν ὑστέραν τὰ

Aetius:

Διαδεσμεῖν τοίνυν χρὴ τὰ ἄκρα ἐν τοῖς παροξυσμοῖς καὶ τρίβειν τοὺς πόδας ἰσχυρῶς μετὰ τῶν διαδέσμων καὶ τὰς κνήμας καὶ ὅλα τὰ σκέλη· καὶ ὁσφραντὰ ταῖς ῥισὶ προσάγειν, κασιτόριον μετ' ὅξους λεῖον καὶ διαχρίειν αὐτῷ τοὺς μυκτῆρας ἢ χαλβάνην ὁμοίως καὶ ὅξος δριμύτατον, ἐν ᾧ ἀφήψηται γλήχων μάλιστα ἢ καλαμίνθῃ ἢ θύμος ἢ ὀρίγανον ἢ κόνυζα λεπτὴ καὶ τὰ οὕτω δριμέα . . . δεῖ δὲ . . . πταρμούς κινεῖν . . . τῇ δὲ μήτρᾳ εὐώδη μετὰ τοῦ χαλᾶν καὶ θερμαίνειν καὶ πνεύματα¹⁾ προσκαλεῖσθαι δυνάμενα προσάγειν, οἷόν ἐστι τὸ ἐννεαφάρμακον λεγόμενον καὶ τὰ παραπλήσια ἐπὶ σκληρίας μήτρας γραφησόμενα Τοιαῦτα δὲ προσ-

¹⁾ πνεῦμα W.

¹⁾ Gal. VIII 20. 136. 138.

²⁾ Gal. VIII 20.

³⁾ Gal. VIII 19. In seiner Behauptung, daß das Herz der Sitz des *ἡγεμονικόν* sei, stimmt er mit Athenaios (Gal. X 929), der diese Theorie der Stoa entlehnt hat. Vgl. Stein a. a. O. 135. vgl. 149. Siebeck, Geschichte der Psychologie T. I, 2. Abteilung S. 267.

εὐώδη τῶν μύρων ἐγγεόμενα κατα-
σπᾶν αὐτὴν πέφυκε. Σὺν τούτῳ δὲ
καὶ ἐμβοάτω τις αὐταῖς τραχυτέρας
τῇ φωνῇ· ὕστερον δὲ καὶ πταρμικὰ
παραλαμβάνεσθω. Ἀνενεχθείσης δὲ
ἀπὸ τοῦ παροξυσμοῦ φλεβοτομητέον,
εἰ μὴ τι κωλύει· βέλτιον δὲ ἀπὸ
σφυροῦ ποιεῖσθαι τὴν ἀφαίρεσιν.
Διαστήσαντες δὲ ὅσον ἑπτὰ ἡμέρας
τῆς διὰ κολοκυνθίδος ἱερᾶς δώσομεν,
εἴτα χρησόμεθα τῇ τοῦ καστορίου
δόσει· πολλάκις γὰρ τοῦτο μόνον
ἀπήλλαξε τῆς διαθέσεως τὴν καμου-
σαν· κιρνάσθω δὲ τὸ μελίκρατον διὰ
ἀρτεμισίας ἀφειψήματος. Καὶ πεσσοὶ
δὲ μαλακτικοὶ καὶ τὰ ἐγκαθίσματα
δεόντως ἂν παραλαμβάνοιτο.

ἡκει λαβοῦσαν τὴν μαῖαν τοῖς δακτύ-
λοις προσάγειν τῷ σιόματι τῆς μή-
τρας καὶ παρατρίβειν ἡρέμα καὶ ἐπὶ
πολύ ... καὶ τῇ ἔδρᾳ δὲ προσθεῖναι
πήγανον, κύμινον, νίτρον μετὰ μέλι-
τος καὶ τὰ προῤῥηθέντα μύρα μετὰ
βουτύρου ἐνιέναι καὶ σικύαν δὲ κολλᾶν
προσῆκει βουβῶσί τε καὶ μηροῖς,
κᾶπειτα περὶ τὸν ὀμφαλὸν μέσον
καὶ ἐκατέρωθεν μετὰ πολλῆς φλογὸς
ἄνευ κατασχασμοῦ. σὺν τούτοις δὲ
πᾶσιν ἐμβοάτω τις αὐταῖς τραχυτέ-
ραις¹⁾ φωναῖς Ἀνενεχθεῖσα δὲ
ἀπὸ τοῦ παροξυσμοῦ ... ἐπὶ τὴν τοῦ
καστορίου πόσιν· συνεχῶς γὰρ παρα-
λαμβανομένη πολλάκις τῆς διαθέσεως
ἀπήλλαξε· διδόσθω δὲ τὸ καστορίον
ὅτε μὲν μετὰ ἀφειψήματος ἀρτεμισίας,
ὅτε δὲ μετὰ μελικράτου ὅσον < α'
... τῆς δὲ ἐπὶ τῶν χρονιζόντων ἀνα-
σκευῆς κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπὸ φλεβο-
τομίας ἀρχόμεθα ... ἔπειτα καὶ κά-
θαρσιν παραλαμβάνομεν· πρακτικω-
τάτη²⁾ δέ ἐστιν ἐπὶ τούτων ἢ διὰ τῆς
ἱερᾶς τῆς κολοκυνθίδος κάθαρσις ...
προφυλακῆς χάριν ἐκ διαλειμμάτων
τινῶν καὶ μάλιστα περὶ τὸν ὑποπτον
καιρὸν ἐγκαθίσμασι χρῆσθαι τοῖς
προειρημένοις ... ἐκ δὲ τούτων αὐ-
τῶν καὶ τῶν θερμαίνειν καὶ μαλάσ-
σειν δυναμένων πεσσοὺς προστι-
θέναι ...

¹⁾ παχυτέραις W. Am Rande von
anderer Hand τραχυτέραις. ²⁾ πρακτι-
κώτατον W.

Diese Übereinstimmung gestattet keinen Zweifel, daß Philumenos die directe Vorlage des Aetius für die Therapie dieses Leidens und damit für das ganze Capitel ist. Die Berührung zwischen Galen und Philumenos hingegen ist derart, daß beide Berichte einander gegen-
über als selbständig erscheinen; so leicht und natürlich sie sich in
einander fügen, so unmöglich ist es, die eine Darstellung aus der
andern abzuleiten, weil bald der eine, bald der andere eine größere

Reichhaltigkeit aufweist. Nach Philumenos gehen die hysterischen Erstickungsanfälle vom Uterus aus und ziehen die darüber gelegenen Organe in Mitleidenschaft, durch die Arterien das Herz, durch die Häute und Nerven des Rückgrats das Gehirn und durch die Venen die Leber¹⁾; der ganze Uterus scheint in die Höhe zu steigen. Als Symptome nennt er Abgeschlagenheit, Trägheit bei der Verrichtung der Geschäfte, Abspannung in den Gliedern, bleiche Gesichtsfarbe, glänzende Augen. Plötzlich tritt ein heftiger Erstickungsanfall ein, Gefühls- und Bewegungslosigkeit, der Puls ist klein und sehr schwach, bisweilen setzt er ganz aus, die Respiration ist manchmal gar nicht bemerkbar. Von diesen Symptomen fehlen die ersteren bei Galen, die letzteren werden dagegen völlig übereinstimmend von ihm geschildert:

Aetius XVI 68:

Ἡ ὑστερική πνίξ κάτωθεν μὲν ἀπὸ τῆς ὑστέρας λαμβάνει τὴν ἀρχὴν, εἰς συμπάθειαν δὲ ἄγει τὰ ὑπερκείμενα μέρη καὶ μάλιστα τὰ κυριώτατα, διὰ μὲν τῶν ἀρτηριῶν τὴν καρδίαν, διὰ δὲ τῶν τοῦ νωτιαίου μηνίγγων καὶ τῶν εἰς αὐτὰς¹⁾ ἐμφυομένων νεύρων τὸν ἐγκέφαλον, διὰ δὲ τῶν φλεβῶν τὸ ἥπαρ. ἔοικε δὲ ἀναδρομὴ πάσης²⁾ τῆς ὑστέρας ἐπὶ τὰ ἄνω μέρη γίνεσθαι. παρέπεται δὲ ταῖς πασχούσαις, ἐγγίζοντος μὲν τοῦ παροξυσμοῦ, διανοίας νωθρότης στυγνὴ οἷον ὑπ' ἐκπλήξεως τεθαμβημένη, ὄκνος πρὸς τὰς πράξεις, ἀτονία σκελῶν, ὥχρότης προσώπου, βλέμμα ὑπολίπαρον. εἴτα ἑξαπίνης προσπесοῦσης τῆς πνιγὸς³⁾ ἀναίσθητοι καὶ ἀκίνητοι γίνονται. μικρὸν δὲ καὶ ἀμυδροτάτον τὸν σφυγμὸν ἴσχουσιν· ἐνίστε δὲ

¹⁾ αὐτήν W. P. αὐτάς Sor. ed. Dietz p. 247. ²⁾ πάσης ὑστέρας P. vgl. Sor. p. 247. ³⁾ προσπесοῦσα ἢ πνίξ P.

Galen VIII 414. Vgl. XVI 177.

Ἐγὼ δὲ θεασάμενος πολλὰς γυναῖκας ὑστερικὰς . . . τινὰς μὲν ἀναισθητοὺς τε ἅμα καὶ ἀκίνητους κειμένας, ἀμυδροτάτον τε καὶ μικρότατον ἔχουσας σφυγμὸν ἢ καὶ παντελῶς ἀσφύκτους φαινομένας, ἐνίας δ' αἰσθανομένας τε καὶ κινουμένας καὶ μηδὲν βεβλαμμένας τὸν λογισμὸν¹⁾ ὀλιγοδρανούσας²⁾ τε καὶ μόγεις ἀναπνεούσας, ἑτέρας δὲ συνελκομένας τὰ κῶλα, διαφορὰς ὑπολαμβάνω τῶν ὑστερικῶν παθημάτων εἶναι πλείους,

¹⁾ τοῦ λογισμοῦ Hds. ²⁾ Wil. λιποδρανούσας Hds.

¹⁾ Diese Theorie ist echt archigenisch: Gal. VIII 20.

καὶ παντελῶς ἄσφυκτοι γίνονται.
ἐνίοις δὲ οὐδὲ ἡ ἀναπνοὴ αἰσθητικὴ
σώζεται δηλονότι παρὰ τῆς ποιούσης
αἰτίας τὴν διαφορὰν καὶ τὸ μέγεθος.

ἦτοι κατὰ τὸ μέγεθος τῆς ποιούσης
αἰτίας ἢ κατ' εἶδη τινὰ διαφερούσας
ἀλλήλων.

Von nun an laufen beide Berichte längere Zeit hindurch vollständig parallel; so wissen beide von einigen Ärzten zu berichten, die, um zu prüfen, ob die Respiration völlig aufgehört hat, entweder Charpiefasern der Erkrankten unter die Nase hielten, oder auf die Magengegend ein kleines Gefäß mit Wasser setzten und aus dessen Bewegung ihre Schlüsse zogen. Beide erklären den Scheintod der an diesem Leiden Erkrankten damit, daß, trotzdem die Respiration beim Menschen durch Mund und Nase aufgehört habe, doch die Transpiration im Körper durch die Arterien stattfinden könne und verweisen dabei als Analogie auf die Schlangen, bei denen während der Winterruhe die Respiration aufhöre, woraus sich ihr totenähnlicher Zustand erkläre:

Aetius:

Καὶ τινες βουλόμενοι γνῶναι, εἰ
σώζεται τις αὐταῖς καὶ ¹⁾ βραχεῖα
ἀναπνοή, κατὰ τῆς ²⁾ ῥινὸς ἔριον
ἐξασμένον ἀποκρεμῶσιν, εἴτα ἐκ τῆς
γινομένης κινήσεως τεκμαίρονται
σώζεσθαι τὴν διὰ τῆς ῥινὸς εἰσπνοὴν
καὶ ἐκπνοήν. τινὲς δὲ φιάλην ὕδατος
μεστήν κατὰ τοῦ στόματος ³⁾ τῆς
γαστρὸς ἐτίθεσαν, θεωροῦντες εἰ κί-
νησίν τινα ἔξει τὸ ὕδωρ. ἀγνοοῦσι
δὲ οὗτοι, ὡς ἡ μὲν διὰ τοῦ στόματος
καὶ τῶν ῥινῶν ἀναπνοὴ ἐνίοτε οὐ
γίνεται, ἡ δὲ διὰ τῶν ἐν ὅλῳ τῷ
σώματι ἀρτηριῶν διαπνοὴ γίνεται,
καθάπερ ἐπὶ τῶν ἰοβόλων φωλευόν-
των ζώων ὁρῶμεν γινόμενον· τὰ γὰρ
ἰοβόλα ζῶα, τὸ ⁴⁾ τῶν ὀφειῶν λέγω
γένος, δι' ὅλου τοῦ χειμῶνος νεκροῖς

Gal. VIII 415:

Ἡρακλείδου δ' αὖθις ὕστερον γε-
γονότες ἐνιοι, βουλόμενοι διασώζεσθαι
τι τῆς ἀναπνοῆς, εἰ καὶ μὴ φαίνοιτο,
κτηδόνως ἐρίου διεξαμμένου καταρ-
τῶν φασὶ χρῆναι πρὸ τῆς ῥινὸς, εἰς
διάγνωσιν ἀκριβῆ τοῦ φέρεσθαι τι
πνεῦμα διὰ τῆς ἀναπνοῆς εἶσω τε
καὶ αὖθις ἔξω· τινὲς δὲ κατὰ τὸ
στόμα τῆς γαστρὸς ἐπιτιθέναι κελεύου-
σιν λεκάνιον ὕδατος μεστὸν, ἀκίνη-
τον γὰρ ἀκριβῶς φιλαχθήσεσθαι τὸ
ὑγρὸν, εἰ μηδὲν ὅλως σώζοιτο τῆς
ἀναπνοῆς. εἰ μὲν οὖν ἀπέθνησκον
αἱ οὕτως ἔχουσιν πᾶσαι γυναῖκες,
ἀπλοῦν ἂν εἴη τὸ ζήτημα· σωζομένων
δὲ ἐνίων, διπλοῦν γίνεται, τὴν τε
διάθεσιν ἡμῶν ζητούντων, ὅφ' ἥς
ἀπώλλυται τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἔργον,
εἴτε τε μᾶλλον ὅπως εἴτε ζῶσιν αἱ
μηδ' ὅλως ἀναπνεύουσαι· πεπίστευται
γὰρ ἀχώριστον εἶναι τοῦ ἀναπνεῖν
τὸ ζῆν τοῦ τε ζῆν τὸ ἀναπνεῖν, ὥστε
καὶ τὸν ζῶντα πάντως ἀναπνεῖν καὶ
τὸν ἀναπνέοντα πάντως ζῆν. ἢ

¹⁾ καὶ W. Sor. καὶ P. ²⁾ κατὰ
τὴν τῆς P. ³⁾ In W. fehlen die Worte
von τῆς — στόματος. Ich habe sie er-
gänzt nach P. und Sor. 248. ⁴⁾ τὸ
fehlt in P.

ὅμοια κατὰ τοὺς ἑαυτῶν φωλεοὺς ἔρριπται διὰ τῶν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἀρτηριῶν διαπνεόμενα. ἐγχωρεῖ τοίνυν καὶ ἐπὶ τῆς ὑστερικῆς πνιγὸς, ἐπειδὴ κατέψυκται τὸ πᾶν σῶμα, τὴν μὲν διὰ τοῦ στόματος ἀναπνοὴν μηδόλως γίνεσθαι, τὴν δὲ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι διὰ τῶν ἀρτηριῶν γίνεσθαι· δυνατόν δὲ καὶ γινομένην αὐτὴν διὰ στόματος καὶ ρινῶν ἐλαχίστην οὖσαν λανθάνειν τὴν αἴσθησιν.

τοῦτο χαλεπώτερον; οὐκ ἔστι δ' ὅντως χαλεπώτερον, ἀλλὰ θατέρου φωραθῆναι ῥᾶον, εἴγε καὶ τὰ φωλεύοντα ζῶα νεκροῖς ὅμοια κατὰ τοὺς φωλεοὺς εἰργμένα τῆς ἀναπνοῆς οὐδὲν ἀποσώζοντα φαίνεται ἐγχωρεῖ τοίνυν ἐπὶ τῆς ὑστερικῆς ἀπνοίας, ἐπειδὴ κατέψυκται τὸ πᾶν σῶμα, φαίνεται γὰρ ἐναργῶς τοῦτο, τὴν μὲν διὰ τοῦ στόματος ἀναπνοὴν μηδόλως γίνεσθαι, τὴν δὲ διὰ τῶν ἀρτηριῶν γίνεσθαι· δυνατόν δὲ καὶ γινομένην αὐτὴν ἐλαχίστην λανθάνειν τὴν αἴσθησιν.

Die weiteren Symptome fehlen wieder bei Galen. Philumenos nennt als solche Schlafsucht, Stimmlosigkeit, Gefühls- und Bewegungslosigkeit, während im Fall, daß das Leiden nachläßt, der Körper seinen *τόνος* erhält, die Wangen sich röten, die Kinnbacken nicht mehr krampfhaft auf einander geprefst sind, die Augen sich öffnen, aus den Genitalien eine Feuchtigkeit austritt und Poltern im Bauch entsteht. Besonders entsteht diese Krankheit im Winter und Herbst, sie findet sich vorzugsweise bei jungen, geilen und unfruchtbaren Frauen. Zu den Veranlassungen der Krankheit gehören Erkältungen der Gebärmutter, Unterdrückung einer Blutung aus dem Uterus, bei manchen hat das Leiden auch Fehlgeburten zur Folge. Diese Krankheit beruht nach Philumenos auf einer Erkältung des Pneuma, er bekämpft die Ansicht des Soran, daß sie durch eine Entzündung veranlaßt werde. Er nahm an, daß ein reichliches, dickes, klebriges Sperma sich im Uterus ansammelt, erkältet wird und die Erkältung dem Herzen und Gehirn mitteilt.

Als Beweis dafür, daß die Ursache eine so geringfügige ist, wird von beiden wieder übereinstimmend ein Beispiel mit einem Weibe angeführt, das nach Aussonderung eines dicken, reichlichen, klebrigen Sperma von ihrem Leiden genas:

Aetius:

Οἶδα γὰρ αὐτός ποτε θεασάμενος γύναιον περιπεσὸν τῷ τοιούτῳ πάθει· καὶ τῆς μαίας τὰ χαλαστικά καὶ εὐώδη βοηθήματα προσαγούσης καὶ παρατριβούσης τὸ αἰδοῖον ἔσω-

Galen 420:

Ἐν ταύταις μού ποτε ταῖς ἐννοίαις ὄντος ἐφάνη τοιόνδε συμβὰν ἐκ πολλοῦ χρόνου χρηρευούσῃ γυναικί· κατεχόντων γὰρ αὐτὴν καὶ ἄλλων μέντινων ὀχληρῶν καὶ νευρικῶν διατά-

τάτω τοῖς δακτύλοις, ὑπό τε τῆς ἐκ τῶν βοηθημάτων θερμοσίας καὶ τῆς τῶν δακτύλων ψαύσεως ἐγένοντο συνολκαὶ μετὰ πόνου τε ἄμα καὶ ἡδονῆς¹⁾. ἐφ' αἷς²⁾ ἐκκριθέντος παχέος³⁾ τε καὶ πολλοῦ καὶ γλίσχρου σπέρματος, ἀπηλλάγη τῶν κατεχόντων αὐτὴν ὀχληρῶν ἢ γυνή.

¹⁾ ὀδύνης W.

²⁾ ἐφ' οἷς W.

³⁾ ταχέος W.

σεων, εἰπούσης δὲ τῆς μαίας ἀνεσπασθαι τὴν μήτραν, ἔδοξε χρήσασθαι βοηθήμασιν, οἷς εἰώθασιν εἰς τὰ τοιαῦτα χρῆσθαι· χρωμένης δ' αὐτῆς, ὑπό τε τῆς αὐτῶν θερμοσίας καὶ τῆς κατὰ τὴν θεραπείαν ψαύσεως τῶν γυναικείων τόπων, ἐγένοντο συνολκαὶ μετὰ πόνου τε ἄμα καὶ ἡδονῆς ὁμοιαταῖς κατὰ τὰς συνουσίας, ἐφ' αἷς ἐκκριθέντος παχέος τε καὶ πολλοῦ σπέρματος, ἀπηλλάγη τῶν κατεχόντων αὐτὴν ὀχληρῶν ἢ γυνή.

Es ist nicht wunderbar, fährt Philumenos fort, daß geringfügige Ursachen so große Wirkungen haben, da doch das Gift der Schlangen, trotzdem es nur durch eine schmale Öffnung eingespritzt wird, die schwersten Erkrankungen im Gefolge hat. Die unheilvolle Wirkung verderbter Säfte zeigt sich bei tollen Hunden; schon die Berührung mit ihrem Speichel genügt, um die Krankheit zu übertragen:

Aetius:

Καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν ἐκ τοῦ οὕτως ἐλαχίστου τοιαῦτα γίνεσθαι συμπτώματα, ὅπου γε καὶ τὰ δηλητήρια σμικρότατα διδόμενα καὶ τῶν ἐρπετῶν ὁ ἰὸς μείζονα τούτων παθήματα προσάγει βραχυτάτου ἰοῦ διὰ τὴν στενότητα τῆς ὀπῆς ἐνιεμένου. Οὐδὲν οὖν ἄτοπον εἰ καὶ σπέρμα κακόχυμον ἢ καταμήριον ὁμοίως ἔχον ἐπισχεθέντα καὶ διασαπέντα συμπτώματα φέρει¹⁾ χαλεπὰ· τεκμήριον δέ σοι γινέσθω τὸ ἐπὶ τῶν λυιτώντων κυνῶν γινόμενον. Τοσαύτη γὰρ ἐν αὐτοῖς γίνεται διαφθορὰ τῶν χυμῶν, ὥστε τὸ σίελον αὐτῶν μόνον ἀνθρωπείῳ σώματι προσπεσὸν ἀπεργάζεσθαι λύτταν. Παρὰ μὲν οὖν τὴν ποσότητά τε καὶ²⁾ ποιότητα τοῦ ἀθροισθέντος αὐταῖς σπέρματος καὶ καταλλοτε ἄλλου³⁾ συμπτώματος

¹⁾ φέρειν W. ²⁾ καὶ ohne τε W.

³⁾ ἄλλοτε fehlt in W.

Gal. 421:

Ὅσοι δ' οἴονται μεγάλων συμπτωμάτων ἐν ὅλῳ τῷ σώματι γιγνομένων ἀπίθανον εἶναι χυμὸν ὀλίγον ἐν ἐνὶ μορίῳ περιεχόμενον αἰτιᾶσθαι, δοκοῦσί μοι λίαν ἀμνήμονες εἶναι τῶν ὁσημέραι γινομένων· ἐπὶ γοῦν τοῖς τῶν φαλαγγίων δῆγμασιν ὅλον ὁρᾶται πάσχον τὸ σῶμα, μικροῦ τινος ἰοῦ κατὰ βραχυτάτην ὀπὴν ἐνιεμένου. . . . 423: οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ σπέρμα κακόχυμον ἢ καταμήριον ὁμοίως ἔχον ἐπισχεθέντα καὶ διασαπέντα συμπτώματα φέρει χαλεπὰ τοῖς παθεῖν ἐπιτηδείως ἔχουσι σώμασιν. μαθεῖν γὰρ ἔστι καὶ ἐπὶ τῶν κυνῶν, ὅσην ἔχει δύναμιν ἢ πρὸς τὸ παθεῖν ὅτιοῦν ἐπιτηδειότης· οὐδενὸς γοῦν τῶν ἄλλων ζώων ἀλίσκομένου λύττη, μόνον ἀλίσκεται τοῦτο, καὶ τοσαύτη γε κατὰ αὐτὸ γίνεται διαφθορὰ τῶν χυμῶν, ὥστε τὸ σίελον αὐτοῦ μόνον ἀνθρωπίνῳ σώματι προσπεσὸν ἐργάζεται λύτταν. . . . 432: παρὰ δὲ τὴν

εἶδος αὐταῖς γίνεται· ψύχειν μὲν γὰρ ὅλον τὸ σῶμα δυναμένου τοῦ λυποῦντος αἰτίου, καταψύχονται σφοδρῶς, ὥς μήτε ἀναπνεῖν αἰσθητῶς μήτε σφύζειν τὰς ἀριτηρίας· παχέος δὲ ὄντος ἢ δριμέος, σπασμοὶ γίνονται· δυσθυμία δὲ παρακολουθεῖ, ὅταν μελαγχολικώτερον ἢ· λειποψυχία δὲ ταῖς σφοδρότησι τῶν διατάσεων¹⁾ ἔπονται καὶ ταῖς καταψύξεσι καὶ ταῖς τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς κακώσεσι.

¹⁾ διαστάσεως W.

ποσότητά τε καὶ ποιότητα τοῦ τε καταμηνίου καὶ τοῦ σπέρματος ἄλλοτ' ἄλλο συμπτώματος εἶδος αὐταῖς γίνεται. ψύχειν μὲν γὰρ ὅλον τὸ σῶμα δυναμένου τοῦ λυποῦντος αἰτίου, καταψύχονται σφοδρῶς, ὥς μήτ' ἀναπνεῖν αἰσθητῶς μήτε σφύζειν· παχέος δ' ὄντος ἢ δριμέος, οἱ σπασμοὶ γίνονται· δυσθυμία δέ, ὅταν ἢ μελαγχολικώτερον· ὥσπερ γε πάλιν λειποψυχία τε τῇ σφοδρότητι τῶν τάσεων ἔπονται καὶ ταῖς καταψύξεσι καὶ ταῖς τοῦ στομάχου κακώσεσιν.

Die Durchmusterung des Einzelnen bei Aetius hat also den oben ausgesprochenen Eindruck bestätigt, daß sein Bericht unmöglich aus Galen geschöpft sein kann. Hinsichtlich der Quelle hat schon Valentin Rose in seiner Ausgabe des Soran¹⁾ die Vermutung ausgesprochen, daß sein Bericht auf Archigenes beruhe. Es trifft sich glücklich, daß das aus Archigenes entlehnte Capitel des Aretaios über die *ὑστερικὴ πνίξις*²⁾ sich mit ihm deckt, sowohl in den mit Galen übereinstimmenden Partien als auch in denjenigen Sätzen, die nur von ihm erhalten sind und damit der Vermutung Roses den urkundlichen Beweis in die Hand liefert:

Aet. XVI 68.

Aret. caus. ac. m. II 11 p. 60:

Vgl. S. 94.

Ἐν τῇσι λαγόσι τῶν γυναικῶν μέσησιν ἐγκέεται ἢ μήτρη, σπλάγχνον γυναικῆϊον ἀγχιστα ζωῶδες. κινέεται γὰρ ἐξ ἐωυτῆς ἐνθα καὶ ἐνθα ἐπὶ τὰς λαγόνas· ἀτὰρ καὶ ἐς τὰ ἄνω, κατ' ἕξιν μὲν ὑπὸ τὸν χόνδρον τοῦ θώρηκος· ἐς τὰ πλάγια δὲ [ἐπὶ δεξιὰ ἢ ἐς ἀριστερά]¹⁾ ἢ ἐς ἥπαρ ἢ σπλῆνα²⁾. γίνεται δὲ καὶ προπετεστέρα ἐς τὰ κάτω, καὶ ξυλλήβδην εἰπωμεν, πάντῃ ἐστὶ πλανώδης ... καὶ τὸ

¹⁾ Wil. ²⁾ Wig. σπλάγχνα Hds.

Gal. VIII 425:

Διὸ καὶ τινες οἶον ζῶόν τι παιδοποιῶας ἐπιθυμητικὸν εἶναι τὴν μήτραν ὑποθέμενοι, στερισκόμενον ὧν ὀρέγεται, παντὶ τῷ σώματι λυμαίνεσθαί φασι. γράφει γοῦν ὁ Πλάτων οὕτως· <Tim. p. 365> „Αἱ δὲ ἐν ταῖς γυναιξὶν μήτραί τε καὶ ὑστέραι λεγόμεναι δι' αὐτὰ ταῦτα, ζῶον ἐπιθυμητικὸν ὄν τῆς παιδοποιῶας, ὅταν ἄκαρπον παρὰ τὴν ὥραν χρόνον πολὺν γίγνηται, χαλεπῶς ἀγανακτοῦν φέρει καὶ πλανώμενον πάντῃ κατὰ τὸ σῶμα, τὰς τοῦ πνεύματος διεξόδους ἀποφράττον, ἀναπνεῖν οὐκ

¹⁾ Sor. 320 adn.

²⁾ Aret. caus. ac. m. II 11, 60.

ξύμπαν ἐν τῇ ἀνθρώπῳ¹⁾ ἐστὶν ἡ ὑστέρα, ὁκοῖόν τι ζῶον ἐν ζῳῳ.

ἦδε οὖν ἦν ἐξαπίνης ἀνώϊστος γέννηται καὶ ἐπιπολὺ ἄνω μείνη, καὶ ἐκβιάσθαι τὰ σπλάγχνα, ἀπεπνίχθη κοτὲ ἢ ἄνθρωπος τρόπον τὸν ἐπιληπτικὸν ἀνευθεν σπασμῶν· ἐπιέζετο γὰρ ὡκέως στενοχωρίῃ ἥπαρ, διάφραγμα, πνεύμων, καρδίη. τοῦνεκεν ἀπνοίη ξυνεῖναι δοκέει καὶ ἀφωνίῃ²⁾. ἀτὰρ καὶ αἱ καρωτίδες ξυμπαθίῃ τῆς καρδίας πιέζονται. διὰ τόδε καρηβαρία τε καὶ ἀναισθησία ξύνεστι καὶ κάρος³⁾ ἔτι δὲ τρόμοι αὐτόματοι καὶ οὐκ αὐτόματοι . . . ἀλλ' ἐξ ὑποθέσιος ἀμβλωθριδίου ψύξεις καρτεραί τῆς ὑστέρας, αἰμορροαγίης ἀθρόης ἐπίσχεσις καὶ ὁκόσα τοιάδε.

ἦν οὖν ἄρξεται πάσχειν, κινευσμένης ἄνω τῆς ὑστέρας, ὅκνος ἔργων πρήξιος, ἔκλυσις, ἀτονίη, γουνάτων ἀκρασίη, σκοτόδιος, καὶ τὰ γυῖα λύνονται, κεφαλῆς πόνος, καρηβαρία . . . σφυγμοὶ διαλείποντες, ἄτακτοι, ἐκλείποντες· πηλὴ καρτερὴ, ἀφωνίη, ἀναισθησίη, ἢ ἀναπνοὴ ἄσημος, ἀσαφής, ὥκιστος καὶ ἄπιστος ὁ θάνατος. οὐδὲν γὰρ ἴσχουσι νεκρῶδες, ἐς χροίην ζωώδες, ἐρυθρότεραι μᾶλλον μέχρι πολλοῦ τοῦ θανάτου· ὀφθαλμοὶ μικρόν τι ἐξίσχοντες, λαμπροὶ, οὐ κάρτα μὲν ἀτενέες, ἀτὰρ οὐδὲ κάρτα κεκαμμένοι.

Ἦν δὲ μετακινέηται ποτε ἐς ἔδρην ἡ ὑστέρα, πρὶν ἐς τέλος ἵεναι τὸ πάθος, διαδιδρῆσκουσι τὴν πνίγα· εὔτε κοιλίη ὑποβορβορύζει, ὑγρότης τῶν γυναικῆϊων τόπων, ἀναπνοὴ δασυτέρη καὶ σαφεστέρα, ὥκιστη ἐκ τοῦ πάθους ἢ ἔγερσις διὰ

ξῶν, εἰς ἀπορίας τὰς ἐσχάτας ἐμβάλλει καὶ νόσους παντοδαπὰς ἄλλας παρέχει.“ Ταῦτα τοῦ Πλάτωνος εἰπόντος, ἔνιοι προσέθεσαν, ὡς ἐπειδὴν αἱ μῆτραι πλανώμεναι κατὰ τὸ σῶμα τῷ διαφράγματι προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσι τὴν ἀναπνοήν· ἔνιοι δὲ πλανᾶσθαι μὲν αὐτὴν ὥσπερ ζῶον οὐ φασιν . . . Vgl. XVI 179. Soran ed. Rose p. 177, 4ff. Gal. XIX def. 300 p. 428.

Aet. a. a. O.:

Καὶ ψύξεις δὲ ἐν καθάρσει καταμηνίων τὸ νόσημα ἀπειργάσατο· ἐνίαις δὲ καὶ ἐκτρωσμός¹⁾ δυσχερὴς τὸ πάθος ἐπήνεγκε. Καὶ εἰ αἰμορροαγίαν ἀπὸ ὑστέρας ἀποτόμως στεῖλαι τις βουληθῇ, τὸ νόσημα εἰργάσατο. παρέπεται δὲ ταῖς πασχούσαις, ἐγγίζοντος μὲν τοῦ παροξυσμοῦ, διανοίας νωθρότης στυγνὴ, οἷον ὑπ' ἐκπλήξεως τεθαμβημένη, ὅκνος πρὸς τὰς πράξεις, ἀτονία σκελῶν, ὥχρότης προσώπου, βλέμμα ὑπολίπαρον. εἴτα ἐξαπίνης προσπεσούσης τῆς πνιγὸς, ἀναισθητοὶ καὶ ἀκίνητοὶ γίνονται, μικρὸν δὲ καὶ ἀμυδρότατον τὸν σφυγμὸν ἴσχουσιν· ἐνίοτε δὲ καὶ παντελῶς ἄσφυκτοὶ γίνονται. ἐνίαις δὲ οὐδὲ ἢ ἀναπνοὴ αἰσθητικὴ σώζεται καταφέρονται τοίνυν²⁾ βαθέως αἱ τοιαῦται μετὰ ἀφωνίας καὶ ἀναισθησίας καὶ ἀκινήσιας· εἴτα διαλυομένων τῶν αἰτιῶν, ἄρχεται τονοῦσθαι τὸ σῶμα καὶ ἀνερευθεῖν³⁾ τὰ μῆλα· διανοίγονται δὲ καὶ αἱ γνάθοι, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ μετὰ πλείστου βάρους ἐπαίρονται.

fehlt
bei Galen.

Gal. VIII 414.

fehlt
bei Galen.

1) Wil. ἄνω Hds. 2) Wig. ἀτονίη Hds. 3) Erm. καὶ νῶ κάρω Hds.

1) Wil. Hds.: ἐκτρωσμοὺς δυσχερεῖς.

2) τοίνυν καὶ τοιαῦται βαθέως P.

3) Wil. ἐνερευθεῖν P. cod. Paris. 2193. ἐρευθεῖν W. Paris. 2191.

τόδε νεήνισι τὸ πάθος γίνεται, γεραιτέρησι δὲ ἥκιστα. ἥσι γὰρ ἡλικίη τε καὶ βιοτή καὶ γνώμη πλυνωδεστέρα, τῇσι καὶ ὑστέρα ἐστὶ δρεμβώδης· ἀπηλικωτέρησι¹⁾ δὲ εὐσταθέα καὶ ἡλικίη καὶ βίος καὶ γνώμη καὶ ὑστέρα.

Vgl. Soran ed. V. Rose II 4 p. 320 ff. Eine Vergleichung des Aretaios und Aetius mit ihm läßt ihre Zusammengehörigkeit als unzweifelhaft erscheinen.

¹⁾ Wig. *πηλικωτέρησι* Hds.

μελλούσης δὲ <ἤδη>¹⁾ ἀνίσθαι, προτρέχει ἐκ τῶν γυναικείων τόπων ὑγρασία πρὸς τὴν ἀφὴν, καὶ βορβορυγμὸς γίνεται τῶν ἐντέρων, αὐτὴ τε ἐπιχαλᾶται κατ' ὀλίγον ἢ ὑστέρα· καὶ οὕτως ἀπολαμβάνουσιν αἱ πάσχουσαι τό τε νοεῖν καὶ αἰσθάνεσθαι καὶ κινεῖσθαι. ἐπιπίπτει δὲ τὸ πάθος αἰ μὲν, μάλιστα δὲ ἐν χειμῶνι καὶ φθινοπώρῳ· νέοις δὲ μᾶλλον καὶ εὐκαταφόροις πρὸς λαγνείαν, στείραις²⁾, καὶ μάλιστα εἰ διὰ φαρμακείαν εἶεν ἄτοκοι.

¹⁾ ἤδη fehlt in W. Vgl. Soran ed. Dietz 250. ²⁾ *στείραις* fehlt in P.

Die Theorie endlich, daß die hysterischen Erstickungsanfälle nicht auf einer Entzündung im Körper, sondern auf einer Verderbnis des Pneuma beruhen, paßt vortrefflich zu Archigenes. Er hatte in ähnlicher Weise bei der Behandlung der Synanche die Ansicht bekämpft, daß sie auf einer Entzündung beruhe und sie für ein Leiden des Pneuma ausgegeben, das durch die schlechte Beschaffenheit der Atemluft hervorgerufen werde. (Aret. caus. ac. m. I 7, 11). An jener Stelle des Aretaios kehrt sogar zum Beweis für die unheilvolle Wirkung verderbter Säfte das Beispiel vom tollen Hunde wieder (Aret. p. 12, 9). Zum Schluß will ich noch darauf verweisen, daß auch die Therapie des Philumenos abgesehen von ihrer größeren Reichhaltigkeit sich im Wesentlichen mit Aretaios (cur. ac. m. II 10, 285 f.) deckt.

Die einzige Quelle für unsere Kenntnis der pneumatischen Entwicklungsgeschichte ist das zweite Buch der Galenischen Schrift *περὶ σπέρματος* (IV 593 f.). Im ersten Teile dieses Buches widerlegt Galen die Ansicht des Athenaios, daß die Weiber keinen Samen haben und sucht zu erweisen, daß sie nicht nur Samen haben, sondern daß ihr Same auch ebenso wie der des Mannes Gestaltungskraft (*δύναμις*) besitze. Athenaios hatte im 7. Buche seiner medizinischen Compilation über den Samen gehandelt¹⁾ und ohne Zweifel im Anschluß daran in seiner bekannten doxographischen Manier

¹⁾ Gal. IV 604.

seine ganze Entwicklungslehre auseinandergesetzt¹⁾. Da er sich in dieser Theorie aufs engste an Aristoteles²⁾ anschloß, so glaube ich in ihm die Quelle sehen zu dürfen, aus welcher dem Galen die Aristotelescite in diesem Buche zuflossen.

Die sachlich keineswegs scharf gegliederte Beweisführung des Galen zerfällt der Hauptsache nach in 2 Teile: im ersten wird aus dem Bau der weiblichen Zeugungsorgane, insbesondere der Ovarien und der Muttertrompeten gefolgert, daß auch die Weiber Samen haben (592—601). Seine Quelle für die Beschreibung der Ovarien (*δίδυμοι*) und der Samenkanäle (*σπερματικοὶ πόροι*) ist Herophilos, der in seiner Anatomie ausführlich über die Geschlechtsorgane gehandelt hatte (596). Die Ansicht des Herophilos wird von ihm in zwei Punkten berichtigt, nämlich darin, daß die Samenkanäle nicht deutlich zu sehen seien und daß sie sich wie beim Manne bis an den Hals der Blase erstrecken. Zum Beweis für seine Behauptung, daß die Weiber Samen haben, führt er das bekannte, von Archigenes entlehnte³⁾ Beispiel von einer Witwe an, die, von hysterischen Krämpfen befallen, dickflüssigen Samen in reichlicher Menge von sich gegeben habe (598). Dieser Teil schließt mit einer Widerlegung der Behauptung des Athenaios (599), daß die weiblichen Geschlechtsorgane nur der Harmonie wegen in der angeführten Weise gebildet seien in ähnlicher Weise wie die Brustdrüsen des Mannes.

Im zweiten Teile (601—615) entwickelt er die Widersprüche, zu welchen die Behauptung des Athenaios, daß die Weiber bei der Begattung keinen Samen liefern, mit der von ihm gebilligten Annahme von der Bildungskraft des Samens führt. Zugestandenermaßen besitzt der Same als das bildende Princip die Kraft, das Erzeugte so zu gestalten, daß es dem Erzeuger ähnlich oder unähnlich wird (603). Wenn also das Weib keinen Samen hat, so ist klar, daß das Erzeugte niemals der Mutter ähnlich werden könne (607) ebenso wie im umgekehrten Falle, wenn die Katamenien die

¹⁾ Er wird von Galen an 10 Stellen citiert: IV 599. 601. 603. 604. 610. 612. 613. 614. 620. 626.

²⁾ Vgl. Gal. IV 601. 612. 613. 620, wo er mit Aristoteles zusammen genannt wird.

³⁾ Vgl. S. 96.

Kraft des Samens haben, das Erzeugte niemals mit dem Vater Ähnlichkeit haben könne. Athenaios hatte auch aus diesem Dilemma einen Ausweg gefunden, indem er die Ähnlichkeit des Erzeugten mit der Mutter aus der ihm von ihr zugeführten Nahrung erklärte und sich dabei auf die Veränderungen berief, die in der Tier- und Pflanzenwelt durch die Nahrung herbeigeführt werden (603). Galen gelangt dann weiter durch ein doppeltes Schlussverfahren zu dem Resultat (609), daß die Ähnlichkeit der Kinder mit den Erzeugern sich nur aus dem Samen erklären lasse, daß also der weibliche Zeugungsstoff Same d. h. als solcher Kraft (*δύναμις*) und Stoff (*ὕλη*) zugleich sein müsse (613). Selbst dies Resultat, zu dem Galen auf rein logischem Wege gelangt, ist nicht sein geistiges Eigentum. Er giebt es unverholen zu, wenn er im Folgenden berichtet, daß gegen diese Annahme zweierlei geltend gemacht werde: 1. Für den Fall, daß das Weibchen Stoff und Kraft zugleich enthält, ist das Männliche überflüssig. 2. Daß das Männliche überflüssig sei, beweisen die Hühner, die ohne vorhergehende Begattung Eier zu legen imstande sind (616). Dieser doppelte Einwurf giebt ihm Veranlassung die Frage zu erörtern, warum das Weib nicht aus sich selbst zeugen und warum, auch wenn das Weibchen Samen habe, ein Männliches entstehen könne. Er beginnt mit der Ansicht des Empedokles über die Ursachen der Entstehung männlicher und weiblicher Individuen, die in dem Satze gipfelt, daß die Teile der sich bildenden Jungen sich teils im Männchen, teils im Weibchen befänden, weshalb diese auf Vereinigung mit einander bedacht sein (616f.)¹⁾. Diese Ansicht des Empedokles, die zuerst von Aristoteles behandelt worden, ist so sehr Gemeingut der späteren naturwissenschaftlich medicinischen Litteratur geworden, daß die Annahme gerechtfertigt erscheint, Galen verdanke sie derselben Quelle, aus der ihm die Aristoteles-citate zugeflossen sind, d. h. dem Athenaios, zumal dieser sicher den Empedokles²⁾ benützt hat.

In der folgenden Auseinandersetzung, welche die Frage nach der Ähnlichkeit der Kinder mit den Eltern behandelt (626f.), kann man zweifelhaft sein, inwieweit hier Galen seiner Quelle folgt und inwieweit er diese Frage selbst weiter ausführt. Jedenfalls ist diese

¹⁾ Vgl. Stein, Emped. Agrig. fragm. p. 65, wo diese Stelle des Galen fehlt.

²⁾ Orib. III 79.

Frage auch von Athenaios erörtert worden und zwar in einer Weise, daß er damit in Widerspruch mit seiner Ansicht über die Bedeutung des weiblichen Samens kam (614). Da Galen ausdrücklich zum Beweis dafür auf das Folgende verweist (614), so glaube ich in seiner Auseinandersetzung über diese Frage die Ansicht des Athenaios wiederzufinden. Nimmt man an, so heißt es bei ihm, daß die Ähnlichkeit durch das Überwiegen des Samens zu stande komme, so müßten alle Teile demjenigen der Erzeuger ähnlich werden, dessen Same überwiege. Dem widerspricht aber die Erfahrung. Demnach ist die Ähnlichkeit nur so zu erklären, daß bei den verschiedenen Akten der Begattung bald der männliche, bald der weibliche Same überwiegt und daß der in jedem Fall überwiegende Same zur Bildung der einzelnen Körperteile beitrage.

Eine weitere Frage ist die nach der Entstehung des Geschlechtsunterschiedes. Die Ansicht des Straton (629), der ihn daraus erklärte, daß entweder der männliche Same über den weiblichen oder dieser über jenen das Übergewicht habe, wird von ihm verworfen. Seine Quelle ist vermutlich wieder Athenaios, der den Straton benützt und bekämpft hat¹⁾. Galen erklärt sie vielmehr aus dem Vorwiegen der warmen und trockenen oder der kalten und feuchten Qualitäten in der Gebärmutter. Diese Erklärung beruht durchaus auf pneumatischer Anschauung. Athenaios hat thatsächlich Kälte und Feuchtigkeit als die dem weiblichen Geschlecht eigene Qualitätenverbindung bezeichnet²⁾ und dementsprechend Wärme und Trockenheit als die des männlichen Geschlechts. Darin waren ihm die späteren Pneumatiker wie Archigenes³⁾ gefolgt. Die Grundlage für diese Annahme bilden zwei Sätze des Empedokles, daß sich der männliche Embryo schneller entwickle als der weibliche und daß er für gewöhnlich aus der rechten Seite des Uterus d. h. aus der wärmeren stamme (631. 633). Da nun ausdrücklich überliefert ist⁴⁾, daß Athenaios diese beiden Sätze des Empedokles in seiner Entwicklungslehre gekannt und verwertet hat, so halte ich die Vermutung für wahrscheinlich, daß diese Verknüpfung der pneumatischen Qualitätentheorie mit den alten Lehrsätzen des Empedokles zur Erklärung der Entstehung des Geschlechtsunterschiedes auf ihn zurück-

¹⁾ Gal. VII 615 f.

²⁾ Orib. III 97.

³⁾ Aret. caus. ac. m. I 6 p. 7.

⁴⁾ Orib. III 79.

geht. Dafür würde die Thatsache sprechen, daß er in diesem Abschnitte mit keinem Worte erwähnt wird, da Galen bekanntlich seine Quelle nur dann zu nennen pflegte, wenn er gegen sie polemisiert.

Zum Schlusse dieser Untersuchung will ich noch darauf verweisen, daß man sich angesichts der Thatsache, daß Athenaios für uns der letzte Arzt ist, der seine Entwicklungstheorie auf Aristoteles aufbaute, veranlaßt sehen könnte, die beiden bei Oribasius (III 63) sich unmittelbar an ein Excerpt aus Athenaios anschließenden aus Aristoteles geschöpften Capitel über die Lebensfähigkeit der Kinder von 8 Monaten¹⁾ und über die Molenschwangerschaft²⁾ auch für ihn in Anspruch zu nehmen.

3. Oribasius. Aetius.

Die umfänglichsten Excerpte aus den verloren gegangenen Schriften der pneumatischen Ärzte sind uns in den großen Compilationen des Oribasius, des Leibarztes des Kaisers Julian, und des syro-armenischen Christen Aetius aus Amida aus dem 6. Jahrh. erhalten. Leider sind die späteren medicinischen Sammelwerke von der modernen Forschung derartig vernachlässigt worden, daß über ihre Quellen so gut wie nichts bekannt ist. Über beide hier ein Wort.

Was Oribasius anlangt, so ist die Frage berechtigt, ob die Excerptenmassen, die er seinem *ἐβδομηκοντάβιβλος* einverleibt hat, von ihm zusammengestellt sind. V. Rose hat in seinen *Anecdota graeca*³⁾ zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß zahlreiche Excerpte, die Oribasius aus Athenaios, Herodot, Archigenes, Rufus und Antyll erhalten hat, in dem Commentar des Galen zu der hippokratischen Schrift *περὶ χυμῶν*⁴⁾ und, was ergänzend hinzuzufügen ist, in seiner Schrift *περὶ βδελλῶν, ἀντισπάσεως, σικύας καὶ ἐγχαράξεως καὶ κατασχασμοῦ*⁵⁾ wiederkehren, ohne aus diesem Thatbestand die weiteren Schlussfolgerungen gezogen zu haben. Aus dem Umstande nämlich, daß bei Galen mehrfach dieselben aus verschiedenen

¹⁾ Arist. histor. an. VII p. 203 (B).

²⁾ Arist. an. gen. IV 107. histor. an. IX 318. 315 (B).

³⁾ Anecd. gr. I 22 f.

⁴⁾ Gal. XVI 1 ff.

⁵⁾ Gal. XI 317 f.

Autoren entlehnten Stücke in derselben Reihenfolge wiederkehren, folgt mit Notwendigkeit, daß es bereits vor Galen eine medizinische Compilation im Stil des Oribasius gegeben hat.

Orib. II 36f. steht ein Excerpt aus Antyll über die Frage, welche Gefäße beim Aderlaß zu öffnen sind; daran schließt sich ein Stück aus Herodot (II 42) über die Zeit des Aderlasses in den verschiedenen Fieberperioden. Beide Excerpte folgen bei Galen (XVI 134) in entsprechender Kürzung in umgekehrter Reihenfolge auf einander:

Gal. XVI 134:

Εἰ δὲ συνεχεῖς εἶεν οἱ πυρετοὶ, δῆλον δὲ τινα παροξυσμὸν φέροιν¹⁾, καθ' ὃν προστιθέντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεγέθους μένουσι, ποιοῦμενοι τεταγμένως ἢ ἀτάκτως τὰς προσβολὰς, ἐπιθεωρητέον, ὥς ἐνι μάλιστα, μὴ κατὰ τὰς ἐπιθέσεις τῶν ἐπισημασιῶν τὰς ἀφαιρέσεις ποιῆσθαι, ἀλλὰ κατὰ τοὺς διομαλισμοὺς²⁾, ποιοῦμεθα δὲ τὴν ἀφαίρεσιν ἀπὸ μορίων πολλῶν. εἰ μὲν οὖν ἀπὸ μετώπου ποιῆς, τὴν εὐθειᾶν ἐπὶ μετώπῳ φλέβα διαιρήσεις, ἐπὶ δὲ τῶν πλείστων κατὰ τὰ ἄνω μέρη τοῦ μετώπου καὶ πρὸς τῷ βρέγματι, ἐνθα ὑοειδῶς ἢ φλὲψ σχίζεται. δεῖ δὲ παρὰ αὐτὴν τὴν σχίσιν ἐν τῷ κάτω μέρει ποιεῖν τὴν διαίρεσιν· τὰς δὲ ἐν τοῖς κανθοῖς ἐγγὺς τῆς ὀφρύος πολὺ ἀνωτέρω τῶν κανθῶν. Ὅπισθεν δὲ τῶν ὠτων³⁾ διαιρετέον τὴν ἀντικειμένην τῷ τραγανῷ τοῦ ὠτός. Ὑπὸ δὲ τῆς γλώττης, εἰ μὴ ἀμφοτέρως διαιροῦμεν, τὴν ὑπερέχουσαν κατὰ μέγεθος τὴν δεξιὰν τεμοῦμεν· κατὰ δὲ χεῖρα

¹⁾ φέροιν Orib. φέρουσι Gal.

²⁾ διομαλισμοὺς Orib. διορισμούς Gal. ³⁾ τοῦ ὠτός Hds.

Orib. II 42:

Τίς καιρὸς φλεβοτομίας ἐν τοῖς ἐπὶ μέρους καιροῖς; ἐκ τῶν Ἡροδότου, ἐκ τοῦ περὶ κενουμένων βοηθημάτων.

43, 13: Εἰ δὲ συνεχεῖς μὲν εἶεν οἱ πυρετοὶ, ἐκδηλον δὲ τινα παροξυσμὸν φέροιν, κατὰ ὃν προστιθέντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεγέθους μένουσι, ποιοῦμενοι τεταγμένως ἢ καὶ ἀτάκτως τὰς προσβολὰς, ἀποθεωρητέον, ὥς ἐνι μάλιστα, μὴ κατὰ τὰς ἐπιθέσεις τῶν ἐπισημασιῶν τὰς ἀφαιρέσεις ποιῆσθαι, ἀλλὰ κατὰ τοὺς διομαλισμούς· οὗτος γὰρ καὶ πρὸς τροφήν καιρὸς ἐπιτήδειος.

38, 1: Ποῖα τῶν ἐν τοῖς μέρεσιν ἀγγεῖα διαιρετέον; ἐκ τῶν Ἀντύλλου, ἐκ τοῦ β' λόγου τῶν κενουμένων βοηθημάτων.

Ἀπὸ μετώπου τὴν ἀφαίρεσιν ποιοῦμενοι, τὴν εὐθειᾶν ἐπὶ μετώπῳ διαιροῦμεν φλέβα, ἐπὶ δὲ τῶν πλείστων κατὰ τὰ ἄνω μέρη τοῦ μετώπου καὶ πρὸς τῷ βρέγματι, ἐνθα ὑοειδῶς ἢ φλὲψ σχίζεται· δεῖ δὲ παρὰ αὐτὴν τὴν σχίσιν ἐν τῷ κάτω μέρει ποιεῖν τὴν διαίρεσιν· τὰς δὲ ἐν τοῖς κανθοῖς ἐγγὺς τῆς ὀφρύος πολὺ ἀνωτέρω τῶν κανθῶν. Ὅπισθεν δὲ τῶν ὠτων διαιρετέον τὴν ἀντικειμένην τῷ τραγανῷ τοῦ ὠτός. Ὑπὸ δὲ τῆς γλώττης, εἰ μὴ ἀμφοτέρως διαιροῦμεν, τὴν ὑπερέχουσαν κατὰ μέγε-

κατὰ νώτου¹⁾ τῆς χειρὸς τὴν οὖσαν μεταξὺ τοῦ μέσου καὶ παραμέσου δακτύλου· κατὰ δὲ ἰγνύαν τὴν μεσοιτάτην· κατὰ δὲ σφυρὸν²⁾ τὰς ἔνδον· ἀλλὰ σμικρότης πολλάκις ποιεῖ ὥς οὐκ εἶναι ἔφ' ἡμῖν ἄς φλέβας βουλόμεθα διελεῖν. Ἐπὶ δὲ τῶν κατ' ἀγκῶνα, εἰ κατὰ φύσιν ὡς ἐπὶ τῶν πλείστων ἐπιτήδεια εἴη τὰ τρία ἀγγεῖα³⁾ καὶ φανερά, τό τε ἄνω τὸ κατὰ τὸν μῦν καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ πρὸς τῇ ἀποφύσει τοῦ βραχίονος, διακρινούμεν, ποῖον αὐτῶν ἐπὶ τίνων διαιρετέον. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν λιποθυμικῶν⁴⁾ ἢ ἔφ' ὧν τι κεκάκωται ὁ στόμαχος ἢ τὰ τῆς δυνάμεως, τὸ ἄνω διαιρετέον ἀγγεῖον· ἐπὶ δὲ τῶν ἀθρόας ἀφαιρέσεως χρηζόντων καὶ εὐτόνου τῆς κενώσεως⁵⁾ τὸ μέσον· ἐπὶ δὲ τῶν μεταποιήσεως χρηζόντων, ὥσπερ ἐπιληπτικῶν, τὸ κάτω. ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχνῶν φυλακτέον τὸ κάτω καὶ ἔφ' αὐτὸν εὐρωσιόν τε καὶ πάνυ μέγα ἐστίν. ἐπὶ δὲ τῶν σφόδρα πιμελωδῶν τὸ ἄνω διαιρετέον.

¹⁾ νῶτον Hds. ²⁾ σφυρῶν Hds.

³⁾ τὰ ἀγγεῖα Hds. ⁴⁾ λειποθυμικῶν Hds. ⁵⁾ κινήσεως Hds.

θος τὴν δεξιὰν τεμοῦμεν· κατὰ δὲ χεῖρα κατὰ νώτου τῆς χειρὸς τὴν οὖσαν μεταξὺ τοῦ μέσου καὶ παραμέσου δακτύλου· κατὰ δὲ ἰγνύαν τὴν μεσοιτάτην· κατὰ δὲ σφυρὸν τὰς ἔνδον, καὶ, εἴ γε εἶεν αἱ μὲν ἔμπροσθεν τοῦ σφυροῦ, αἱ δὲ ὀπισθεν, τὰς ἔμπροσθεν· διὰ μέντοι τὴν μικρότητα τῶν ἀγγείων τὰ πολλὰ οὐκ ἐπὶ ἡμῖν ἐστὶν ἂν βουλόμεθα διελεῖν. Ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ ἀγκῶνα καὶ τὰ ἐν τούτῳ διαιρούμενα ἀγγεῖα ἐξετάσεως ποικιλωτέρας χρήζει... εἰ δὲ ὥσπερ κατὰ φύσιν καὶ ἐπὶ τῶν πλείστων ἐπιτήδεια εἴη τὰ τρία καὶ φανερά, τό τε ἄνω τὸ κατὰ τὸν μῦν καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ πρὸς τῇ ἀποφύσει τοῦ βραχίονος, ὃ δὴ καὶ ἀρτηριῶδές ἐστι, διακρινούμεν, ποῖον αὐτῶν ἐπὶ τίνων διαιρετέον. Ἐπὶ μὲν τῶν λιποθυμικῶν ἢ ἐπὶ ὧν κεκάκωται στόμαχος ἢ τὰ τῆς δυνάμεως ὑποπτὰ ἐστὶ, τὸ ἄνω διαιρετέον ἀγγεῖον· ἐπὶ δὲ τῶν ἀθρόας ἀφαιρέσεως χρηζόντων καὶ κενώσεως εὐτόνου τὸ μέσον· ἐπὶ δὲ τῶν ξενισμοῦ καὶ μεταποιήσεως χρηζόντων, ὥσπερ ἐπιληπτικῶν... τὸ κάτω... ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ ἰσχνῶν φυλακτέον τὸ κάτω καὶ ἐπὶ ὧν εὐρωσιόν τε καὶ σφόδρα μέγα ἐστίν... ἐπὶ δὲ τῶν σφόδρα πιμελωδῶν... τὸ ἄνω διαιρετέον.

Die größeren Excerptenmassen bei Oribasius II 195ff. über das Brechen und die Klystiere aus Rufus und Diokles folgen bei Galen (XVI 141) ebenfalls auf einander:

Gal.:

Περὶ δὲ τῆς κενώσεως τῆς διὰ ἐμέτου τί δεῖ λέγειν; φανερόν γάρ ὅτι τοῖς εἰωθόσι μὲν ἐμεῖν ἐνίοτε συμφέρει προσάγειν, ἐνίοτε δὲ ἀπεθίζειν. Εἰ μὲν οὖν εἰς τὴν κοιλίαν συρῶσιν ξανθὴ χολή, ἣν ὁ ἄνθρωπος

Orib.:

Τοῖς ἐθάσι τῶν ἐμέτων ἐνίοτε μὲν συμφέρει προσάγειν, ἐνίοτε δὲ ἀπάγειν τε καὶ ἀπεθίζειν. Εἰ μὲν οὖν εἰς τὴν κοιλίαν συρῶσιν ξανθὴ χολή, πικροχόλου τε ὄντος τοῦ ἀνθρώπου καὶ χωρίον οἰκοῦντος θερμὸν ἐν τε

ἢ πικρόχολος καὶ <κατὰ>¹⁾ χωρίον θερμὸν ἐν τε πόνοις καὶ φροντίσι διαιτούμενος, προσεθίζειν χρὴ τὴν χολὴν ἑμῖν, πρὶν προσαίρεσθαι τροφήν· εἰ δὲ διὰ τὸ πλεόν ἐθέλειν οἴνου πίνειν ἐπὶ τοῖς λουτροῖς πρὸ τῶν σιτίων, ἀπάγειν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ πλήθους ἀφαιρεῖν τῶν τε σιτίων καὶ ποτῶν. ἢ γὰρ κοιλία διὰ τούτων ἀσθενὴς γενομένη τὰς ἐξ ὅλου τοῦ σώματος περιουσίας εἰς αὐτὴν συρῶεούσας ὑποδέχεται. ἐνίοτε δὲ ἑμῖν προσήκει, ὥς χυμὸν γλίσχρον καὶ πλεῖστον ἀπορρῖψαι²⁾ τῆς γαστρὸς **** καὶ εἰ συνεχῶς τοιοῦτον χυμὸν ἀθροίζει τις ἐν τῇ γαστρὶ, συνεχῶς ἑμῖν αὐτὸν δεῖ. ἑμπαλιν δὲ <εἰ> ἢ κοιλία ἀτονοῦσα μὴ δύναται φέρειν τὰ ληφθέντα, οὐκ ἑμετέον καὶ δοτέον ὀλίγα σιτία τε καὶ εὐστόμαχα καὶ τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθεμένοις φαρμάκοις ῥωννύντες αὐτὴν ἑάσομεν³⁾.

Ἐπειδὴ δὲ τοῖς χαλεπῶς ἑμοῦσι κίνδυνος οὐχ ὁ τυχῶν καὶ φλέβιον ῥῆξαι καὶ τὴν ὄψιν βλαβῆναι καὶ κιονίδα καὶ στόμαχον ὀδυνηθῆναι καὶ ἄλλα κακὰ παθεῖν, διὸ ἐξευρήκασιν οἱ ἱατροὶ τρόπους, καθ' οὓς ἔνεστιν εὐπειτῶς ἑμῖν.

ἐφ' ὧν γοῦν βουλόμεθα τὸν μετὰ δεῖπνον ἑμετον ἀλύπως κινῆσαι, τοὺς βολβοὺς τῶν ναρκίσσων ἅμα τῶν ἐσθιομένων φαγεῖν δώσομεν καὶ οὕτως εὐημεῖς αὐτοὺς ποιήσομεν. ἑμετικὸν δὲ ἐστὶ καὶ ἀναγύρεως σπέρμα καὶ βαλάνου μυρεψικῆς

1) Wil. 2) ἀποτρῖψαι Hds. 3) Wil. ἱάσωμεν Hds.

πόνοις καὶ φροντίσι διαιτουμένου, προσεθίζειν χρὴ τὴν χολὴν ἑμῖν, πρὶν προσαίρεσθαι τροφήν· εἰ δὲ διὰ τὸ πλεόν ἐθέλειν οἴνου πίνειν ἐπὶ τοῖς λουτροῖς πρὸ τῶν σιτίων, ἀπάγειν τοῦ κατὰ τὸν ἑμετον ἔθους ἅμα τῷ καὶ τοῦ πλήθους ἀφαιρεῖν τῶν τε σιτίων καὶ ποτῶν· ἀσθενὴς γὰρ ἢ κοιλία γενομένη τούτων, ἐθίζεται δέχεσθαι τὰς ἐξ ὅλου τοῦ σώματος περιουσίας εἰς αὐτὴν συρῶεούσας. Κατὰ καιροὺς δὲ τινὰς ἑμῖν συμφέρει χάριν τοῦ χυμὸν γλίσχρον καὶ πλεῖστον ἀπορρῖψαι τῆς γαστρὸς ... Καὶ εἰ συνεχῶς δὲ τὸν τοιοῦτον χυμὸν ἀθροίζει τις ἐν τῇ γαστρὶ, συνεχῶς ἐπὶ τὸν ἑμετον ἄξομεν· ἑμπαλιν δὲ, ἀτονούσης τῆς κοιλίας, ὥς μὴ δύνασθαι φέρειν τὰ ληφθέντα, κωλύσομεν ἑμῖν, ὀλίγα τε διδόντες σιτία καὶ ταῦτα εὐστόμαχα, καὶ τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθεμένοις φαρμάκοις ῥωννύντες αὐτήν.

II 197: Πῶς ἂν τις εὐκόλως ἑμοῖ; Ἐκ τῶν Ρούφου· ἐκ τῶν πρὸς Ποταμωνιανὸν περὶ ἐμέτων.

Ἐπειδὴ τοῖς συντόνως καὶ χαλεπῶς ἑμοῦσι κίνδυνος οὐχ ὁ τυχῶν καὶ φλέβιον ῥῆξαι καὶ τὴν ὄψιν βλαβῆναι, φαρύγγεθρόν τε καὶ κιονίδα καὶ στόμαχον ὀδυνηθῆναι καὶ τι ἄλλο οὐκ ἐπιτήδειον παθεῖν, διὸ δὴ ἐξευρήκασιν οἱ ἱατροὶ τρόπους, κατὰ οὓς ἔνεστιν εὐπειτῶς ἑμῖν

II 196, 9: Ἐπὶ ὧν δὲ βουλόμεθα τὸν μετὰ δεῖπνον ἑμετον ἀλύπως κινῆσαι, τοὺς βολβοὺς τῶν ναρκίσσων ἅμα τῶν ἐσθιομένων τινὲ φαγεῖν δόντες, εὐημεῖς αὐτοὺς ποιήσομεν· ἐστὶ γὰρ ἑμετικὸν φάρμακον ὁ τοῦ ναρκίσσου βολβός, ὃν κεφαλὴν ὀνομάζουσιν. Ἐμετικὸν δὲ ἐστὶ καὶ ἀναγύρεως τὸ σπέρμα καὶ βαλάνου μυρεψικῆς τῆς σαρκὸς δραχμὴ μία

τῆς σαρκὸς δραχμὴ μία μετὰ μελικράτου ποθεῖσα. Πολλάκις δὲ καὶ διὰ τῆς κάτω κοιλίας ὑπάγει, ὡς καὶ τὸ ἥπαρ καὶ τὸν σπλῆνα μετὰ ὀξυκράτου διακαθαῖραι.

ὁ δ' ἔμετος πολλὰς ὠφελείας ἐπιφέρει· καὶ γὰρ τὸ φλέγμα κενοῖ καὶ κεφαλὴν βαρεῖαν ἐπικουφίζει καὶ τὴν ὅλην ἔξιν τοῦ σώματος ἐλαφροτέραν παρέχει, καὶ ποτε καὶ προθυμότερον φαγόντα ἀπεπτήσαι κωλύει καὶ ἀπολαύσαντα οἴνου πλείονος οὐκ ἔῃ βλαβῆναι. Ὅστις δὲ ἔμεῖν ἐθέλει, στοχαστέον αὐτῷ τῶν προσφερομένων, ὡς μὴ στρυφνὰ ἢ ξηρὰ ἢ, ἀλλὰ τὰ μὲν τοῦ γλυκυτέρου καὶ ὑγροτέρου τρόπου, τὰ δὲ τοῦ δριμυτέρου... ἔστι δὲ τοιάδε¹⁾ ἢ ῥαφανίς τε καὶ εὐζωμον καὶ τάριχος παλαιὸν καὶ ὀριγανίς χλωρὰ καὶ κρομμύου ὀλίγον καὶ πράσου καὶ τῶν ὀσπρίων πιτάναι, μέλιτος ἔχουσai, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν κυάμων ἔτι²⁾ καὶ τὰ πίονα τῶν κρεῶν. τῶν οἴνων δὲ τοὺς γλυκυτέρους αἰρετέον· οὗτοι γὰρ ἐπιπολαστικώτεροι, καὶ μᾶλλον εἰ κεραννῦντο τοῦ εἰωθότος ὑδαρέστερον.

Ῥᾶον δὲ τις καθήμενος ἔμεῖ ἢ ὀρθός· δεῖ δὲ μὴ βιάζεσθαι³⁾ προθυμούμενον πάντα ἔξεμεῖν ἀκριβῶς, ἀλλ' ὅταν κενωθῇ τις ἱκανῶς, ἔαν. Μετὰ δὲ τὸ ἔμεῖν τὸ δοκοῦν εὐλογον εἶναι, διάνιψον τὴν κοιλίαν ὥσπερ ἀγγεῖον [τι]⁴⁾, πιώντα⁵⁾ μελίκρατον ἢ ὕδωρ πολὺ καὶ πάλιν ἔμεσον.

1) Wil. τόδε Hds. 2) ἔτι Hds.
3) βιάζοντα Hds. 4) Wil. 5) Wil.
πιὼν τὸ Hds.

μετὰ μελικράτου ποθεῖσα. Πολλάκις δὲ καὶ διὰ τῆς κάτω κοιλίας ὑπάγει δαιψιλές, ὅθεν, ἐπειδὰν ὑπὲρ τοῦ διακαθαῖραι τι τῶν σπλάγχχνων καὶ μάλιστα ἥπαρ ἢ σπλῆνα χρώμεθα τῷ φαρμάκῳ, μετὰ ὀξυκράτου δίδομεν.

II 197, 8: καὶ γὰρ φλέγμα κενοῖ, καὶ κεφαλὴν βαρεῖαν ἐπικουφίζει καὶ τὴν ἄλλην ἔξιν ἐλαφροτέραν παρέχει καὶ ποτε καὶ προθυμότερον φαγόντα ἀπεπτήσαι κωλύει ἢ καὶ ἀπολαύσαντα οἴνου πλείονος οὐκ ἔῃ βλαβῆναι... Στοχαστέον δὲ καὶ τῶν προσφερομένων, ὡς μὴ στρυφνὰ ἢ ξηρὰ ἢ, ἀλλὰ τὰ μὲν τοῦ γλυκυτέρου τρόπου καὶ ὑγροτέρου, τὰ δὲ τοῦ δριμυτέρου. Δοκεῖ δὲ ἐν τούτοις ῥαφανίς τε εὐδοκιμεῖν καὶ εὐζωμον καὶ τάριχος παλαιὸν καὶ ὀριγανίς χλωρὰ καὶ κρομμύου ὀλίγον καὶ πράσου. Συνεργεῖ δὲ τοῖς ἔμέτοις καὶ τῶν ὀσπρίων αἶ τε πιτάναι, μέλιτος ἔχουσai, καὶ τὰ πίονα τῶν κρεῶν... Δῆλον δὲ δήπου, ὅτι καὶ τῶν οἴνων τοὺς ὡς γλυκυτάτους αἰρετέον· οὗτοι γὰρ ἐπιπολαστικώτεροι, καὶ μᾶλλον εἰ κεραννῦντο τοῦ εἰωθότος ὑδαρέστερον.

II 200: Ἐμετικά. Ἐκ τῶν Διοκλέους.

201, 9: Ῥᾶστα δὲ ἂν τις καθήμενος ἔμοι ἢ ὀρθός. δεῖ δὲ μὴ βιάζεσθαι προθυμούμενον πάντα ἔξεμεῖν ἀκριβῶς, ἀλλὰ, ὅταν κενωθῇ τις ἱκανῶς, ἔαν... Μετὰ δὲ τὸ ἔμεῖν τὸ δοκοῦν εὐλογον εἶναι, καθάπερ ἀγγεῖον διανίψαι τὴν κοιλίαν, πιώντα μελίκρατον, ἢ ὕδωρ πολὺ καὶ πάλιν ἔμέσαι.

Bei Galen folgen Excerpte aus Rufus über die Clystiere (XVI 144, 11) = Orib. II 204, 7: περὶ κλύσματος. Ἐκ τῶν Ρούφου,

über das Räuchern (147, 8) = Orib. II 186, 3: *Ἡερὶ ὑποκαπνισμοῦ*. *Ἐκ τῶν Ἀντύλλου*, über Niesmittel (147, 14) = Orib. II 188, 1 aus Antyll, über Thränen- und Urinreizende Mittel (148, 1) = Orib. II 188, 4. 189, 1 ebenfalls aus Antyll.

Die weiteren übereinstimmenden Parteen sind folgende:

- | | | |
|----------|-------------|---------------------------------|
| Gal. XVI | 95 | = Orib. II 66 (aus Apollonios). |
| „ | „ 117, 3f. | = Orib. II 88. |
| „ | „ 117, 11f. | = Orib. II 90 (aus Rufus). |
| „ | „ 119ff. | = Orib. II 93 ff. (aus Rufus). |
| „ | „ 400 | = Orib. II 298 (aus Antyll). |
| „ | „ 401 | = Orib. II 302 (aus Athenaios). |
| „ | XI 317 | = Orib. II 69 (aus Antyll). |
| „ | „ 321 | = Orib. II 63 (aus Antyll). |
| „ | „ 322 | = Orib. II 64 (aus Apollonios). |

Die Annahme, daß Oribasius die betreffenden Parteen aus Galen entlehnt habe, stellt sich bei der gröfseren Reichhaltigkeit des Oribasius in allen Capiteln als von Haus aus unzulässig dar. Es bleibt demnach nur die Möglichkeit, ihre Übereinstimmung daraus zu erklären, daß sie aus demselben verloren gegangenen Werke geschöpft haben. Dies Resultat kann uns bei einem Schriftsteller wie Galen nicht überraschen, da ja sein Commentar zu Hippokrates *περὶ χυμῶν*, an dessen Echtheit zu zweifeln nicht der geringste Anlaß vorliegt, lediglich für Schulzwecke bestimmt war. Das Quellenwerk war eine umfängliche Compilation, in der nach bestimmten Gesichtspunkten Excerpte medicinischer Art besonders aus den Ärzten der pneumatischen Schule, wie Athenaios, Herodot, Apollonios von Pergamon, Archigenes, Rufus und Antyll an einander gereiht waren.

Die weitere Frage nach dem Verfasser dieser Compilation ist nicht so wesentlich und es würde nichts verschlagen, wenn sie unbeantwortet bliebe. Indessen scheint eine schwache Spur auf den Namen zu führen. Da die meisten der benützten Schriftsteller der pneumatischen Schule angehören, so ist der Schluss berechtigt, daß die Compilation das Werk eines pneumatischen Arztes ist. Der jüngste der excerpierten Pneumatiker ist Antyll, der sicher nach Archigenes¹⁾ und vor Galen, also etwa um 140 n. Chr. anzusetzen ist. Seine Schrift *περὶ βοηθημάτων* ist von Oribasius häufig und

¹⁾ Er citiert den Archigenes: Orib. II 337.

in großer Ausführlichkeit excerpiert worden. Wäre der Nachweis möglich, daß er in dieser Schrift einen oder mehrere der genannten Schriftsteller excerpierte, so glaube ich, würde die Vermutung, daß er die postulierte Quelle ist, zu einer fast an Gewissheit reichenden Höhe der Wahrscheinlichkeit erhoben werden. In der That sprechen zwei Stellen dafür, daß seine Schrift eine Compilation gewesen.

Die eine Stelle steht bei Oribasius II 383f. 409. 410. Diese Excerpte aus Antyll über die natürlichen Bäder, über das Ausziehen der Haare mittelst der Pechmütze, über die Verwendung des Pechs und über die Anwendung von Senfpflastern kehren wörtlich bei Aetius (III 167. 180. 181) wieder, tragen aber bei ihm nicht den Namen des Antyll, sondern des Archigenes. Das erste dieser Capitel möge hier in Gegenüberstellung Platz finden:

Orib. II 383:

Περὶ τῶν αὐτοφυῶν λουτρῶν. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου (sc. ἐκ τῶν Ἀντύλλου ἐκ τοῦ α' λόγου τοῦ περὶ βοηθημάτων vgl. 380, 6).

Τῶν δὲ αὐτοφυῶν λουτρῶν πολὺ ἢ δυνάμεις ἐστὶν ἰσχυροτέρα καὶ δραστικωτέρα τῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως· εἰσὶ δὲ διαφοραὶ πλείους παρὰ τὴν τῆς γῆς ποιότητα, διὰ ἧς φέρεται· τὰ μὲν γάρ ἐστι νιτρώδη, τὰ δὲ ἄλμυρά, τὰ δὲ στυπτηριώδη, τὰ δὲ θειώδη, τὰ δὲ ἀσφαλιώδη, τὰ δὲ χαλκανθώδη, τὰ δὲ σιδηρίζοντα, τὰ δὲ σύνθετα ἐκ τούτων, πλειόνων ποιότητων ὁμοῦ συμμιγνυμένων. Πάντων μὲν οὖν αὐτοφυῶν ὑδάτων ἡ δυνάμεις ἐστὶ ξηραντικὴ καὶ θερμαντικὴ, τὸ ἐπίπαν σφόδρα εὐτόνων ὑπαρχόντων· διὸ δὴ καὶ τοῖς ὀξέσι νοσήμασιν οὐχ ἀρμόζει, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς χρονίοις, καὶ τούτων μάλιστα τοῖς καθύγροις καὶ ψυχροῖς. Ἦδη δὲ τὰ μὲν νιτρώδη καὶ ἄλλας ἔχοντα κεφαλῇ κατάλληλα καὶ θώρακι ρευματιζομένῳ καὶ στομάχῳ καθύγρῳ καὶ ὑδρωπικοῖς, οἰδήμασί τε τοῖς ἐκ νόσων καὶ συγκρίσει φλέγματος γεννητικῇ· τὰ δὲ στυπτηριώδη αἵματός τε ἀναγωγαῖς

Aet. III 167:

Περὶ λουτρῶν αὐτοφυῶν.
Ἀρχιγένους.

Τῶν δ' αὐτοφυῶν λουτρῶν τὰ μὲν ἐστὶ νιτρώδη, τὰ δὲ ἄλμυρά, τὰ δὲ στυπτηριώδη, τὰ δὲ θειώδη¹⁾, τὰ δὲ ἀσφαλιώδη, τὰ δὲ σιδηρίζοντα, τὰ δὲ χαλκοῦ ἔχει²⁾ ποιότητα³⁾, τὰ δὲ σύνθετα ἐκ τούτων ἐστί. Τῶν τοιούτων δὲ πάντων ἡ⁴⁾ δυνάμεις ἐστὶ ξηραντικὴ, τινὰ δ' αὐτῶν σὺν τῷ ξηραίνειν⁵⁾ καὶ θερμαίνει γενναίως, τινὰ δὲ σὺν τῷ ξηραίνειν⁶⁾ στύφει καθάπερ τὰ στυπτηριώδη, ἐκ μέρους δὲ καὶ τὰ ἄλμυρά καὶ τὰ χαλκοῦ ποιότητα κεκτημένα. Ἀρμόδια δ' ἐστὶ πάντα τοῖς ὑγροῖς καὶ ψυχροῖς παρὰ φύσιν σώμασι καὶ νοσήμασι τοιούτοις χρονίζουσι· διὰ ταῦτα κατάλληλα ἀρθρίτιδι, ποδάγρῳ, παρέσεσι, νεφρίτιδι, ἀσθματικοῖς, κατάγμασι πυρώσεως⁷⁾ δεομένοις, ἔλκεσι ρευ-

¹⁾ τὰ δὲ θειώδη, τὰ δὲ ἀσφαλιώδη W. P.: τὰ δὲ ἄ. τὰ δὲ θ. ed. ²⁾ ἔχοντα W. ἔχει P. ed. ³⁾ ποιότητος W. ⁴⁾ ἡ fehlt in W. ed. ⁵⁾ ξηραίνει W. ⁶⁾ ξηρ. καὶ στύφει ed. ⁷⁾ πυρώσεως ed.

καὶ ἐμετικῶ στομάχῳ καὶ τοῖς ἀμέτρως ὑπὸ αἰμορροΐδων ἐνοχλουμένοις καὶ γυναιξὶν ἀτάκτως καθαιρομέναις καὶ συνεχῶς ἐκτιτρωσκούσαις. Τὰ θειώδη δὲ νεύρων μαλακτικὰ καὶ συγκρίσεως θερμαντικὰ καὶ πόνων παρηγορικά· στόμαχον δὲ θηλύνει καὶ ἀνατρέπει. Τὰ δὲ ἀσφαλτώδη κεφαλὴν τε συμπληροῖ καὶ τὰ αἰσθητήρια κακοῖ· θερμαίνει δὲ ἐμμόνως καὶ μαλάσσει σὺν χρόνῳ, μάλιστα τὰ περὶ ὑστέρα καὶ κύστιν καὶ κῶλον. Τὰ δὲ χαλκανθίζοντα στόματι καὶ παρισθμίοις καὶ σταφυλῇ καὶ ὄμμασι διαφερόντως ἐπιτήδεια. Τὰ δὲ σιδήρου ποιότητος μετέχοντα στομάχῳ καὶ σπληνὶ πεπονθόσι δύναται χρησιμεύειν. Τὰ δὲ μικτῆς ὄντα ποιότητος κατὰ τὴν ἐπικράτειαν τῶν μεμιγμένων ἐνεργεῖ. Δεῖ δὲ καθεστῶσι τοῖς αὐτοφυέσιν ὕδασι καὶ ἀτρεμοῦσι χρῆσθαι· . . . διὰ τοῦτο καὶ τὰς ἐμβάσεις τὰς εἰς τὸ ὕδωρ χρῆ ποιεῖσθαι κατιόντας ἀθορύβως, ὅπως ἡ δύναμις ἀνειμένῳ τῷ σώματι προσιοῦσα ἐγκαταδύσαιο· τῶν δὲ σεσοβημένως καὶ ταραχῶδως ἐμβαινόντων εἰς αὐτὰ πυκνούμενον τὸ σῶμα οὐκ εἰσδέχεται παρὰ τοῦ ὕδατος ποιότητα . . . Ὑπερέχειν δὲ κρουνοῖς αὐτοφυῶν ὑδάτων ἐκείνοις χρῆ μόνοις, ὅσοις ποιότητές εἰσιν ἀμόδιοι τῇ κεφαλῇ, ὥς ὅσοι τοῖς ἀπὸ ἀσφάλτου ἢ θείου ῥέουσι κρουνοῖς παρέχοντες ἑαυτοὺς εὐκόλως κακοῦνται.

ματικοῖς, φλεγμοναῖς χρονιζούσαις καὶ ἤδη σκληρυνόμεναις¹⁾. Ἦδη δὲ τὰ μὲν νιτρώδη καὶ ἄλμώδη κεφαλῇ κατάλληλα καὶ θώρακι²⁾ ῥευματιζομένῳ καὶ στομάχῳ καθύγρῳ³⁾ καὶ ὑδρωπικοῖς καὶ οἰδήμασι πᾶσι⁴⁾. Τὰ δὲ στυπτηριώδη αἵματος ἀναγωγαῖς, ἐμετικῶ στομάχῳ καὶ τοῖς ἀμέτρως ὑπὸ αἰμορροΐδων ἐκκενουμένοις⁵⁾ καὶ γυναιξὶν ἀτάκτως καθαιρομέναις⁶⁾ καὶ ταῖς χωρὶς φανεραῖς προφάσεως συνεχῶς ἐκτιτρωσκούσαις. Ὀνίνησι δὲ καὶ τοὺς ὑπὲρ τὸ δέον ἰδρουῦντας καὶ τοὺς βραδυπεπτοῦντας καὶ τὰ ἐν κνήμας οἰδήματα καὶ⁷⁾ κίρσοις σύμφορα. Τὰ δὲ θειώδη νεύρων τε⁸⁾ μαλακτικὰ καὶ τῶν τεινεσμωνδῶν πόνων παρηγορητικά· στόμαχον⁹⁾ δὲ ἐκλύει καὶ ἀνατρέπει· κενοῖ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ διὰ τοῦτο βοηθεῖ ἀλφοῖς¹⁰⁾ λεύκαις, <λέπραις, ψώραις>¹¹⁾, λειχήσι, ἔλκεσι¹²⁾ πολυχρονίοις, ἄρθρων ῥεύμασι, σπληνὶ σκιρῶδῶδει καὶ¹³⁾ ἥπατι καὶ ὑστέρα παρειμένοις¹⁴⁾ καὶ ἰσχιαδικοῖς καὶ κνησμοναῖς. Τὰ δὲ ἀσφαλτώδη κεφαλὴν συμπληροῖ καὶ τὰ αἰσθητήρια κακοῖ· θερμαίνει δὲ ἐμμόνως καὶ μαλάσσει σὺν χρόνῳ, μάλιστα τὰ περὶ τὴν ὑστέρα καὶ κύστιν καὶ κῶλον. Τὰ δὲ χαλκοῦ ποιότητα ἔχοντα στόματι καὶ παρισθμίοις καὶ σταφυλῇ καὶ ὄμμασι

1) σκληρυνόμεναις ed. 2) θώρακα ed. 3) καθύδω ed. 4) πᾶσι am Rande von W. von anderer Hand nachgetragen. 5) κενουμένοις ed. 6) In ed. interpoliert ἢ ὑπερκαθαιρομέναις. 7) καὶ fehlt in W. ed. 8) τέ ἐστι P. 9) καὶ στόμαχον δέ W. P. 10) ἀδελφοῖς ed. 11) fehlt in W. P. 12) καί ed. 13) καί W. P. 14) παρειμέναις ed.

διαφερόντως επιτήδεια. Τὰ δὲ σιδηροί-
ζοντα στομάχῳ καὶ σπληνὶ καταλλη-
λότατα¹⁾. τὰ δὲ μικτῆς²⁾ ὄντα ποιό-
τητος κατὰ τὴν ἐπικράτειαν τῶν
μεμιγμένων ἐνεργεῖ. Δεῖ δ' ὅτι μά-
λιστα τὰς εἰς³⁾ αὐτοφυῆ θερμὰ ὕδατα
ἐμβάσεις ἀθυρήβως ποιῆσθαι, ὅπως
ἡ δύναμις ἀνειμένῳ⁴⁾ τῷ σώματι
προσπίπτουσα ἐγκαταδύσαιο· τῶν
γὰρ ταραχωδῶς ἐμβαινόντων πυκνοῦ-
ται τὸ σῶμα φρίττον, καὶ οὐκ εἰς-
δέχεται τὴν ἀπὸ τοῦ ὕδατος ποιότητα.
Τοῖς δ' ἀσφαλτώδεσι καὶ⁵⁾ θειώδεσι
κρουνοῖς⁶⁾ τῶν ὑδάτων οὐ δεῖ ὑπο-
τιθέναι τὰς κεφαλὰς· εὐχερῶς⁷⁾ γὰρ
κακοῦται.

¹⁾ καταλληλότερα W. ²⁾ μικτῆς γὰρ
ὄντα W. ed. ³⁾ εἰς τό P.: εἰς τὰς
ed. ⁴⁾ ἀνιεμένῳ ed. ⁵⁾ καὶ θ. fehlt
in W. P. „Ceterum bituminosis et sul-
phurulentis“ Corn. ⁶⁾ κρουνοῖς P.
⁷⁾ εὐμαρῶς ed.

Ich habe beide Stellen ausführlich ausgeschrieben, um einmal an einem charakteristischen Beispiel die Unabhängigkeit des Aetius von Oribasius darzuthun: die Quelle des Aetius war vermutlich die Compilation des Philagrius. Will man nun seinen Quellenschriftsteller nicht geradezu zum Fälscher stempeln, der auf Archigenes übertrug, was dem Antyll gehörte, so muß man annehmen, daß er die betreffende Partie im Archigenes las oder wenigstens unter dem Namen des Archigenes vorfand. Der Einwand, daß die Autorenbeischrift bei Aetius gefälscht sein könne, erledigt sich durch den einfachen Verweis auf die zweifellose Thatsache, die ich hiermit ein für allemal constatiert haben will, daß die Quellenbeischriften in der späteren medicinischen Litteratur im Gegensatz zu denen der Geoponici, die bekanntlich zu einer traurigen Berühmtheit gelangt sind, in den kontrollierbaren Fällen durchaus glaubwürdig sind. Ich halte demnach die Schlussfolgerung für unabweislich, daß Antyll seine Darstellung von den Mineralwassern aus Archigenes geschöpft hat.

Die zweite ebenso beweiskräftige Stelle ist das Excerpt des Oribasius (II 287. 289) aus Antyll über die verschiedene Mischung der Luft in den einzelnen Tages- und Jahreszeiten. Der gleiche Bericht ist bei Aet. III 162 zu lesen mit der einzigen Abweichung, daß bei ihm Athenaios als Quelle figuriert:

Orib. 287, 9¹⁾.

Περὶ τῆς κατὰ μῆνα τῶν ἀέρων διαφορᾶς. Ἐκ τῶν Ἀντύλλου· ἐκ τοῦ α' λόγου τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων.

Ἐργάζεται δὲ διαφορὰς ἐν τῷ ἀέρι παραπλησίως τῷ ἡλίῳ καὶ ἡ σελήνῃ, περιουῖσα τὸν τῶν ζωδίων κύκλον· ἐργάζεται δὲ καὶ αὕτη τέσσαρας ὥρας μηνιαίας ἀναλογούσας ταῖς ἐτησίαις, ἑβδομαδικῶ δὲ ἀριθμῶ περικυκλωμένας. Ἡ μὲν οὖν πρώτη τοῦ μηνὸς ἑβδομάς ἀρχὴν μὲν ἀπὸ νομηνίας ἔχει, πρόεισι δὲ μέχρι διχοτόμου· ἔστι δὲ ἔαρι ξοικυῖα· ὑγρὰ γὰρ καὶ θερμή... ἡ δὲ δευτέρα ἑβδομάς ἀρχεται μὲν ἀπὸ διχοτόμου, πρόεισι δὲ μέχρι πανσελήνου· θέρει δὲ παραπλήσιος διὰ τοῦτο, ὅτι καρποὺς πέσσει μάλιστα. Ἡ γὰρ μὲν μετὰ πανσέληνον ἑβδομάς μέχρι διχοτόμου φθινοῦσης τῆς σελήνης ξηρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ μετοπώρῳ παραπλήσιος. Ἡ δὲ τελευταία χειμῶνι ἔοικεν.

II 289, 4: Περὶ τῆς κατὰ ἡμέραν διαφορᾶς τῶν ἀέρων. Τοῦ αὐτοῦ· ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου. Vgl. Stob. Flor. CI 15.

Τὴν ἡμέραν λαμβάνομεν μετὰ τῆς νυκτός· ἀναλογίαν δὲ καὶ ταύτην φανερὸν ἔχειν πρὸς τὸν ἐνιαυτόν. Ἔστι δὲ ὁ μὲν ὀρθρος ὑγρὸς καὶ θερμὸς, ἔαρι παραπλήσιος· διὰ τοῦτο οἱ τε ὕπνοι εὐκρινεῖς καὶ τὰ σώματα ἀνεῖται καὶ τὰ τῶν ὑγιαίνοντων καὶ τὰ τῶν νοσούντων, ὥστε καὶ τοῖς πυρέσσουσιν εὐφορώτατον εἶναι τὸνδε

Aet.

Περὶ ἀέρων Γαληνοῦ

ἐκ τῶν Ἀθηναίου· ἐν¹⁾ μὲν οὖν τῇ ξαρινῇ ὥρᾳ ὑγρὸς καὶ θερμὸς ὁ²⁾ ἀήρ, ἐν δὲ τῇ θερυνῇ θερμὸς καὶ ξηρὸς³⁾, ἐν δὲ τῇ φθινοπωρινῇ ψυχρὸς καὶ ξηρὸς, ἐν δὲ τῇ χειμερινῇ ὑγρὸς καὶ ψυχρὸς. Πάλιν δ' ἐν ἐκάστη τῶν ὥρῶν τρεῖς διαφοραὶ γίνονται, πρώτη καὶ μέση καὶ ὑστίατη. Τὰ μὲν οὖν μέσα τὴν εἰλικρινεστάτην τῆς ὥρας ἔχει κρατῶσιν· τὰ δὲ πρώτα καὶ ὑστάτα τῇ γειτνιώσῃ ὥρᾳ ἀφομοιοῦνται. Καὶ ἡ σελήνη δὲ κατὰ μῆνα ἐργάζεται διαφορὰς τέσσαρας ἐν τῷ ἀέρι. Ἡ μὲν οὖν πρώτη ἑβδομάς ἀπὸ νομηνίας μέχρι τῆς ἑβδόμης παρέοικε⁴⁾ τῷ ἔαρι, ὑγρὰ καὶ θερμή οὖσα· ἡ δὲ δευτέρα ἑβδομάς μέχρι πανσελήνου θέρει παραπλήσιος· ἡ δὲ τρίτη ἑβδομάς φθινοῦσης σελήνης ψυχρὰ καὶ ξηρὰ· ἡ δὲ τετάρτη καὶ τελευταία ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ. καὶ⁵⁾ καθ' ἐκάστην δὲ ἡμέραν διαφοραὶ τοῦ ἀέρος γίνονται. ὁ μὲν γὰρ ὀρθρος ὑγρὸς καὶ θερμὸς ὡς τὸ ἔαρ· διὰ τοῦτο καὶ τὰ σώματα ἀνίεται καὶ τῶν ὑγιαίνοντων καὶ τῶν νοσούντων, ὥστε καὶ τοῖς πυρέσσουσιν ὁ καιρὸς οὗτος εὐφορώτατος. Τὰ δὲ μέσα τῆς ἡμέρας θέρει παρείκασται, τὰ δὲ⁶⁾

¹⁾ Vgl. Stob. Floril. CI 30.

Philolog. Untersuchungen. XIV.

¹⁾ ὁ μὲν οὖν ἐν τῇ P. καὶ ἐν μὲν ed. ²⁾ fehlt in P. ³⁾ ξηρὸς καὶ θερμὸς ed.: θερμὸς καὶ ξηρὸς W. P. ⁴⁾ παρείοικε W. P.: παρέοικε ed. ⁵⁾ καθ' ἐκάστην δὲ W. P. ⁶⁾ κατὰ δὲ τὴν δέλην W. P.

τὸν καιρόν Τὰ δὲ μέσα τῆς
 ἡμέρας θέρει παρείκασται, τὰ δὲ
 κατὰ τὴν δειλὴν φθινοπώρῳ. Τῆς
 δὲ νυκτὸς τὰ μὲν πρῶτα καὶ περὶ
 τὴν ἑσπέραν ὅμοια τῇ δειλῇ . . . τὰ
 δὲ μέσα τῆς νυκτὸς χειμῶνι ἐξεί-
 κασται τὰ δὲ τελευταῖα τῆς
 νυκτὸς διὰ τὴν πρὸς τὸν ὀρθρον
 γειτνίασιν τῆς αὐτῆς κράσεως ἐκείνῳ
 μεταλαμβάνει.

κατὰ τὴν δειλὴν φθινοπώρῳ, τὰ δὲ
 περὶ ἑσπέραν χειμῶνι. Καὶ τῆς
 νυκτὸς δὲ τὰ πρῶτα φθινοπώρῳ πα-
 ρείκασται, τὰ δὲ μέσα χειμῶνι¹⁾ καὶ
 τὰ ἄλλα ἀκολουθῶς.

¹⁾ παρέοικε P.

V. Rose¹⁾ hat allerdings die Überschrift bei Aetius: *ἐκ τῶν Ἀθηναίου* nur auf die unmittelbar folgenden Worte d. h. auf die hier vorgetragene Theorie der Qualitätenmischung der einzelnen Jahreszeiten bezogen. Dagegen spricht aber die Citierweise des Aetius und vor allem der Umstand, daß das Excerpt inhaltlich zu der Lehre des Athenaios vortrefflich paßt²⁾.

Die beiden von uns für die Quelle postulierten Charakteristika: Zugehörigkeit zur pneumatischen Schule und compilerische Art der Darstellung passen also auf Antyll. Ich halte mich danach für berechtigt, die dem Galen und Oribasius gemeinschaftlichen Parteen dieser Quelle zuzuweisen. Ob aber Oribasius den Antyll selbst benützt hat oder ihn bereits in seiner Quelle verarbeitet vorfand, vermag ich mit dem mir zu Gebote stehenden Material nicht zu entscheiden.

Im Anschluß an dies Resultat fasse ich kurz zusammen, was wir von Antyll wissen. Er war Pneumatiker und lebte in der Mitte des zweiten Jahrhunderts. In Cramers Anecd. gr. IV 196 wird er unter den berühmtesten Ärzten aufgeführt. Seine Verdienste liegen auf dem Gebiet der Diätetik und Chirurgie. Seine Hauptschrift *περὶ βοηθημάτων* bestand aus vier Büchern, von denen das erste *περὶ τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων βοηθημάτων*³⁾, das zweite *περὶ τῶν κενουμένων βοηθημάτων*⁴⁾, das dritte *περὶ τῶν προσφερομένων*⁵⁾ und das vierte *περὶ τῶν ποιουμένων βοηθημάτων*⁶⁾ handelte. Sein chirurgisches Werk, das ebenfalls eine Compilation

¹⁾ Rose a. a. O. 22 Anm.

³⁾ Orib. II 287.

⁵⁾ Orib. I 300.

²⁾ Vgl. Orib. II 291 f.

⁴⁾ Orib. II 38 f.

⁶⁾ Orib. I 436 vgl. S. 15 A. 7.

war¹⁾, führte nach dem Vorbilde seines Vorgängers Heliodor den Titel *χειρουργούμενα*²⁾ und bestand vermutlich aus zwei Büchern³⁾.

Antyll gehörte zusammen mit Leonidas, Heliodor, Archigenes zu den bedeutendsten Vertretern der Chirurgie, die in der pneumatischen Schule ihre letzte Blüte erlebte. Die pneumatischen Chirurgen sind gewissermaßen die letzten Glieder einer längeren Entwicklungskette, deren Anfänge nach Alexandria weisen. Von chirurgischen Versuchen aus dem Anfang der hellenistischen Zeit, wo in Alexandria die beiden Schulen des Herophilos und Erasistratos blühten, erfahren wir nichts. Die großen Verdienste dieser beiden bedeutenden Ärzte liegen auf andern Gebieten, vornehmlich auf dem der Anatomie. Die anatomischen Anschauungen des Herophilos, die er in seiner *ἀνατομή*⁴⁾ und in einer Specialschrift *περὶ ὀφθαλμῶν*⁵⁾ niedergelegt hat, beherrschen die medicinische Wissenschaft bis in die späteste Zeit, wogegen die Verdienste seines großen Nebenbuhlers Erasistratos, der ebenfalls eine Anatomie⁶⁾ verfasste, zurücktraten. Erst im 2. und besonders im 1. Jh. v. Chr. beginnen die großen Erfolge alexandrinischer und römischer Chirurgen. Sie wagten sich an die schwierigsten Operationen, an die Behandlung des Steinschnitts und der Embryotomie, an die Operation der verschiedenen Arten von Augenleiden und der Knochenkrankheiten. Celsus entwirft uns in

¹⁾ Vgl. schol. Orib. IV 527, 25 ff. IV 463: *περὶ ὑποσπασμάτων. ἐκ τῶν Ἀντύλλου καὶ Ἠλιοδώρου.* Vgl. Orib. III 570, 615. Aufser Heliodor ist Leonidas von ihm benützt: vgl. Orib. III 631, 2f. mit schol. Orib. III 688, 14f. und Paul. Aeg. VI 78, 322.

²⁾ Schol. Orib. IV 540, 14 und öfter.

³⁾ Im 1. Buche handelt er unter anderm über folgende Gegenstände: *περὶ πύρου* (Orib. IV 11, 3 = schol. 527, 10), *περὶ ἀποστημάτων* (III 570, 11 = schol. 685, 17), *περὶ συρίγγων* (III 611, 9 = schol. 687, 17. 688, 7), *περὶ στεατωμάτων* (IV 3, 11 = schol. 526, 2), *περὶ μελικηρίδων καὶ ἀθηρωμάτων* (IV 7, 7 = 526, 10), *περὶ ἀγκυλίου* (IV 22, 1 = 527, 21), *περὶ ἀγκυλογλώσσου* (IV 25, 6 = 527, 23), *περὶ χοιράδων* (IV 27, 9 = 528, 4), *περὶ ἀνευρύσματος* (IV 52, 9 = 529, 1), *περὶ κολοβωμάτων* (IV 56, 3 = 529, 3), *περὶ τῶν ἐν ῥισὶ καὶ ὡσὶ κολοβωμάτων* (IV 58, 1 = 529, 4). Aus dem 2. Buche sind folgende Capitellüberschriften erhalten: *περὶ λιποδέρων* (IV 460, 10 = 540, 12), *περὶ ὑποσπασμάτων* (IV 463, 13 = 540, 14), *περὶ φριμώσεως* (IV 466, 5 = 540, 18), *περὶ προσφυοῦς πύσης* (IV 469), *περὶ τῶν περιτεμνομένων, περὶ θύμων τῶν ἐν αἰδοίοις* (IV 469 f.).

⁴⁾ Gal. II 571 u. öfter.

⁵⁾ Aetius VII 46.

⁶⁾ Gal. IV 718. Cael. Aur. A. M. III, 4.

den letzten beiden Büchern seiner Encyclopädie der Arzneiwissenschaft ein anschauliches Bild von der Thätigkeit dieser Chirurgen und nennt als die bedeutendsten Vertreter dieses Zweiges der Medicin den Philoxenos, Gorgias, Sostratos, Heron, Ammonios aus Alexandria, Apollonios von Kition, Apollonios Mys, Tryphon, Euelpistos und Meges. Das Erbe dieser Männer hat dann die pneumatische Schule angetreten; die bedeutenden Erfindungen derselben wurden von den pneumatischen Chirurgen mit unwesentlichen Veränderungen herübergenommen und um neue bereichert. So bildet die pneumatische Schule das Bindeglied zwischen der alten Zeit und den späteren Jahrhunderten: aus ihren Schriften hat sich die alexandrinische Doctrin herübergerettet in die Schriften des Oribasius, Aetius und Paulus von Aegina. Wer nur einen Blick in die chirurgischen Partien dieser Compileren wirft, dem wird der enge Zusammenhang auffallen, der zwischen ihren Theorien und denen jener Alexandriner besteht. Sucht man nach einer Erklärung für diese Erscheinung, so ist der nächstliegende Gedanke, daß schon in der Zeit vor Celsus das gesamte chirurgische Wissen von einem Arzt zusammengefaßt ist und daß diese Schrift grundlegend geworden ist für die Folgezeit. An eine Benützung des Celsus seitens der Späteren wird kein Verständiger glauben wollen.

Die häufige Übereinstimmung des Celsus mit der Chirurgie des Paulus von Aegina (B. VI) ist natürlich von dem verdienstvollen Herausgeber des Celsus, Ch. Daremberg, nicht übersehen, aber keineswegs in ihrem vollen Umfang gewürdigt worden. Zur endgültigen Lösung dieses Problems ist außer Paulus Aegineta die parallele Überlieferung, die in der Compilation des Aetius vorliegt, heranzuziehen.

In der Beschreibung der Erkrankungen des Auges und der Darstellung der verschiedenen Arten ihrer Behandlung finden sich durchgängig Übereinstimmungen zwischen Celsus und Paulus Aegineta. Über die *ὀδαρίς*, eine Art Fettblase im oberen Augenlide, die einen anhaltenden Schleimausfluß aus dem Auge veranlaßt und sich meist bei Kindern findet, sowie über die Operation derselben, die in einem seichten Querschnitt in die Haut besteht, um die Blase zum Austritt zu bringen, berichten beide im Wesentlichen gleichmäfsig¹⁾.

¹⁾ Cels. VII 7, 1. Paul. Aeg. VI 14. Vgl. die Abhandlung über Augenkrankheiten herausg. von Th. Puschmann. Berl. Stud. für klass. Philol. Bd. V Heft 2 S. 144. Ps.-Galen XIX def. 364 p. 438, 17.

Bei der Behandlung des Hagelkorns (*χαλάζιον*) empfehlen beide dasselbe Verfahren, indem sie es, wenn es unmittelbar unter der Haut sitzt, von außen, wenn es sich dagegen unter dem Knorpel befindet, von innen mit dem Messer einschneiden und von den gesunden Teilen loslösen¹⁾. Vom Flügelfell (*πτερόγιον*) geben beide dieselbe Beschreibung; auch über die Art der Behandlung berichten sie übereinstimmend und mahnen zur Vorsicht bei dem chirurgischen Eingriff, weil die Gefahr besteht, daß die Thränenkarunkel am inneren Augenwinkel mit abgetragen wird, was eine neue Erkrankung des Auges, die *δυσάς*, zur Folge habe²⁾. Die Behandlungsweise der *ἐγκανθίς*, einer Geschwulst am inneren Augenwinkel, wird von Paulus³⁾ nur kurz angedeutet. Die ausführlichere Beschreibung derselben bei Aetius⁴⁾ berührt sich mit Celsus⁵⁾ sehr nahe. Dieselbe Berührung zwischen Celsus und Aetius ist in der Beschreibung der Operation der Thränenfistel nachweisbar⁶⁾.

Beweisend ist wieder die Übereinstimmung der Capitel, welche von der Operation der *τριχιάσις* handeln. Die Alten verstanden darunter eine Augenkrankheit, bei der Haare auf den Augenlidrändern nachwachsen und dadurch, daß sie nach innen gegen das Auge gekehrt sind, das Sehvermögen beeinträchtigen. Die antike Medizin kannte verschiedene Heilmethoden, von denen Celsus⁷⁾ drei anführt. Die Darstellung der beiden ersten stimmt in der Hauptsache mit Paulus⁸⁾, bei dem sie die technische Bezeichnung *διὰ ἀναβροχισμοῦ* und *διὰ σιδήρου καύσεως* führen.

In der Darstellung des chirurgischen Eingriffs bei dem Hasenauge (*λαγώφθαλμος*)⁹⁾ ist Celsus reichhaltiger als Paulus¹⁰⁾. Die Beschreibung der von Celsus vorgeschlagenen Operation, die in einem

¹⁾ Cels. VII 7, 3. Paul. Aeg. VI 16. Vgl. Aet. VII 93. Puschmann a. a. O. S. 146. Ps.-Galen XIX def. 354 p. 437, 7.

²⁾ Cels. VII 7, 4. Paul. Aeg. VI 18. Vgl. Aet. VII 60f. Puschmann a. a. O. S. 142. Ps.-Gal. XIX def. 366 p. 439, 5.

³⁾ Paul. Aeg. VI 17.

⁴⁾ Aet. VII 63. 64.

⁵⁾ Cels. VII 7, 5. Puschmann S. 148. Ps.-Gal. def. 361 p. 438, 5.

⁶⁾ Cels. VII 7, 7. Aet. VII 85 (aus Severus) Paul. Aeg. VI 22.

⁷⁾ Cels. VII 7, 8.

⁸⁾ Paulus VI 13.

⁹⁾ Cels. VII 7, 9. Vgl. Puschmann S. 146. Ps.-Gal. def. 365 p. 439, 3.

¹⁰⁾ Paul. VI 10.

halbmondförmigen Einschnitt in die Haut besteht, stimmt wieder im Wesentlichen mit Aetius¹⁾.

Eingehend wird von Celsus²⁾ die Extraction der toten Frucht aus der Gebärmutter behandelt. Das entsprechende Capitel des Paulus³⁾ stammt nach Aetius⁴⁾ aus Philumenos-Soran⁵⁾. Die Übereinstimmungen mögen hier kurz angedeutet werden. Die Gebärende muß bei dieser Operation rücklings auf das Bett mit dem Kopf nach unten gelegt und ihr Unterleib mit den Schenkeln zusammengeedrückt werden:

Cels. VII 29 p. 317, 4:	Soran II 19 p. 363 R.	Paul. VI 74: κατακλιθείσης	Aet. XVI 23: περὶ ἐμβρυουλκίας καὶ ἐμβρυοτομίας· Φιλουμένου.
<i>Oportet autem ante omnia re-supinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut feminibus eius ipsius ilia comprimantur ...</i>	〈δεῖ τοίνυν ἐπὶ κλίνης〉 πᾶσαν σχηματίζειν καταφερώς . . . καὶ συνηγμένων πρὸς τὸ ἐπιγάστριον τῶν ποδῶν ἐπὶ τοῦ ἐνηλάτου στηρίζειν, εἴτα ἐκατέρωθεν δι' ὑπηρετῶν τὸ σῶμα κατέχειν ἢ γυναικῶν ἐμπείρων καὶ ἰσχυρῶν.	τοίνυν ἐπὶ κλίνης ὑπτίας τῆς γυναικὸς καὶ μᾶλλον καταρρόπου, τὰ σκέλη ἐπηρμένα διακρατεῖτωσαν ἐκατέρωθεν γυναικες ἢ ὑπηρέται τινές . . .	. . . κατακλινέσθω τοίνυν ἐπὶ τῆς κλίνης ὑπτία καὶ μᾶλλον κατάρροπος, τὰ δὲ σκέλη αὐτῆς ἐπηρμένα καὶ διεσπαστά ἀπ' ἀλλήλων καὶ ὑποκεκαμμένα διακρατεῖτωσαν γυναικες ἐμπειροὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκατέρωθεν . . .

Der Arzt führt die Finger der linken Hand, nachdem er sie gesalbt, in den Muttermund ein und bringt bei Quer-, Steifs- oder Schulterlage die Frucht in eine gerade Richtung:

Cels. 317, 9:	Sor. 363, 15:	Paul. a. a. O.:
<i>Hac occasione usus (d. h. wenn der Muttermund geöffnet ist) medicus unctae manus (der linken; es folgt aus den folgenden Worten: trahere autem</i>	<i>τὴν εὐώνυμον χεῖρα . . . συνηγμένων κατὰ κορυφὰς εἰς μύουρον τῶν δακτύλων καὶ λελιπασμένων καθιέναι, δι-</i>	<i>τὴν εὐώνυμον χεῖρα συνηγμένην μετ' εὐρώστων δακτύλων λελιπασμένην καθιέναι πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρας καὶ διευρύνειν αὐτὸ, ἐλαιοχυ-</i>

¹⁾ Aet. VII 73 (aus Demosthenes).

²⁾ Cels. VII 29.

⁴⁾ Aet. XVI 23.

³⁾ Paul. VI 74.

⁵⁾ Soran ed. Rose p. 362 ff.

dextra manus uncum; sinistra intus posita infantem ipsum) indicem digitum primum debet inserere atque ibi continere, donec iterum id os aperiat, rursusque alterum digitum demittere et per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. . . . Medici vero propositum est, ut eum manu dirigat vel in caput vel etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius reddit . . .

ὑστέρας· εἰ δὲ μὴ, θλίψει καὶ συνεχέσιν ἔλαιον χυτήσεσι προαναχαλασθέντος. ἔπειτα πειρᾶσθαι τὸ παρεγκεκλικὸς εἰ δυνατόν ἀπευθύνειν καὶ ζητεῖν τόπον εἰς κατάπαρσιν ἔμβρουλου πρὸς τὸ μὴ ἐκπεσεῖν ὁρδίως.

τούμενον δὲ τοῦτο προσαναχαλᾶν καὶ ζητεῖν, ποῦ καταπαρτέον τὸν ἔμβρουλον.

Hat der Arzt die Zange angelegt, so zieht er mit der rechten Hand, die linke dient zur Leitung der Frucht in der Gebärmutter. Ist die Frucht von Wasser aufgetrieben, so muß er sie mit dem Zeigefinger durchbohren, damit sie nach Abfluß des Wassers zusammenfällt. Gefährlich ist es, wenn die Spitze des Hakens abgleitet und in den Muttermund gelangt:

Cels. 318, 1:

Trahere autem dextra manus uncum; sinistra intus posita infantem ipsum, simulque dirigere eum debet. Solet etiam evenire, ut is infans humore distendatur ex quo eo profluat foedi odoris sanies. Quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur.

p. 317, 34: *Nam, si compresso vulvae ore id tentatum est, non emittente eo, infans abrumpitur et*

Sor. 364, 12:

θερμῷ δὲ ἔλαιῳ προκεχλιασμένον τὸν ἔμβρουλον τῇ δεξιᾷ χειρὶ κατέχειν, τὴν καμπὴν δὲ αὐτοῦ τοῖς δακτύλοις ἐγκρούσαντα τῇ εὐωνύμῳ χειρὶ πρῶως συνεισφέρειν καὶ καταπείρειν εἰς τινὰ τόπον ἄχρι κενεμβατήσεως ὡς εἰρήκαμεν. καταπείρειν δὲ καὶ ἀντίθετον τοῦτω δεύτερον, ὅπως ἰσόρροπος καὶ μὴ ἐτεροκλινὴς ὁ ἐπισπασμὸς ἐπιτελῆται καὶ διὰ τοῦτο τοῦ μέρους παρεγκλίνον-

Paul. 302:

Ἐπειτα τὸν ἔμβρουλον τῇ δεξιᾷ χειρὶ κατέχειν· τὴν καμπὴν δὲ αὐτοῦ τοῖς δακτύλοις ἐγκρούσαντα τῇ εὐωνύμῳ χειρὶ πρῶως συνεισφέρειν καὶ καταπείρειν ἐν τινὶ τῶν εἰρημένων τόπων ἄχρι κενεμβατήσεως· καὶ ἀντίθετον τοῦτω δεύτερον, ὅπως ἰσόρροπος καὶ μὴ ἐτεροκλινὴς ὁ ἐπισπασμὸς ἐπιτελοῖτο.

Ist der Embryo von Wasser aufgetrieben, so empfiehlt Paulus (304 ff.)

*unci acumen in ipsum os
vulvae delabitur; sequitur-
que nervorum distentio et
ingens periculum mortis.*

τος σφήνωσιν ὑπομένη
τὸ ἔμβρυον.

366, 7: ... εἰ μὲν
ὑγροκέφαλον εἴη τὸ βρέ-
φος, διαιρεῖν, ἵνα τοῦ
ὑγροῦ κενωθέντος ἡ
περιοχὴ συμπέσῃ τῆς
κεφαλῆς ...

367, 3: εἰ δὲ μὴδ' οὕ-
τως ὑπείκοι, τὸ ἐπι-
γάστριον διαρῶν, ὥσ-
αύτως καὶ ὑδρωπικὸν ἢ
τὸ ἔμβρυον. κενωθέντος
γὰρ τοῦ ὑγροῦ συμπίπτει
πρὸς ἰσχνωσιν ἡ περιοχὴ
τοῦ σώματος.

dasselbe Verfahren, mag
der Kopf oder die Brust
oder der Unterleib wasser-
haltig sein.

Bei der Fußlage wird die Frucht leicht nach aufsen befördert. Wenn bei der Querlage die Wendung der Frucht auf den Kopf oder die Füße nicht vorgenommen werden kann, so muß sie zerstückelt werden, wobei man darauf zu achten hat, daß der Kopf zuerst nach aufsen befördert wird, da er sonst leicht in die leere Gebärmutter zurückfällt.

Cel. 318, 8:

*In pedes quoque conver-
sus infans non difficulter
extrahitur; quibus appre-
hensis per ipsas manus
commode educitur.*

318, 15: *Tum id agen-
dum est, ut ante caput,
deinde reliqua pars aufe-
ratur: quia fere, maiore
parte extracta, caput in
vacuam vulvam prolabitur
extrahique sine summo
periculo non potest.*

Sor. 368, 3:

Πολλάκις δὲ διὰ τὴν
ἐπὶ πόδας ἀπειρον ὀλκὴν
ἀποσπᾶται τὸ κεφάλιον
καὶ δύσληπτόν ἐστι διὰ
τὴν περιφέρειαν καὶ τὸ
προσανατρέχειν κατὰ τὴν
εὐρυχωρίαν τῆς μήτρας.

Paul. Aeg. 306, 5:

Τῶν δὲ ἐπὶ πόδας
φερομένων ἡ μὲν παρ-
έγκλισις ῥαδίως ἀπεν-
θύνεται πρὸς τὸ στόμα
τῆς ὑστέρας Τὰ
δὲ πλάγια τῶν ἐμβρύων,
εἰ μὲν ἀπενθύνοντο,
ταῖς εἰρημέναις χρῆσθαι
μεθόδοις, εἰ δὲ μὴ, ἔνδον
ὅλον αὐτὸ κατατέμνοντα
κομίζεσθαι κατὰ μέρος,
φυλαττόμενον μὴ τι τῶν
μορίων αὐτοῦ διαλαθὼν
ἔνδον καταλειφθεῖν.

Tritt der letztere Fall ein, so muß ein kräftiger Mann, der zur linken Seite der Gebärenden steht, mit der einen Hand auf den Unterleib, mit der andern auf den Steifs drücken, um den Kopf der Frucht gegen den Muttermund zu bringen. Celsus drückt sich

ungenau aus (318, 18): *Si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo iniecto, valens homo, non imperitus, a sinistro latere eius debet assistere et super imum ventrem eius duas manus imponere alteraque alteram premere: quo fit, ut illud caput ad os vulvae compellatur; idque eadem ratione, quae supra posita est, unco extrahitur.* Genauer Soran nach Sostratos (368, 6): 'Οπότє Σώστρατος μὲν ὡς ἐπὶ τῶν λίθων (cf. Cels. VII 26 p. 308, 20f.) εἰς τὴν ἔδραν καθεῖς τὸν τῆς εὐωνύμου χειρὸς δάκτυλον, τῇ δεξιᾷ δὲ πιέζων πειρᾶται τὸ κεφάλιον κατὰγειν . . . Soran verwirft dies Verfahren des Sostratos; er empfiehlt vielmehr, den Kopf mit der Hand in der Gebärmutter zu suchen, ihn bis an den Muttermund zu bringen und dann mit Hilfe der Zange herauszuschaffen. Bei der Steifslage endlich empfehlen beide (Cels. 318, 26 = Sor. 361) die Hinterbacken zurückzuschieben, den zunächst gelegenen Fuß aufzusuchen und daran die Frucht herauszuziehen.

Alle vier Autoren behandeln im Wesentlichen übereinstimmend die Honig-, Brei- und Fettgeschwülste: Cels. VII 6. Aet. XV 7 (nach Leonidas). Orib. IV 2 p. 3, 11 (nach Antyll) und Paulus VI 36 (ebenfalls nach Antyll). Da die Übereinstimmung zwischen Celsus einerseits und Leonidas-Antyll andererseits eine auffallend enge ist, so lasse ich die drei Massen in Gegenüberstellung folgen:

Celsus:	Aetius XV 7:	Paul. Aeg. VI 36
<i>In hoc (sc. capite) multa variaque tubercula oriuntur; γάγγλια, μελιζηρίδας, ἀθερώματα nominant; aliisque etiamnum vocabulis quaedam alii discernunt: quibus ego stεατώματα quoque adiciam. Quae quamvis et in cervice et in alis et in lateribus oriri solent, per se tamen non posui, cum omnia ista mediocres differentias habeant ac neque periculo terreant neque diverso genere curentur. Omnia vero ista et ex parvulo incipiunt et diu paula-</i>	<i>Περὶ ἀθερωμάτων καὶ μελικηρίδων. Λεωνίδου, Τὸ μὲν ἀθερώμα ἐστὶν ὄγκος ὁμόχρους, ἀνώδυνος, ἐν χιτῶνι νευρώδει περιέχων ἀργοῦ ὑγροῦ συλλογὴν, ἧτοις κότος τῇ λεγομένῃ ἀθήρᾳ¹⁾ τῇ ἑξ ἀλεύρου ἔψουμένου σκευαζομένη. ἐπὶ δὲ τινῶν ἀθερωμάτων σπανίως εὐρίσχομεν σὺν τῷ ἀθερώδει ὑγρῷ καὶ ἑτερά τινα λιθιώδη καὶ σκληρὰ σώματα καὶ ἑτέρα ὡς θείου ψήγματα, ἔσθ' ὅτε καὶ ὀρνίθων ὁστροίοις μεμαση-</i>	p. 177. Vgl. Orib. IV 3ff. Τοῦ γένους ὄντα καὶ ταῦτα (στεάτ. ἀθερ. καὶ μελ.) τῶν ἀποστιμημάτων τούτων διαφέρουσιν, ὅτε τὰ μὲν ἰδίως ἀποστιήματα καλούμενα φλεγμονώδη τέ εἰσι καὶ ἐπώδυνα καὶ δριμέος ὑγροῦ καὶ διαβρωτικοῦ περιεκτικὰ καὶ οὐκ ἐν ἰδίῳ ὑμένι περιέχονται ἥτοι χιτῶνι. Διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων, ὅτι τὸ μὲν ἐν τῷ στεατώματι
	¹⁾ ἀνθήρᾳ W.	

timque increscunt, et tunica sua includuntur. Quaedam ex his dura ac renitentia, quaedam mollia cedentiaque sunt; quaedam spatio nudantur, quaedam tecta capillo suo permanent fereque sine dolore sunt. Quid intus habeant, ut coniectura praesagiri potest, sic ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. Maxime tamen in iis, quae renituntur, aut lapillis quaedam similia, aut concreti confertique pili reperiuntur. In iis vero, quae cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui pulliculae aut quasi rasae cartilagini, aut carni hebeti et cruentae; quibus alii aliique colores esse consuerunt. Fereque ganglia renituntur; atheromati subest quasi tenuis pullicula; meliceridi liquidior humor; ideoque pressus circumfluit; steatomati pingue quiddam; idque latissime patere consuevit, resolvitque totam cutem superpositam sic, ut ea labet, cum in ceteris sit adstrictior.

μένοις ὁμοια· εὕρομεν δέ ποτε καὶ ὥσπερ τρίχας συμπεπλεγμένους τῷ¹⁾ ὑγρῷ παχυτάτῳ ὄντι. Φιλόξενος δέ φησί ποτε εὐρηγένοι ζῶα ἐν τῷ ὑγρῷ κώνωψι²⁾ ἢ μύαις μικραῖς ὁμοια· ὑποπίπτει δὲ ἐνίοτε τὰ τοιαῦτα σώματα τῇ ἀφῇ τῶν δακτύλων ἐν ταῖς σημειώσεσιν. Ἔστι δὲ καὶ τῷ σχήματι καὶ τῇ διαπλάσει ὁ ὄγκος τοῦ ἀθερώματος ὑπομήκης καὶ ὑπόπλευτος, τῇ παραπιέσει τῶν δακτύλων διὰ τὸ πάχος τοῦ ὑγροῦ βραδέως κοιλαινόμενος καὶ μετὰ τὴν ἄρσιν τῶν δακτύλων βραδέως συναγόμενος. Ἡ δὲ μελικηρὶς νευρώδης ἐστὶ χιτῶν λεπτοῦ ὑγροῦ μελιτώδους περιεκτικὸς, ἀνώδυνος δὲ ὁμοίως. διαφέρει μὲν οὖν τοῦ ἀθερώματος σχήματι καὶ τῇ τοῦ ὑγροῦ συστάσει· τῷ μὲν σχήματι στρογγυλωτέρως ἐστὶν ὁ τῆς μελικηρίδος ὄγκος· τῇ δὲ συστάσει λεπτότερόν ἐστι τὸ ἐν αὐτῇ ὑγρόν· διὸ καὶ περιτέταται μᾶλλον ὁ ὄγκος. Καὶ ἐν τῷ παραπισμῷ τῶν δακτύλων τάχιστα μὲν εἶχει τὸ ὑγρὸν καὶ πάλιν μετὰ τὴν ἄρσιν τῶν δακτύλων τάχιστα συνάγεται.

περιεχόμενον προσφόρως τῇ ὀνομασίᾳ στέατι παραπλήσιόν ἐστι· τὸ δὲ ἐν τῷ ἀθερώματι τῇ ἀπὸ τοῦ σίτου ἀθήρα· μέλιτι δὲ παρεικὸς ὑγρὸν ἐν τῇ μελικηρίδι. Διαγνώσῃ δὲ αὐτὰ οὕτως· τὸ μὲν στεάτωμα σκληρότερόν ἐστι τῶν ἄλλων καὶ ἀντιμεθιστάμενον τῇ ἀφῇ καὶ τὴν βάσιν στενωτέραν ἔχον· ἡ δὲ μελικηρὶς ἀπτομένοις ὥσπερ τι σῶμα χαλαρόν ὑποπίπτει καὶ βραδέως μὲν χεινται, ταχέως δὲ αὖθις στρέφεται.

Aet. XV 8:

Περὶ στεατωμάτων.

Τὸ στεάτωμα πιμελή ἐστι παρὰ φύσιν ἠϋξημένη κατὰ

¹⁾ Die Worte τῷ ὑγρῷ bis σώματα sind in W. am Rande nachgetragen. ²⁾ κωνω W.

τὴν τοπικὴν ἰδιότητα· ἔστι
 δὲ ὄγκος ὁμόχρους εὐαφής
 καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν μικρός,
 χρόνῳ δὲ μεγεθύνεται. τὰ
 δὲ πολλὰ τῶν στεατωμάτων
 πλατύτερά εἰσι τῇ βάσει
 κατὰ τὴν περιφέρειαν· σπανίως
 δὲ εὐρίσκεται καὶ στενῇ
 μὲν τῇ βάσει κεκρημένα,
 κατὰ δὲ τὴν κορυφὴν πλα-
 τυνόμενα. διαφέρει δὲ τὸ
 στεάτωμα χοιράδος τῷ μαλα-
 κώτερον ὑποπίπτειν τῇ ἀφῇ·
 ὡσαύτως διαφέρει καὶ ἀθερώ-
 ματος καὶ μελικηρίδος, ὅτι
 καὶ πληρὲς ἔστι καὶ ναστὸν
 καὶ μὴ κοιλαινόμενον κατὰ
 τὰς τῶν δακτύλων παρα-
 πιέσεις . . .

Die Bezeichnung der einen Geschwulstart (ἀθήρωμα) mit einem lokal gefärbten Worte¹⁾ enthält einen Fingerzeig für die Herkunft der Quelle: sie war ein alexandrinischer Chirurg. Da nun in der Beschreibung, die Leonidas, der älteste der pneumatischen Chirurgen, von diesen Geschwüren giebt, ausdrücklich Philoxenos als Quelle für eine Partie genannt wird, die sich mit Celsus deckt, da ferner dieser Arzt thatsächlich in Ägypten wirkte²⁾ und endlich von Celsus in der Vorrede zum 7. Buch im Gegensatz zu Gorgias, Sostratos, Heron, die beiden Apollonii und Ammonios ὁ λιθοτόμος, denen er nur einzelne Erfindungen auf diesem Gebiete nachrühmt, als derjenige bezeichnet wird, welcher mit der größten Sorgfalt die gesamte Chirurgie in mehreren Büchern bearbeitet hat³⁾, so schliesse ich, das er die gesuchte Quelle des Celsus und Leonidas⁴⁾ ist und

¹⁾ Schol. Orib. IV 527, 3: Ἀθήρωμα καλεῖσθαι φησιν (sc. Ἀντυλλος) ἀπὸ τοῦ τὸ περιεχόμενον εἰκέναι τῇ παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις λεγομένῃ ἀθήρᾳ· ἔψημα δ' ἔστι γινόμενον παρ' αὐτοῖς ἐκ πυρίνου λευκοῦ ἀλεύρου.

²⁾ Cels. VII praef. 262, 21.

³⁾ Cels. a. a. O.: deinde, posteaquā diducta (sc. chirurgia) ab aliis habere professores suos coepit, in Aegypto quoque increvit, Philoxeno maxime auctore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit.

⁴⁾ Vermutet hatte ich es schon lange. Vgl. Herm. XXVI 342 A. 1. Übrigens stammt das Citat des Philoxenos bei Aet. XVI 42 auch aus Leonidas. Es ist sicher kein Zufall, daß beide aus Alexandria stammen (Gal. XIV 684).

dafs überall da, wo Celsus mit den späteren Chirurgen stimmt, Überreste seiner Doctrin vorliegen.

Eine erfreuliche Bestätigung für unser Resultat ist es, dafs der Autor, der nach unserer Beweisführung von der Quelle bereits verarbeitet sein mufs, Sostratos, thatsächlich von Philoxenos für chirurgische Zwecke verwertet ist. Die beweisende Stelle ist von dem lateinischen Übersetzer des Soran, Muscion erhalten (Soran ed. Rose p. 106) und es ist bezeichnend genug, dafs die Ansicht des Philoxenos ohne Namensnennung bei Paulus (VI 70, 293) wiederkehrt:

Muscion a. a. O.

Apollonius et Sostratus et Philoxenus adseverant in orificio matricis carnem quandam emergere et in tantum excrescere ut expleto orificio et collo matricis aliquando et foris hoc penetret.

Paul. Aeg. a. a. O. vgl. Aet. XVI 103.

Καὶ τὴν κέρκωσιν δὲ σαρκώδη ἔκφυσιν οὖσαν ἀπὸ στομίου τῆς μήτρας ἀναπληροῦσαν τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, ποτὲ δὲ καὶ εἰς τὰ ἔξω δίκην κέρκου προπίπτουσιν, παραπλησίως ἀφαιρετέον τῇ νύμφῃ.

Da er der jüngste der drei genannten Autoren ist¹⁾, so folgt, dafs er den Apollonios und Sostratos benützt hat. Dann darf aber auch mit derselben Bestimmtheit behauptet werden, dafs Celsus die Kenntniss dieser beiden Ärzte, die er in seiner Vorrede gewissermassen als Quellenschriftsteller nennt und die er auch sonst citiert, ihm verdankt.

Die Untersuchung ist bisher geführt worden ohne Rücksicht auf die Frage, wem Aetius und Paulus Aegineta ihre chirurgischen Excerpte verdanken. Da ihre Werke völlig aus fremdem Material bestehen, so kommt es bei dieser Frage nicht auf die Entdeckung der älteren, sondern der jüngsten d. h. der directen Quellen an. Die Beantwortung derselben wird erst dann möglich sein, wenn von beiden Compilationen brauchbare Ausgaben vorliegen. Vom Tetrabiblon des Aetius²⁾ giebt es überhaupt noch keine vollständige Originalausgabe. Bisher war nur die erste Hälfte des Werkes im griechischen Originale gedruckt, Venedig 1534 f.: erst neuerdings hat der Grieche A. G. Kastomiris in verdienstvoller Weise zunächst die Herausgabe der noch ungedruckten Bücher des Aetius begonnen, von denen bis jetzt das 12. Buch gedruckt vorliegt. Von Paulus³⁾

¹⁾ Vgl. Susemihl, Gesch. d. griech. Lit. in der Alexandrinerzeit II 445.

²⁾ Über seine Zeit vgl. Sprengel, Gesch. d. Medicin II³ 277.

³⁾ Paulus von Aegina gehört der Mitte des 7. Jh. an: vgl. Briau, Chirurgie de Paul d'Egine, Paris 1855 p. 19f.

ist die editio princeps, Basel 1538, wenig brauchbar; in neuerer Zeit ist nur die Chirurgie (B. VI) von dem verdienstvollen französischen Gelehrten R. Briau herausgegeben.

Trotz der Schwierigkeiten, die einer Quellenuntersuchung des Aetius entgegenstehen, glaube ich die Analyse des letzten Buches seines τετράβιβλον, das eine Reihe von chirurgischen Fragen, wie die Entfernung der Nachgeburt, die Extraction des kindlichen Körpers, die Behandlung von Erkrankungen der Gebärmutter und der weiblichen Brüste und anderes mehr enthält, in befriedigender Weise lösen zu können. Ich füge sie meiner Darstellung bei, einmal um den Mitforschenden einen Wink zu geben, in welcher Richtung die Quellen dieses Compilers zu suchen sind, andererseits um einem vielverkannten Arzte seine richtige Stellung in der medizinischen Litteratur anzuweisen.

Aetius steht in seiner schriftstellerischen Thätigkeit noch eine Stufe tiefer als Paulus¹⁾, insofern als er ganz stumpfsinnig mit Verzicht auf jede eigene Meinung nach Art des Oribasius einfach Excerpt an Excerpt reiht. Darin liegt aber gerade sein hoher Wert für uns: zahlreiche Excerpte aus den Werken älterer Ärzte sind nur von ihm erhalten. Zu Anfang seiner Compilation lesen wir eine kurze Quellenangabe: *Ἀετίου Ἀμιδηνοῦ σύνοψις τῶν τριῶν βιβλίων, Ὀρειβάσιου λέγω δὴ τοῦ πρὸς Ἰουλιανὸν καὶ τοῦ πρὸς Εὐστάθιον καὶ τοῦ πρὸς Εὐνάπιον καὶ τῶν Θεραπευτικῶν βιβλίων Γαληνοῦ καὶ Ἀρχιγένους καὶ Ρούφου καὶ ἑτέρων τῶν ἀρχαίων ἐπισήμων.* Ergänzt wird diese Angabe durch den Patriarchen Photios, der in seiner Bibliothek (c. 221 p. 177a 7) eine kurze Inhaltsangabe der 16 Bücher des Amideners erhalten hat: *Ἀνεγνώσθη Ἀετίου Ἀμιδηνοῦ βιβλίον ἰατρικὸν ἐν λόγοις ις'. ἔστι μὲν οὖν αὐτῷ πᾶσα ἡ πραγματεία συντεταγμένη ἐκ τε ὧν Ὀρειβάσιος πρὸς Ἰουλιανὸν ἔγραψε πρὸς τε Εὐστάθιον καὶ Εὐνάπιον, ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν Θεραπευτικῶν βιβλίων Γαληνοῦ καὶ μὴν καὶ Ἀρχιγένους καὶ Ρούφου, ἔτι δὲ Διοσκουρίδου καὶ Ἡροδότου καὶ Σωρανοῦ Φιλαργίου τε καὶ Φιλουμένου καὶ Ποσειδωνίου καὶ ἑτέρων τινῶν τῶν ἐπὶ τῇ τέχνῃ τῆς ἰατρικῆς*

¹⁾ Dieser betont ausdrücklich in seiner Vorrede (abgedruckt bei Briau 34 f.), daß er sich seine eigene Meinung seinen Quellen gegenüber bewahrt habe. Bestätigt wird es durch Stellen wie VI 9 p. 108. 53 p. 238 B.

ὄνομα λιπόντων. Wollte man sich auf die Quellenangabe verlassen, so müßte man glauben, daß er außer Oribasius, den er natürlich selbst benützt hat, den Galen, Rufus, Archigenes und andere berühmte Ärzte selbst eingesehen habe. Dem widerspricht aber der Umstand, daß er eine Reihe von Excerpten dieser Ärzte nach seinen eigenen Angaben nur aus späteren Compilationen¹⁾ kennt. Da die Autorenbeischriften im Aetius durchaus zuverlässig sind, so ist der Weg der Quellenuntersuchung für die einzelnen Bücher, sofern sie ein geschlossenes Ganze bilden, genau vorgeschrieben. Es kommt darauf an, mit ihrer Hilfe den compilierenden Schriftsteller zu ermitteln, die Zahl der von ihm benützten Autoren festzustellen und darnach den Umfang seiner Benützung zu bestimmen.

In dem 16. Buch, das die Krankheiten des weiblichen Geschlechts behandelt, finden sich die Beischriften von folgenden 9 Autoren: Asklepiades, Leonidas, Rufus, Soran, Archigenes, Galen, Aspasia, Philumenos und Philagrios. Dasjenige Werk, dem naturgemäß die meisten Excerpte entlehnt sind, sind Sorans *γυναικεῖα*. Die nächstliegende Frage: hat Aetius den Soran selbst eingesehen oder verdankt er die Excerpte aus ihm einer späteren Quelle? läßt sich mit aller nur wünschenswerten Bestimmtheit beantworten.

Oribasius hat im 9. Buch seiner *σύνοψις πρὸς Εὐστάθιον* c. 45—56 (V 539 ff.) ein längeres Excerpt aus Philumenos erhalten, natürlich in starker Kürzung und mit möglicher Beschränkung auf die Therapie der einzelnen Erkrankungen, das sich vollständig mit den entsprechenden Capiteln des Aetius deckt:

1) Orib. V 539: *περὶ ὑστερῶν πνιγός· ἐκ τῶν Φιλουμένων* = Aet. XVI 68²⁾.

2) Orib. V 540f.: *περὶ ῥοῦ γυναικείου* = Aet. XVI 65 (aus Archigenes).

3) Orib. V 542: *περὶ φλεγμονῆς ὑστέρας* = Aet. XVI 83 (aus Philumenos).

4) Orib. V 543: *περὶ τῶν ἐν μήτρᾳ ἀποστημάτων* = Aet. XVI 85 (aus Archigenes).

5) Orib. V 543: *περὶ τῶν ἐν μήτρᾳ ἐλκῶν* = Aet. XVI 88 (aus Archigenes).

¹⁾ Vgl. Aet. V 116 (Herodot aus Philumenos), VIII 45 (Leonidas aus Philumenos), XI 4 (Archigenes aus Philagrios), VI 9 (Galen und Rufus aus Poseidonios).

²⁾ Vgl. S. 92.

6) Orib. V 545: *περὶ τῶν ἐν μήτρᾳ καρκινωμάτων* = Aet. XVI 94 (aus Archigenes).

7) Orib. V 545: *πρὸς ῥαγάδας ἐν μήτρᾳ* = Aet. XVI 107.

8) Orib. V 546: *περὶ φρίμου ἐν ὑστέρᾳ* = Aet. XVI 95.

9) Orib. V 546: *περὶ ἐμπνευματώσεως μήτρας* = Aet. XVI 78.

10) Orib. V 547: *περὶ προπτώσεως ὑστέρας* = Aet. XVI 76 (aus Soran).

Da Philumenos nicht nur von Oribasius als Quelle für das erste, sondern auch von Aetius als Quelle für das dritte Capitel des Oribasius gesichert ist, da er ferner Archigenesexcerpte¹⁾ nachweislich seinen Schriften einverleibt hat, so halte ich den Schluss für berechtigt, daß Oribasius die ganze Capitelfolge aus ihm entlehnt hat. Folglich hat er auch den Soran excerpiert; denn das letzte der angeführten Capitel, welches das Hervortreten der Gebärmutter behandelt, ist ein wörtliches Excerpt aus diesem Schriftsteller, wovon Jeden eine Gegenüberstellung der in Frage kommenden Partien überzeugen wird:

Orib. 547:

Soran II 31, 375 R.

Aet. XVI 76:

<i>Καταστέλλειν δὲ δεῖ τὴν προπεσοῦσαν ὑστέραν πρότερον κλυσμασι χρησάμενον πρὸς τὴν κομιδὴν τῶν σκυβάων· ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ ἐν κύστει περίττωμα συνειλεγμένον εἴη, καὶ τοῦτο διὰ καθετῆρος ἐκκληπιέον. Εἴτα σχηματίζειν τὴν πᾶσχουσαν ἐπὶ κλίνης ὑπίαν ἀνάρθοπον συνηγμένας ἔχουσας τὰς ἰγνύας καὶ ἐν διαστάσει τὰ σκέλη, ἔπειτα λαβεῖν σύστρεμμα ξορίου ἀπαλοῦ καὶ σχήματι καὶ πάχει ἀναλογοῦν τῷ κόλπῳ τῷ γυναικεῖῳ περιβάλλειν τε</i>	<i>Εἰ μὲν οὖν σκύβαλα ἐν τῷ ἀπενδυσμένῳ παρακείτο, διὰ κλυστήρος αὐτὰ κομιστέον ἀπλοῦ. ὡσαύτως δὲ εἰ ἐν κύστει περίττωμα εἴη, διὰ καθετῆρος αὐτὸ κομιστέον... σχηματίζειν δὲ μετὰ τοῦτο τὴν κάμνουσαν ὑπίαν ὑψηλότερα ἔχουσας τὰ ἰσχία καὶ κάμψασαν τὰς ἰγνύας μετὰ τοῦ διεστάναι ἀπ' ἀλλήλων πολλῶ χλιαρῶ. καταντλήσαντα τὸ προπεπτικὸς τῆς μήτρας ἐπὶ πολὺ καὶ ποιήσαντα σύστρεμμα ἐξ ξορίου</i>	<i>Περὶ προπτώσεως ὑστέρας, τοῦ αὐτοῦ (sc. Σωρανοῦ)¹⁾. εἰ μὲν οὖν σκύβαλα ἐν τῷ ἀπενδυσμένῳ παρὰκειται, διὰ κλυστήρος αὐτὰ κομιστέον· ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ ἐν κύστει περίττωμα εἴη, διὰ καθετῆρος αὐτὸ κομιστέον... σχηματίζειν δὲ μετὰ τοῦτο τὴν κάμνουσαν ὑπίαν ὑψηλότερα ἔχουσας τὰ ἰσχία καὶ κάμψασαν τὰς ἰγνύας μετὰ τοῦ διεστάναι ἀπ' ἀλλήλων²⁾ τὰ σκέλη· ἔπειτα ἐλαίῳ πολλῶ καταντλήσαντας³⁾ χλιαρῶ τὸ προ-</i>
---	---	---

¹⁾ Σωρανοῦ im Text von P.

²⁾ ἀλλήλων P. ³⁾ καταντλή-

σαντες P.

¹⁾ Vgl. S. 35 f. 92 f.

λεπτῷ ὀθονίῳ καὶ καταβάπτειν εἰς χύλισμα ὑποκιστίδος ἢ ἀκακίας οἴνῳ διειμένον προστιθέναι τε τῇ ὑστέρᾳ καὶ δίχα βίας ἀναβιβάζειν πᾶν τὸ προπεπτωκός, ἄχρις οὗ ὁ ὄγκος ὅλος ἐν τῷ κόλπῳ γένηται καὶ σκεπάζειν ἔξωθεν σπόγγῳ τὸ ἥτρον ἀποτεθλιμμένῳ ἔξ ὀξυκράτου κατακλίνειν τε τὴν ἀνθρωπον ἐκτεταμένα καὶ συνηρμοσμένα ἔχουσαν ἀλλήλοις τὰ σκέλη ἢ τὸ ἕτερον κατὰ τοῦ ἑτέρου κείμενον. Μετὰ δὲ τοῦτο σικύας παραληπτέον μετὰ φλογός πλείονος ἄνω πρὸς ὀμφαλὸν κατὰ ἑκατέραν λαγόνα. Τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν, ἐγκειμένου τοῦ ἐρίου, ἐγκαθιζέτω ἡ γυνὴ εἰς οἶνον μέλανα, αὐστηρὸν ποσῶς κεχλιασμένον ἢ εἰς ἀφείψημα βάτου ἢ μυρσίνης ἢ σιδίων. Μετὰ δὲ ταῦτα τὸ μὲν ἐγκείμενον ἔριον αἰρέσθω, ἕτερον δὲ ἐντιθέσθω τῷ αὐτῷ νενοτισμένον φαρμάκῳ καταπλάσματά τε ἔξωθεν ἐπιῶριπτιέσθω κατὰ τοῦ ὑπογαστρίου τὰ διὰ φοινίκων καὶ ἀλφίτων ἢ φακῆς ἢ σιδίων· διὰ τρίτης τε πάλιν τὰ αὐτὰ γινέσθω μέχρι πεῖσμα βέβαιον λάβωμεν περὶ τοῦ μένειν τὰ κατεστιαλμένα σώματα.

σχήματι καὶ πάχει ἀναλογοῦν τῷ γυναικείῳ κόλπῳ περιβάλλειν ἔξωθεν τὸ σύστρεμμα τοῦ ἐρίου ἰσχυροτάτῳ καὶ καθαρῷ ὀθονίῳ κᾶπειτα καταβάπτειν ταχέως εἰς ὀξύκρατον . . . εἰς χυλὸν ἀκακίας ἢ ὑποκιστίδος οἴνῳ διειμένης καὶ προστιθέναι τῇ ὑστέρᾳ καὶ διαβιβάζειν πᾶν τὸ προπεπτωκός ἡρέμα ἀναθλίβοντα, ἄχρις οὗ ἡ μήτρα ἐπὶ τὸν ἴδιον τόπον ἀναχωρήσῃ καὶ ὁ τοῦ ἐρίου ὄγκος ὅλος ἐν τῷ κόλπῳ γένηται, τοῦτ' ἔστιν ἐν τῷ αἰδοίῳ. εἴτα ἔρια ἔξωθεν ἐπιτιθέναι οἴνῳ στύφοντι βεβρεγμένα ἢ καὶ σκέπειν τὸ ἥτρον ὅλον σπόγγῳ καὶ ἐρίοις ἔξ ὀξυκράτου τεθλιμμένοις . . . ἐκτείνειν τε τὰ σκέλη τῆς γυναικός, ὥστε τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἐπικεῖσθαι. μετὰ δὲ τοῦτο σικύας προσβλητέον μετὰ φλογός πλείονος πρὸς ὀμφαλὸν καὶ κατ' ἑκατέραν λαγόνα . . . τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἐγκειμένου τῷ κόλπῳ τοῦ ἐρίου ἐγκαθιζέτω ἡ γυνὴ εἰς οἶνον μέλανα αὐστηρὸν ποσῶς ἢ εἰς ἀφείψημα βάτου ἢ μυρσίνης ἢ σκίνου ἢ σιδίων. μετὰ δὲ τὸ ἐγκάθισμα κατακλιθείσης αὐτῆς ὑπτίας ἀναρρόπου ὡς ὑψηλότερα

πεπτωκός τῆς μήτρας ἐπὶ πολὺ καὶ ποιήσαντας¹⁾ σύστρεμμα²⁾ ἔξ ἐρίου σχήματι καὶ πάχει ἀναλογοῦν τῷ γυναικείῳ κόλπῳ, περιβάλλειν³⁾ ἔξωθεν τὸ σύστρεμμα τοῦ ἐρίου ἰσχυροτάτῳ⁴⁾ καὶ καθαρωτάτῳ ὀθονίῳ· κᾶπειτα καταβάπτειν εἰς χυλὸν ἀκακίας ἢ ὑποκιστίδος οἴνῳ διειμένης⁵⁾ καὶ προστιθέναι τῇ ὑστέρᾳ καὶ διαβιβάζειν πᾶν τὸ προπεπτωκός ἡρέμα ἀναθλίβοντας, ἄχρις οὗ ἡ μήτρα ἐπὶ τὸν ἴδιον τόπον ἀναχωρῇ καὶ ὁ τοῦ ἐρίου ὄγκος ἐν τῷ κόλπῳ γένηται, τοῦτ' ἔστιν ἐν τῷ αἰδοίῳ. εἴτα ἔρια ἔξωθεν ἐπιτιθέναι οἴνῳ στύφοντι βεβρεγμένα, εἴτα σκέπειν τὸ ἥτρον ὅλον σπόγγῳ ἢ ἐρίοις ὀξυκράτῳ βεβρεγμένοις⁶⁾ καὶ ἐπιδυσμεῖν ἐκτείνειν τε τὰ σκέλη τῆς γυναικός, ὥστε τὸ ἕτερον (τῷ)⁷⁾ ἑτέρῳ ἐπικεῖσθαι. Μετὰ δὲ τοῦτο σικύας προσβλητέον μετὰ φλογός⁸⁾ πλείονος πρὸς ὀμφαλὸν κατ' ἑκατέραν λαγόνα καὶ ὀσφραντὰ ταῖς ῥισὶν εὐώδη συνεχῶς προσενεκτέον· τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἐγκειμένου τῷ κόλπῳ τοῦ ἐρίου, ἐγκαθιζέτω ἡ γυνὴ εἰς οἶνον μέλανα αὐ-

1) ποιήσαντες P. 2) σύστρεμμα am Rande von W. nachgetragen. 3) περιβαλεῖν W. 4) ἰσοτάτῳ P. W. 5) διημένης W. διημένων P. 6) τεθλιμμένοις P. und am Rande von W. 7) Wil. 8) φορεῖν W.

ἔχειν τὰ πρὸς τοῖς στηρὸν κεχλιασμένον ποσῶς
 ἰσχύοις, τὸ μὲν ἐγκεί- ἢ εἰς ἀφέψημα βάτου ἢ
 μενον ἔριον ἐξαίρεισθω, μυρσίνης ἢ σχίνου ἢ σιδίων.
 ἕτερον δὲ ἐντιθέσθω Μετὰ δὲ τὸ ἐγκάθισμα κατα-
 βεβρεγμένον τῷ αὐτῷ κλιθείσης αὐτῆς ὑπτίας
 φαρμάκῳ. καταπλατ- ἀναρρόπου¹⁾ ὡς ὑψηλότερα
 τέσθω δὲ τὸ ἐπιγάζστρι- ἔχειν τὰ πρὸς τοῖς ἰσχύοις,
 ον φοίνιξιν, ἀλφίτοις, τὸ μὲν ἐγκείμενον ἔριον ἐξ-
 σιδίοις, φακῶ μετ' ὄξυ- αιρείσθω²⁾, ἕτερον δὲ ἐν-
 μέλιτος· καὶ διὰ τρίτης τιθέσθω βεβρεγμένον τῷ αὐ-
 παλιν τὰ αὐτὰ γιγνέ- τῷ φαρμάκῳ· καταπλασ-
 σθω μέχρι παντελοῦς σέσθω δὲ τὸ ἐπιγάζστριον
 θεραπείας. φοίνιξιν, ἀλφίτοις, σιδίοις,
 φακῶ μετ' ὄξυμέλιτος. καὶ
 διὰ τρίτης (τὰ)³⁾ αὐτὰ
 γιγνέσθω μέχρι παντελοῦς
 ἀποθεραπείας.

¹⁾ ἀναρρόπου P. W. am
 Rande. ²⁾ ἐξαίρετος W.
³⁾ fehlt in P. W.

Wann lebte Philumenos? Wollten wir den modernen His-
 torikern der Medicin Glauben schenken, so würden wir mit unserm
 Resultat in einen unlösbaren Widerspruch geraten. Die moderne
 Forschung setzt ihn in das 1. Jh. n. Ch., wenigstens schreibt dies
 völlig willkürlich immer ein Historiker der Medicin dem andern
 nach, trotzdem nicht einmal die Spur eines Zeugnisses dafür vor-
 handen ist¹⁾. Caelius Aurelianus d. h. Soran kennt ihn nicht, trotz-
 dem Philumenos Methodiker gewesen sein soll; Galen ebensowenig.
 Ist das Zufall? Bei der ausgezeichneten Überlieferung, die wir
 gerade von der methodischen Schule besitzen, ist es ganz unwahr-
 scheinlich, daß er von unsern verschiedenen Quellen für diese Schule
 gleicherweise nur aus Versehen nicht erwähnt sein sollte. Wir
 halten uns an die Überlieferung. Darnach war er jünger als Archi-
 genes und Soran und älter als Oribasius (4. Jh.), der ihn zuerst
 erwähnt; vielleicht gestattet das Schweigen des Galen über ihn eine
 weitere Einschränkung seiner Lebenszeit, so daß wir mit ihm ins

¹⁾ Th. Puschmann, Nachträge zu Alexander von Tralles, Berl. Studien für
 klass. Philologie Bd. V Heft 2 S. 13. S. Sepp a. a. O. 121. Sprengel, Gesch.
 d. griech. Arz. II³ 46.

3. Jh. kämen. Philumenos war ein Compiler in der Weise der späteren Sammelchriftsteller. Archigenes, Soran, Herodot¹⁾ sind schon von ihm excerpiert; vermutlich aber auch die übrigen der von Aetius im 16. B. erwähnten Ärzte mit der einzigen Ausnahme des Philagrios. Der Titel des von Aetius benutzten Werkes ist uns von dem Scholiasten zu Oribasius III 681, 10 erhalten: *Ἰστέον ὅτι ὁ μὲν Σωρανὸς ἐν τοῖς Γυναικείοις διὰ τὸ σκληρὸν καὶ δυσκίνητον μύλην ἢ μύλον ὀνομάζεσθαι φησιν· ὁ δὲ Φιλούμενος ἐν τῷ β' τῶν Γυναικείων λέγει ὅτι τινὲς ἱστοροῦνται κατὰ τὸ σπάνιον τῶν ἐκβεβρωμένην ἐσχηκνιωὺν τὴν ὑστέραν ἐπερῶμενον τοῦ λοιποῦ σώματος....* Seine Abhängigkeit von Soran documentiert sich im Titel und, wie es scheint, auch in der Bücherzahl: seine Γυναικεῖα bestanden wie die des Soran aus 2 Büchern. Nach unserer Überlieferung war es das letzte und abschließende Werk auf diesem Gebiet; daher der Zuspruch der folgenden Generationen zu ihm.

¹⁾ Vgl. Aet. V 116. Wenn an dieser Stelle ein Excerpt über die Behandlung der Schlaflosigkeit bei Fiebernden mit der Überschrift steht: *ἐκ τῶν Ἡροδότου καὶ Φιλουμένου*, so besagt das nach der Methode der späteren Compileren, daß Philumenos den Herodot ausgeschrieben hat und nicht, wie Sepp a. a. O. 121 geschlossen hat, daß Herodot der Compiler war.

II. Teil.

SYSTEM DER PNEUMATISCHEN SCHULE.

Eine erschöpfende Darstellung der Lehren der pneumatischen Schule ist bei der Lückenhaftigkeit und Unzulänglichkeit des vorhandenen Materials unmöglich. Der Stifter der Schule und Archigenes sind die einzigen, über deren System wir genauer unterrichtet sind. Dagegen fehlt es uns vollständig an Mitteln, die Änderungen und Bereicherungen, welche das System des Athenaios durch seine Schüler erfahren hat, Schritt für Schritt zu verfolgen. Das eine gilt von allen, daß sie bald mehr, bald weniger zum Eklekticismus hinneigten. Ich begnüge mich deshalb mit einer Darstellung des Systems des Athenaios und Archigenes mit steter Rücksichtnahme auf die Lehren der übrigen Pneumatiker.

1.

Physiologie.

Athenaios unterschied fünf Disciplinen der Arzneikunde¹⁾: Physiologie (*φυσιολογικόν*), Pathologie (*παθολογικόν*), Diätetik (*διαιτητικόν*), Materia medica (*ύλικόν*) und Therapeutik (*θεραπευτικόν*). Mit Recht nimmt in seinem System die Physiologie in der Stufenreihe der medicinischen Disciplinen die oberste Stelle ein, da sie die wichtigste derselben ist. Ihr verdankt die pneumatische Schule die Geschlossenheit ihres Systems, durch welche sie sich

¹⁾ Vgl. Gal. XIV 689. XIX def. 11 p. 351, 12. Vgl. S. 67 A. 1. Die Semiotik wollte er als besonderen Zweig der Arzneikunde nicht gelten lassen, wenn er auch ihre Berechtigung als Teil der Therapie anerkannte. Dafür betonte er den Wert der materia medica (XIV 689).

vorteilhaft von der der Methodiker und Empiriker unterscheidet: ihre pathologischen Principien, ihre therapeutischen Grundsätze lassen sich nur aus den physiologischen Grundanschauungen ihres Systems verstehen.

Mit grosser Ausführlichkeit behandelte Athenaios in seiner Physiologie die Lehre von den Elementen, vom Pneuma, von der *ἐνκρασία* und die Entwicklungslehre. Die verstreuten Bruchstücke, die von diesen Theorien des Athenaios erhalten sind, haben die moderne Forschung auf die grosse Übereinstimmung seiner Physiologie mit der der Stoa aufmerksam gemacht¹⁾: es ist daraus mit Recht geschlossen worden, dass sie „mit Bewusstsein von den ausgebildeten Grundsätzen der stoischen Naturphilosophie abhängig ist“. Diese Annahme, die sich bei genauerer Betrachtung seines Systems mit unabweislicher Notwendigkeit aufdrängt, wird gestützt durch das unanfechtbare Zeugnis des Galen, der ausdrücklich die Stoa als Quelle ihrer Lehren bezeichnet²⁾: *ἀρέσκονται γὰρ οὗτοι πάντες οἱ πνευματικοὶ καλούμενοι τοῖς ἀπὸ τῆς στοᾶς δόγμασιν, ὥστ' ἐπεὶ Χρύσιππος αὐτοὺς εἵθισεν ἀμφισβητεῖν περὶ τῶν κατὰ τὴν φιλοσοφίαν ὀνομάτων οὐδ' αὐτοὶ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἱατρικὴν ταῦτα ποιεῖν ὀκνοῦσι* und genauer den Chrysipp als Stifter dieser Schule hinstellt³⁾: *πολὺ δὲ τοῦτ' ἔστι παρὰ τῷ προπάππῳ τῆς αἰρέσεως αὐτῶν Χρυσίππῳ*. Derselbe Galen bezeugt, dass sich ihre Abhängigkeit von der Stoa nicht nur in ihren Lehren, sondern sogar in der ganzen Art ihrer Darstellung zeige. Wer die Darstellungsweise eines Chrysipp kennt, wird in der That durch die unreine Sprache der Pneumatiker, ihre dunkle und unklare Ausdrucksweise⁴⁾, ihre grosse Unterscheidungssucht⁵⁾ und ihre dialektischen Spitzfindigkeiten und Wortklaubereien⁶⁾ lebhaft an dieselbe erinnert.

¹⁾ Sprengel, *Gesch. der Medicin im Altertum* II³ 96. Siebeck, *Gesch. der Psychologie* II 145.

²⁾ Gal. VIII 642. vgl. I 523.

³⁾ Gal. VIII 631. vgl. I 486.

⁴⁾ Dies gilt insbesondere für Archigenes Schrift *περὶ σφυγμῶν*: Gal. VIII 578f. 647. 650. 932f., aber auch für Athenaios: I 465.

⁵⁾ Man denke nur an die Fieber- und Pulslehre dieser Schule sowie an die Theorie des Archigenes von den verschiedenen Arten der Schmerzempfindungen (Gal. VIII 86. 90. 110).

⁶⁾ Vgl. Gal. I 460f. Gal. IV 610 tadelt die *ἐπιστημονικαὶ ἀποδείξεις* des Athenaios.

Die Physiologie des Athenaios beruht auf der dynamisch-materialistischen Weltanschauung der Stoa. Einerseits acceptierte er ihre Annahme, daß nur das Körperliche wirklich sei¹⁾, andererseits nahm er ihre Lehre vom Pneuma auf, wahrscheinlich in der Gestalt, wie sie von Chrysipp entwickelt war²⁾. In seiner Elementenlehre³⁾ ging er mit ihnen von der Annahme aus, daß aus dem eigenschaftslosen Stoff, der ungeworden und unvergänglich ist, sich durch Einwirkung der Qualitäten die Elemente bilden⁴⁾. Er faßte aber nicht die Elemente, sondern die Qualitäten (*ποιότητες*), die für sie kennzeichnend sind: das Warme, Kalte, Trockene, Feuchte als die Grundbestandteile (*στοιχεῖα*)⁵⁾ der Lebewesen und der gesamten Arzneikunde auf⁶⁾. Er wählte diese Bezeichnung, weil er dann sagen

1) Zum Beweise dafür genügt es auf die Thatsache zu verweisen, daß er das Warme, Kalte, Feuchte, Trockene für Körper ausgab (Gal. I 457).

2) Vgl. Gal. XIV 698: κατὰ δὲ τὸν Ἀθήναιον στοιχεῖα ἀνθρώπου οὐ τὰ τέσσαρα πρῶτα σώματα, πῦρ καὶ ἀήρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ, ἀλλ' αἱ ποιότητες αὐτῶν, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν, ὧν δύο μὲν τὰ ποιητικὰ αἷτια ὑποτίθεται, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν, δύο δὲ τὰ ὑλικά, τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν, καὶ πέμπτον παρεισάγει κατὰ τοὺς Στωϊκοὺς τὸ διήκον διὰ πάντων πνεῦμα, ὑφ' οὗ τὰ πάντα συνέχεσθαι καὶ διοικεῖσθαι. XIV 699: οἱ δὲ περὶ Ἀθήναιον καὶ Ἀρχιγένην μόνω τῷ διήκοντι δι' αὐτῶν πνεύματι καὶ τὰ φυσικὰ συνεστάναι τε καὶ διοικεῖσθαι καὶ τὰ νοσήματα πάντα, τούτου πρωτοπαθοῦντος, γίνεσθαι ἀπεφάναντο, ὅθεν καὶ πνευματικοὶ χρηματίζουσι. Übrigens verdankt Galen die Kenntnis der stoischen Pneumalehre zum nicht geringen Teil den Pneumatikern: vgl. dagegen Stein a. a. O. 102 A. 175.

3) Seine Hauptquelle war die Schrift des Chrysipp περὶ οὐσίας: Gal. I 486. 488. Über die Elemente handelte Chrysipp auch im 1. Buch seiner Physik (Diog. Laert. VII 136).

4) Gal. I 469.

5) Seine Definition von στοιχεῖον (Gal. XIX 356) ist durchaus stoisch. Vgl. Diog. Laert. VII 136. Hirzel, Untersuchungen zu Ciceros philos. Schriften II¹ 769.

6) Gal. I 457: καθάπερ καὶ Ἀθήναιος ὁ Ἀτταλεὺς, ἅμα μὲν τιθέμενος στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν, ἅμα δ' ἐναργῆ φάσκων εἶναι τὰ στοιχεῖα καὶ μηδεμιᾶς ἀποδείξεως δεῖσθαι, καὶ ποτὲ μὲν ὀνομάζων αὐτὰ ποιότητος τε καὶ δυνάμεις, ἐνίοτε δὲ συγχωρῶν σώμαθ' ὑπάρχειν, εἴτα δεδιὼς ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ πῦρ καὶ γῆν ὁμολογῆσαι. I 459: ἀλλ' ἴσως φήσουσιν οἱ ἀπ' Ἀθηναίου, μηδ' αὐτοὶ περὶ γε τούτων αὐτῶν ἀποφαίνεσθαι μηδέν· ἐπέκεινα γὰρ εἶναι τῆς ἰατρικῆς τέχνης· ἀρκεῖν δ' αὐτοῖς τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, ἃ καὶ τοῖς ζῴοις ἐναργῶς δεῖξαι δύνανται, στοιχεῖα καὶ τῶν σωμάτων ὑποθέσθαι

konnte, „dies ist nicht hypothetisch wie *πῦρ*, *ἀήρ* und bedarf nicht eines Beweises wie *φλέγμα*, *χολή*, sondern ist *ἐναργής* d. h. es ist

καὶ τῆς ὅλης ἱατρικῆς. τὸ μὲν οὖν ὥσπερ ζῶον καὶ τῆς ἱατρικῆς ὑποθέσθαι στοιχεῖα τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν ὅσης ἀλογίας ἔχεται, τί ἂν ἐγὼ νῦν ἐπεξίωμι; κεκωμώδηται γὰρ ὑπὸ πολλῶν ἤδη τὸ δόγμα καὶ ψόγον καὶ γέλωτα οὐ σμικρὸν, ἔτι τε πρὸς τοῦτοις ἀπιστίαν οὐκ ὀλίγην τῷ παλαιῷ προσετίψατο λόγῳ ... Vgl. XIV 698. X 462. XIX def. 31 p. 356, 4. In der Lehre des Athenaios von den Elementen sind es zwei Punkte, die den Widerspruch des Galen herausgefordert haben, weil er seine Lehre mißverstanden hat: 1. Die Annahme, daß die Elementarqualitäten die *στοιχεῖα* seien und 2. die Behauptung, daß sie so deutlich in die Sinne fallen, daß sie keines Beweises bedürfen. Die Widerlegung derselben füllt die zweite Hälfte des 1. Buches seiner Schrift: *περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων* (I 457—486). Sie knüpft an ein Gespräch an, das er im Alter von 19 Jahren mit einem Anhänger dieser Schule geführt haben will (I 460, 15—465, 2). Aus diesem Gespräch ergibt sich, daß die Pneumatiker in ähnlicher Weise wie die Stoa und in offener Abhängigkeit von ihr eine dreifache Bedeutung der Begriffe *θερμόν*, *ὑγρόν* u. s. w. unterschieden: im absoluten Sinne die Qualität, in einem andern die vier Elemente, in einem dritten jeden Stoff, in dem diese Qualität vorherrscht (I 464. Vgl. die stoische Definition des Begriffs *στοιχεῖον*: Stob. Ecl. I 312f. Diels Doxog. 458). Den Hauptwiderspruch des Athenaios findet er in seiner Behauptung, daß Wärme, Kälte u. s. w. als die *στοιχεῖα* von den vier Elementen verschieden seien (465). Die Widerlegung derselben zerfällt in drei Teile: zuerst wird nachgewiesen, daß die Bestimmungen des Athenaios über das *στοιχεῖον* folgerichtig auf die vier Elemente führen (465—473) und daß die Qualitäten nicht die *στοιχεῖα*, sondern die *ἀρχαί* (vgl. Zeller III 327 A. 1) der Körper seien (470). Darnach wird auf Grund der peripatetisch-stoischen Lehre von der Umwandlung des Stoffes (437f. vgl. Zeller IV 179 A. 3. Gal. II 4) ihre Behauptung widerlegt. Daß diese Lehre von der *ἀλλοίωσις* und *ῥύσις* auch pneumatisch ist, geht aus Galens eigenen Worten klar und deutlich hervor (486, 3): *ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ θαυμάζειν ἐπέρχεται τὴν Ἀθηναίου γνώμην, μήτε ταῦτα τὰ νῦν εἰρημένα μηθ' ὅσα προσέθηκεν Ἀριστοτέλης τε καὶ Χρυσίππος εἰπόντος, ἀλλ' ἀξιοῦντος ἐναργῆ τὰ στοιχεῖα χωρὶς ἀποδείξεως λαμβάνεσθαι. καίτοι γε ἐν οἷς αὐτὸς ἀντεῖπεν Ἀσκληπιάδῃ, μέμνηται πως καὶ τούτων* (sc. der vorhergehenden Gesichtspunkte), *οὐχ ἀπαντων μὲν ἀκριβῶς οὐδὲ ἀγωνιστικῶς οὐδὲ τάξει καὶ μεθόδῳ λογικῇ χρῶμενος τῆς ἀντιλογίας· ὅμως δ' οὖν μέμνηται, ταραττων ἀτάκτως αὐτόν.* Die Widerlegung schließt (c. 8. 9 p. 476) mit dem Nachweis, daß Hippokrates sich in der Bezeichnung der vier Grundelemente und der für sie bezeichnenden Qualitäten allerdings nicht gleich bleibe, daß er aber unter den *ποιότητες* immer den Stoff, dem die Qualität zukommt, versteht: die *ποιότητες* an sich sind für ihn die *ἀρχαί*, unter *στοιχεῖα* versteht er Feuer, Wasser, Luft und Erde.

sinnfällig¹⁾). Eine Erklärung für seine Abweichung von der landläufigen Auffassung der vier Elemente als *στοιχεῖα* erhalten wir durch seine Definition des *στοιχεῖον*, unter dem er nicht das allen Körpern gemeinsame, sondern nur das, was den belebten Körpern eigentümlich ist, verstanden wissen wollte²⁾. Diese Qualitäten als die ursprünglichsten, einfachsten und kleinsten sind es, aus denen der menschliche Leib besteht und in die er sich wieder auflöst³⁾: ihre Ursprünglichkeit wird dadurch bewiesen, daß sie rein und ohne Zuthat in unserer Erfahrung vorkommen und daß sich kein anderer Körper aus ihnen ausscheiden läßt⁴⁾. Durch die Mischung dieser

¹⁾ Gal. I 457. 458. 460. 486. Die richtige Auffassung von den pneumatischen *στοιχεῖα* verdanke ich Prof. v. Wilamowitz. Die Elemente des Athenaios sind in Wirklichkeit gar keine 'Qualitäten', wie Galen will, sondern es sind 'das Warme, Feuchte' u. s. w. Er benannte also die 4 Arten, in welche sich die Materie trennt, nach der für sie bezeichnenden Qualität.

²⁾ Gal. I 465, 4: *ἐθαύμαζον δὲ, πῶς οὐκ αἰσθάνεται συγχέων ἑαυτὸν ὁ Ἀθήναιος, ὃς θερμὸν μὲν καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ὀνομάζειν ἐπιχειρεῖ, ἀπαξιοῖ δὲ πῦρ εἰπεῖν καὶ γῆν καὶ αἶρα καὶ ὕδωρ. ναί φησι· „τὰ γὰρ προσεχῇ τῶν ζώων λαμβάνω, οὐχὶ τὰ κοινὰ πάντων σωμάτων στοιχεῖα“.* καλοῦσι δὲ προσεχῇ τὰ οἷον ἴδια καὶ μηδεὶς ἄλλου τῶν ἀπάντων. Daß übrigens diese Ersetzung der Elemente durch die Elementarqualitäten nicht erst von Athenaios herrührt, bezeugt Gal. XIX 356, 6: *καὶ Ἀθήναιος ὁ Ἀιταλεὺς ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ φησὶν οὕτως· „στοιχεῖα τῆς ἰατρικῆς ἐστι, καθάπερ τινὲς τῶν ἀρχαίων ὑπέλαβον, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρὸν, ἐξ ὧν πρῶτον φαινόμενων καὶ ἀπλουστάτων καὶ ἐλαχίστων ὁ ἄνθρωπος συνέστηκε καὶ εἰς ἃ ἔσχατα φαινόμενα καὶ ἀπλούστατα καὶ ἐλάχιστα τὴν ἀνάλυσιν λαμβάνει.“* Diese Theorie stellt sich als ein Compromiß dar zwischen der Stoa und den älteren Ärzten. Die Quelle, auf welche sie in letzter Linie zurückgeht, mögen Ärzte wie Diokles, Mnesitheos, Dieuches gewesen sein (Gal. X 462). Vgl. die eigenartige Lehre des Krotoniaten Hippon, der die Feuchtigkeit als das Lebensprincip hingestellt hatte in Diels Anonymi Londinensis ex Arist. iatricis Menoniis eclogae Suppl. Arist. III, 1 p. 17, 1. Daß sie schon vor Aristoteles ihre Vertreter gehabt haben muß, beweist Arist. part. anim. II 1, 646 a 16. Plat. symp. 186 D. 187 D. Der Vermittler derselben für Athenaios ist Chrysipp (Gal. I 486). Vgl. Stein a. a. O. 132 A. 175. 252.

³⁾ Gal. XIX 356.

⁴⁾ Gal. I 471, 1: *τὸ δὲ διὰ τοῦτο δεδιέναι ταῦθ' ὁμολογεῖν εἶναι στοιχεῖα, διότι μήτ' ἐξαιροῦμεν ἐκ τοῦ σώματος αὐτῶν τι, μήτ' ἐντίθεμεν, ἐσχάτως ἡλίθιον . . .* Gal. I 467: *ἀλλ' οὐ ταῦτά φησιν ὁ Ἀθήναιος* (sc. daß Knochen, Knorpel, Sehnen *στοιχεῖα* seien), *ἀλλὰ τὰ τούτων συνθετικά ὄντως εἶναι στοιχεῖα. δῆλον οὖν ὡς ὑπερβαίνει τὴν αἰσθησιν ἐπὶ τὰ πρῶτα καὶ ὄντως*

Qualitäten sind die lebenden Wesen entstanden¹⁾ in der Weise, daß sich aus ihnen zuerst die gleichteiligen Körper (*ὁμοιομερῆ*) wie Fleisch, Knochen, Knorpel, Haar, Fett und aus diesen wieder die übrigen Teile des Körpers zusammensetzen²⁾. Die notwendige Voraussetzung bei dieser Theorie ist die Körperlichkeit der Qualitäten. In der That wird uns von ihm bezeugt, daß er sie bald für Körper, bald, insofern sie Lebenserscheinungen hervorbringen, für wirkende Kräfte (*δυνάμεις*) ausgegeben habe³⁾. Von den vier Qualitäten bezeichnete er das Warme und Kalte als die wirkenden Ursachen (*ποιητικὰ αἴτια*), das Trockene und Feuchte als die leidenden (*ύλικά*)⁴⁾. Alles, was entsteht und vergeht, ist einer doppelten Veränderung unterworfen, der *ἀλλοίωσις* und der *ρύσις*⁵⁾, von denen die *ἀλλοίωσις* durch die Qualitäten herbeigeführt wird, während die *ρύσις* entweder sinnenfällig ist als *ἐκκρισίς* oder unsichtbar als *διαπνοή*. Die *ἀλλοίωσις* beruht auf dem Überhandnehmen einer Qualität d. h. im Sinne der Pneumatiker auf dem Überhandnehmen der Wärme, Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit, die *ρύσις* dagegen auf der Abnahme. Die Verminderung der überwiegenden Qualität geschieht durch die ihr entgegengesetzte, die Ergänzung durch dieselbe Qualität. Die Abnahme wird durch die Arzneimittel (*φάρμακα*), die Zunahme durch die Nahrung (*τροφή*) herbeigeführt.

ἀπλᾶ τῷ λογισμῷ προῖων, ἃ μηκέτι ἐγχωρεῖ λέγειν ἐπικρατεῖα τοῖα ἢ τοῖα γίνεσθαι . . .

¹⁾ Gal. X 462. Ebenso Chrysipp (ebenda) nach dem Vorgange des Aristoteles (Gal. I 489).

²⁾ Gal. I 466. Von den gleichteiligen Körpern, deren Grundbestandteile die Qualitäten sind, entsteht das Fleisch, wenn das Feuchte vorherrscht, der Knorpel, wenn das Kalte vorherrscht, die Knochen, wenn Trockenheit und Kälte überwiegen, das Fett, wenn Feuchtigkeit und Wärme die vorwiegenden Qualitäten sind u. s. w.

³⁾ Gal. I 457. Diese Annahme ist ebenfalls stoisch (Gal. II 92. XIX 464), darf demnach wohl für Chrysipp in Anspruch genommen werden (cf. Stein a. a. O. 15 A. 20).

⁴⁾ Gal. XIV 698. Gal. I 518.

⁵⁾ Daß diese Lehre pneumatisch ist, habe ich S. 123 A. 11 nachgewiesen. Vgl. Gal. XV 295. Sie ist natürlich der Stoa entlehnt. Vgl. Plut. plac. I 9, 2: *οἱ Στωικοὶ τροπιτὴν καὶ ἀλλοιωτὴν καὶ μεταβλητὴν καὶ ρευστὴν ὅλην δι' ὅλου τὴν ὕλην*. Zeller III¹ 179 A. 3.

Das Pneuma ist die Kraft, die alles belebt, beseelt und zusammenhält¹⁾. Es durchdringt den menschlichen Körper und ist in ihm das lebenspendende Prinzip (daher *πνεῦμα ζωτικόν*)²⁾, von dessen Beschaffenheit das körperliche und seelische Befinden des Menschen abhängig gedacht wurde: Veränderungen und Verletzungen des Pneuma bewirken Erkrankungen des Menschen³⁾. Es war eine alte Streitfrage, ob das Pneuma dem Menschen von Natur innewohnt oder ob es von aussen in seinen Körper gelangt: die Pneumatiker entschieden sich für die erstere Auffassung⁴⁾ (daher *πνεῦμα σύμφυτον*)⁵⁾. Pneuma und innere Wärme (*ἔμφυτον θερμόν*) sind ihnen im Grunde verschiedene Kräfte⁶⁾: das Pneuma ist das Eingeatmete, das sich dem *σύμφυτον πνεῦμα* assimiliert, während sich die innere Wärme erst aus dem inneren Pneuma infolge seiner durch Reibung verursachten mannigfachen Bewegung entwickelt⁷⁾. Dadurch wird allerdings das Pneuma wesentlich Träger desselben und kann deshalb mit dem *ἔμφυτον θερμόν* identifiziert werden⁸⁾. Als das Centralorgan für das Pneuma und die eingepflanzte Wärme galt ihnen das Herz oder genauer die beiden Herzventrikel⁹⁾.

Das Pneuma, welches das Herz zur Atmung gebraucht, erhält es zum Teil von der Lunge, die wieder vom Herzen mit eingepflanzter Wärme versehen wird¹⁰⁾. Durch diese Zuführung von Wärme wird umgekehrt wieder das Verlangen in der Lunge erregt,

¹⁾ Gal. XIV 698 f. Vgl. S. 122 A. 7.

²⁾ Gal. VIII 936. Apollonios bei Orib. II 65.

³⁾ Gal. a. a. O. Archigenes hatte diese Lehre des Athenaios in ihrer Reinheit beibehalten. Die Quelle ist Chrysipps Schrift *περὶ ψυχῆς*: Gal. V 287.

⁴⁾ Nach der Lehre des Praxagoras, Phylotimos, Erasistratos und Asklepiades ist es *ἐπίκτητος*. Gal. VII 614.

⁵⁾ Gal. VIII 936. Orib. II 65.

⁶⁾ Ebenso bei Aristoteles vgl. Siebeck a. a. O. 494; vgl. Ps.-Gal. XIX 360, 6.

⁷⁾ Rufus ed. Daremberg-Ruelle 166, 9: *Θερμασίαν δὲ καὶ πνεῦμα Ζήνων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναί φησιν· οἱ δὲ ἰατροὶ διαιροῦσι. πνεῦμα μὲν ἀναπνεόμενον, θερμόν δὲ τὴν ἔκτρυψιν τοῦ πνεύματος· οἱ δὲ ἀρχὴν τινα ζωῆς. Antyll bei Orib. I 461, 5: *Τὸ γὰρ πνεῦμα τὴν ἐν ἡμῖν θερμασίαν τῷ πολυκινήτῳ τῆς φορᾶς κατὰ τὴν παράτρυψιν ἐγείρει καὶ ζωπυρεῖ κτλ.**

⁸⁾ Ps.-Gal. XIX 357, 1.

⁹⁾ Ps.-Gal. XIX 360, 4f.

¹⁰⁾ Ps.-Gal. XIX def. 468 p. 459, 16. Aret. caus. ac. II 3, 39.

kalte Luft, d. h. Pneuma von aussen in sich aufzunehmen¹⁾. Die Organe, welche die Aufnahme derselben vermitteln, sind der Mund, die Nase und die Luftröhre, während der Brustkasten der Schirm und Behälter der Lunge ist. Die Atmung (*ἀναπνοή*) dient demnach in erster Linie der inneren Wärme zur Abkühlung²⁾, daneben aber auch zur Nahrung des innerorganischen Pneuma³⁾. Von der Atmung unterschieden sie die Perspiration (*διαπνοή*), unter der sie die Zuführung und Verteilung der atmosphärischen Luft im Körper durch die Schlagadern und die Aussonderung der unrein gewordenen durch die auf der Haut befindlichen Poren verstanden⁴⁾. Archigenes hatte auf die eigenartige Erscheinung⁵⁾ aufmerksam gemacht, die sich bisweilen bei hysterischen Frauen findet, daß die Atmung durch Mund und Nase völlig aufhören könne, ohne daß das Leben erlösche, weil die Perspiration im Körper noch stattfinde.

Da der normale Zustand des Organismus durch die Menge des innerorganischen Pneuma bedingt ist⁶⁾, so spielte die Atmung eine wichtige Rolle in ihrer Physiologie. Sie vollzieht sich in der Weise, daß bei der Zusammenziehung des Brustkastens Luft aufgenommen, bei der Ausdehnung desselben die unrein gewordene nach aussen abgegeben wird⁷⁾. Je gröfser nun die Ausdehnung der Organe ist, welche die Luft dem Körper zuführen, um so mehr Pneuma nimmt der Mensch in sich auf, da sich jedes Leere naturgemäfs wieder füllt⁸⁾. Von grofser Bedeutung für den menschlichen Organismus ist die Atmung deshalb, weil die durch sie dem Körper zugeführte Luft vermöge ihrer feinteiligen und feuchten Beschaffenheit das

¹⁾ Aret. caus. ac. II 1, 24.

²⁾ Ps.-Gal. XIX 366, 5. Antyll bei Orib. I 461. So schon bei Philistion und Diokles nach Gal. IV 471.

³⁾ Ps.-Gal. XIX 366, 7. Gal. V 710. Antyll bei Orib. I 455. 456.

⁴⁾ Ps.-Gal. XIX def. 109 p. 375, 11. Athenaios bei Orib. II 304. Aet. XVI 68. Vgl. Zeller II¹ 730 A. 3.

⁵⁾ Aetius a. a. O. Vgl. S. 95.

⁶⁾ Nach Apollonios bei Orib. II 65 erkaltet der Körper bei übermäfsiger Ausscheidung des Pneuma und vermag seine natürlichen Functionen nicht zu verrichten.

⁷⁾ Gal. V 162.

⁸⁾ Orib. I 456. Diese Behauptung setzt die stoische Lehre von der Nichtexistenz des leeren Raumes in der Welt voraus: Zeller III¹ 187.

schädliche Übermaß von Festigkeit und Trockenheit im Körper zu verhüten imstande ist.

Wie die Lunge dem Herzen Pneuma zuführt, so erhält es sein Blut von der Leber, welche das Geschäft der Blutzubereitung (*ἐξαιμάωσις*) hat¹⁾. Mit der Leber hängt die Gallenblase zusammen, welche zur Aufbewahrung der von der Leber abgesonderten Galle dient und sie in den Darmkanal überführt. Wenn die Kanäle, durch welche die Galle in den Darmkanal fließt, infolge einer Entzündung oder Verhärtung verstopft sind, so strömt die Galle aus der Gallenblase zurück, wird dem Blute beigemischt und durch dasselbe dem ganzen Körper zugeführt²⁾. Die Milz dient zur Reinigung des schwarzen Blutes; sie nimmt die unreinen Stoffe derselben auf und verarbeitet sie³⁾. Vom Magen, dessen Aufgabe es ist, die Nahrungsstoffe so umzuwandeln, daß ihre brauchbaren Bestandteile zum Übertritt in das Blut geeignet werden⁴⁾, werden dieselben, nachdem sie den Verdauungsproceß durchgemacht haben, der Leber zugeführt und hier mit Hilfe der eingepflanzten Wärme zu Blut verarbeitet: daraus erklärt sich, daß das Blut dieselbe Qualitätenmischung hat wie die Wärme: Wärme und Feuchtigkeit⁵⁾. Zugleich mit dem Pneuma und der eingepflanzten Wärme wird das Blut vom Herzen aus durch die Schlag- und Blutadern den übrigen Teilen des Organismus zugeführt. Die Nahrungsstoffe werden im Körper nicht nur durch sichtbare Kanäle, sondern auch durch Dünste (*ἀτμοί*) verbreitet, welche durch feste und harte Teile dringen und in alle einzelnen Körperteile gelangen⁶⁾.

Nach ihrer Theorie sind Arterien und Venen mit Blut und Pneuma angefüllt⁷⁾ mit dem Unterschiede, daß die letzteren mehr

¹⁾ Ps.-Gal. XIX def. 468 p. 459, 14. def. 51 p. 360, 13. Aret. caus. ac. II 7, 48. Vgl. Ps.-Gal. XIX def. 100 p. 373, 6.

²⁾ Aret. caus. chr. I 15, 114.

³⁾ Aret. a. a. O.

⁴⁾ Ps.-Gal. XIX def. 99 p. 372, 9.

⁵⁾ Ps.-Gal. XIX def. 66 p. 364, 4. Gal. XV 289. (Die an dieser Stelle von Galen vorgetragene Lehre ist unverkennbar pneumatisch.) Vgl. Ps.-Gal. XIX def. 99 p. 372, 9.

⁶⁾ Aret. caus. chr. I 15, 115.

⁷⁾ Ps.-Gal. XIX def. 73. 74 p. 365, 12 ff. Aet. XV 9. Orib. IV 51. Paul. Aeg. VI 180.

Blut, die ersteren mehr Pneuma enthalten¹⁾. Das arterielle Blut ist dünner, reiner, hellroter und gerinnt schwerer als das venöse²⁾. Die Arterien haben ihre Wurzel im Herzen, die Venen in der Leber³⁾. Die Kraft, welche die Pulsation des Herzens und der Arterien veranlaßt, ist die eingepflanzte Wärme, die im Herzen ihren Sitz hat und sich von sich weg und zu sich hin bewegt⁴⁾.

Im Gegensatz zu der landläufigen Anschauung hatten sie, insbesondere Archigenes⁵⁾, die wunderliche Hypothese aufgebracht, daß sich die Arterien und das Herz bei der Zusammenziehung mit Luft füllen, bei der Ausdehnung dagegen das unrein gewordene (*τὰ καπνώδη καὶ λιγνυώδη περιττώματα*) wieder abgeben. Die Arterien haben für den Organismus eine ähnliche Bedeutung wie die Lunge⁶⁾, weil sie bei der Pulsation vermittelt ihrer in der Haut befindlichen Endungen⁷⁾ dem Herzen ebenfalls Luft zuführen.

Mit den Stoikern haben sie die dreifache Abstufung des Pneuma gemein, die sie mit den stoischen Termini: *ἔξις*, *φύσις* und *ψυχή* belegten. Die gröbste Art desselben ist die *ἔξις*⁸⁾ d. h. die Kraft, welche die einzelnen Teile des Körpers zusammenhält, von größerer Feinheit ist die *φύσις*, die organisch gestaltende Natur, welche vermöge der ihr eigenen vernünftigen Keimkräfte (*σπερματικοὶ λόγοι*) die Zeugung und das Wachstum des Menschen verursacht⁹⁾, in seiner feinsten Ausgestaltung strömt endlich das Pneuma in der *ψυχή*, welche das Leben, Denken und die Sinnesempfindungen vermittelt¹⁰⁾. Der herrschende Teil der Seele ist das *ἡγεμονικόν*¹¹⁾, als dessen Organ Athenaios in Übereinstimmung mit Chrysipp¹²⁾ nicht

1) Ps.-Gal. XIX def. 73 p. 365 ff. Rufus p. 183.

2) Aret. caus. ac. II 2, 33.

3) Aret. caus. ac. II 7, 277 f.

4) Gal. VIII 756. Ps.-Gal. XIX def. 110, p. 376, 3.

5) Gal. V 162. VIII 713. XIX def. 74, 366, 3.

6) Ps.-Gal. XIX def. 74, p. 366. 7) Gal. V 709.

8) Ps.-Gal. XIX def. 96, 372, 1. Vgl. S. 69.

9) Ps.-Gal. XIX def. 95, 371, 4. Vgl. S. 69.

10) Ps.-Gal. XIX def. 29 p. 355, 15: *ψυχή ἐστι πνεῦμα παρειαρμένον ἐν ὅλῳ τῷ σώματι, δι' οὗ ζῶμεν καὶ λογιζόμεθα καὶ ταῖς λοιπαῖς αἰσθήσεσιν ἐνεργοῦμεν ὑπηρετοῦντος τοῦ σώματος*. Vgl. Stein a. a. O. 102 A. 175. Chrysipp definierte folgendermaßen: *ἡ ψυχή πνεῦμά ἐστι σύμφυτον ἡμῖν συνεχὲς παντὶ τῷ σώματι διήχον* (Gal. V 287).

11) Ps.-Gal. XIX def. 113 p. 378, 4. Vgl. S. 67 A. 3.

12) Vgl. Stein a. a. O. 135. Siebeck a. a. O. 266 f.

das Gehirn, sondern das Herz ansah¹⁾. Es war daher eine von Galen mit Recht verspottete Inconsequenz, wenn Schüler des Athenaios bei der Phrenesie, die auf Verletzung des *ἡγεμονικόν* beruhte, nicht die Brust, sondern den Kopf des Kranken örtlich behandelten²⁾. Übrigens waren sich die Pneumatiker hierin nicht einig. Einige von ihnen haben sich der Ansicht nicht entziehen können, daß der Kopf der Sitz der Seele (des *ψυχικόν πνεῦμα*) sei³⁾.

Da das Pneuma unsern Körper belebt und erhält, so ist von seiner Beschaffenheit das körperliche und seelische Befinden des Menschen abhängig. Völlige Unterdrückung des Pneuma führt den Tod herbei, während durch die Verderbnis desselben die verschiedenen Krankheiten entstehen und von dem Grad der Verderbnis die Schwere der Erkrankung abhängt. Die Verderbnis des Pneuma ist die Folge einer Dyskrasie der Elementarqualitäten: so erklärten sie beispielsweise die Synanche, eine der beiden Formen der Angina, dadurch, daß das Pneuma einen zu hohen Grad von Trockenheit und Wärme erlangt habe⁴⁾. Als Ursache des Asthma galt ihnen Kälte und Feuchtigkeit des Pneuma⁵⁾. Der hysterische Erstickungsanfall beruht auf einer Erkältung des Pneuma, nicht auf einer Entzündung⁶⁾. Die Darmverschlingung entsteht dadurch, daß das

1) Gal. X 929: *Ἰδὼν γοῦν ποτε τῶν ἀπ' Ἀθηναίου τινὰ τὴν κεφαλὴν αἰονῶντα ῥοδίνῳ καὶ ὅξει μεμιγμένοις ἐκώλυον ἀξιῶν ἐπιφέρειν τῷ θώρακι τὸ βοήθημα· βεβλάφθαι μὲν γὰρ τῷ παραφρονοῦντι τὸ ἡγεμονικόν, εἶναι δ' ἐν καρδίᾳ τοῦτο κατὰ τὸν Ἀθήναιον . . .* Archigenes war ihm hierin gefolgt Gal. VIII 19: *κατέγνωσται δ' ἤδη πρὸς ἀπάντων τῶν ἀνατομικῶν καὶ τὰ περὶ τοῦ τῆς ψυχῆς ἡγεμονικοῦ γεγραμμένα τοῖς ἐν τῇ καρδίᾳ νομίζουσιν ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ οἷ γε περὶ τὸν Ἀρχιγένην μήτ' ἀποστῆναι φανερώς τοῦ δόγματος ὑπομένοντες ἐξελεγχόμενον τε αὐτὸ διὰ τε πολλῶν ἄλλων ὁρῶντες, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ κατὰ τὰς θεραπειὰς τῶν φρενιτικῶν τε καὶ ληθαργικῶν, ἄνω τε καὶ κάτω τοὺς λόγους στρέφουσιν, ἄλλοτ' ἄλλα λέγοντες, εἰ καὶ μηδὲν ὅλως ἀποσαφoῦντες, οἷον ἀμέλει καὶ τὸ τρίτον ἐστὶ περὶ τῶν πεπονθότων τόπων Ἀρχιγένους.* Vgl. VIII 148f. Aret. caus. ac. II 1 p. 24f.

2) Gal. X 929. Anders Antyll bei Orib. II 333.

3) Ps.-Gal. XIX 113 p. 378, 4. XIX 467 p. 459, 11 = Aret. caus. ac. II, 7: *ὥς δὲ καὶ τῶν σοφῶν ἀφηγέονται τινες καὶ ψυχῆς ἐπιθυμίῃ τῇδε (sc. ἐν τῷ ἥπατι) ἐγκάθεται* (Plato).

4) Aret. caus. ac. I 7, 11.

5) Aret. caus. chr. I 11, 102.

6) Aret. caus. ac. II 11, 60f. Aet. XVI 68. Ps.-Gal. XIX def. 300 p. 428, 15.

Pneuma erkaltet und sich im Darm festsetzt¹⁾, bei den Milzabscessen ist der Bauch bis obenhin mit einem dicken, trüben, scheinbar feuchten Pneuma angefüllt²⁾, als Ursache der Epilepsie galt ihnen das eingeschlossene Pneuma, welches alles in Bewegung setze³⁾.

Während eine Verderbnis des Pneuma die Gesundheit schädigt, wird sie durch die Spannung (*τόνος*) des Pneuma gefördert. Der Begriff der Spannung des Pneuma spielte in ihrem System eine bedeutende Rolle. Der starke und schwache Puls wurde von Athenaios aus dem Gradunterschied der Spannung des Pneuma erklärt⁴⁾, Ringübungen und Bergsteigen wurden deshalb von ihnen empfohlen, weil dadurch eine zweckmäßige Spannung des Pneuma (*εὐτονία πνεύματος*) herbeigeführt werde⁵⁾, während andererseits die Synkope, unter der Archigenes eine Affection des Herzens verstand, deshalb so gefährlich ist, weil sie gewissermaßen eine Auflösung des *τόνος* ist⁶⁾.

Die Sinnesthätigkeiten erklärten sie wie die Stoiker mit Hilfe des Pneuma⁷⁾. Jeder der fünf Sinne hat ein besonders geartetes Pneuma, das von ihnen mit den Elementen und dem *ἄνμος* in Verbindung gesetzt wurde⁸⁾. Das Pneuma, das beim Sehakt die mechanische Vermittelung bildet, ist sehr feinteilig; das des Gehöres ist trocken, also der Erde ähnlich, das des Geruches hingegen, das in der Nase lokalisiert ist, feucht und dampfartig (*ἄνμωδης*), das für den Geschmackssinn feucht, also dem Wasser ähnlich.

Die Stimme kommt dadurch zu Stande, daß das Pneuma, das bei der Atmung in den Körper eindringt und aus demselben ausgeschieden wird, durch die Stimmapparate articuliert wird. Die ein- und ausgeatmete Luft ist also der Stoff, der von den Stimmwerkzeugen gebildet wird⁹⁾. Die verschiedene Beschaffenheit der Stimme hängt demnach von dem Zustande des Pneuma und der Stimm-

¹⁾ Aret. caus. ac. II 6, 45.

²⁾ Aret. caus. chr. I 14, 111.

³⁾ Aret. caus. ac. I 5, 5.

⁴⁾ Gal. VIII 646. 652.

⁵⁾ Antyll bei Orib. I 524. 534.

⁶⁾ Aret. caus. ac. II 3, 38. Ps.-Gal. XIX def. 265 p. 421, 1.

⁷⁾ Ps.-Gal. XIX def. 116 f. p. 379, 6 ff.

⁸⁾ Diese Anpassung der Sinne an die Elemente rührt ebenfalls von der Stoa her: vgl. Zeller III¹ 205 A. 4.

⁹⁾ Vgl. Antyll bei Orib. I 452 ff. Stein a. a. O. 130. Chrysipp bei Gal. V 288. Vgl. Ps.-Gal. XIX def. 123 p. 380, 12 f.

organe ab d. h. des Kehlkopfes, des Kehldeckels und der darüber befindlichen Teile der Mundhöhle, der Zunge, des Gaumens, der Zähne und der Lippen¹⁾. Die Höhe und Tiefe der Töne entsteht durch die Verengerung und Erweiterung des Kehlkopfes und des Halses. Bei den hohen Tönen wird der hintere Teil der Zunge kräftig nach oben gegen das Zäpfchen gedrückt und dadurch der Hals verengt, während bei den tiefen Tönen der hintere Teil sich möglichst weit vom Zäpfchen entfernt. Infolge der dadurch herbeigeführten Ausdehnung des Halses tritt eine reichliche Menge Pneuma in die Sprachorgane. Die Kraft und die Reinheit der Stimme hängt davon ab, ob eine genügende Menge von Pneuma vorhanden ist; im andern Falle kann sie niemals kräftig, laut, rein und klangvoll sein. Da das innerorganische Pneuma durch die Atmung vermehrt werden kann, so ist dafür zu sorgen, daß die Luftröhre und die Poren, durch welche die Luft in den Körper tritt, die Fähigkeit erhalten, sich möglichst weit auszudehnen. Je enger die Poren sind, desto schwächer ist die Stimme; sie wird um so kräftiger, je weiter sie sind. Daraus erklärt sich auch, daß Knaben, Weiber und Eunuchen eine schwächere Stimme haben als die Männer.

Die Sprache galt ihnen als ein wichtiges Förderungsmittel der Gesundheit, weil sie die innere Wärme vermehrt, reinigt, kräftigt, verdünnt und die einzelnen Bestandteile des Organismus fest, stark, rein und widerstandsfähig macht²⁾. Außerdem wird durch sie das Übermaß von Feuchtigkeit, Kälte, Trockenheit und Wärme im Körper verhütet und auf das richtige Temperaturverhältnis herabgedrückt³⁾.

Genauer sind wir über die pneumatische Lehre von der *ἐνζαασία* unterrichtet⁴⁾. Diese Lehre hat die Unterscheidung von

¹⁾ Orib. I 453.

²⁾ Orib. I 448. Vgl. Plut. de sanit. tuenda (153 D), dessen Darstellung aus einer stoischen Vorlage geflossen ist. Denn einmal ist ihre Verwandtschaft mit Antyll unverkennbar, andererseits trägt die Definition, die er von *φωνή* giebt, ganz deutlich stoisches Gepräge.

³⁾ Orib. I 460f. Beim Schwindel (*σκότωμα*) empfahl Archigenes Stimmübungen, aber lieber in tiefen Tönen als in hohen, weil durch die hohen Töne der Kopf zu sehr angespannt wird (Aret. cur. m. chr. I 3, 305). Ebenso verordnete er sie in der Elephantiasis als passende Übung des *πνεῦμα* (Aret. cur. m. chr. II 13, 345).

⁴⁾ Die von Stein a. a. O. 175 ausgesprochene Vermutung, daß diese Lehre auf Chrysipp zurückgehe, wird durch den im Vorhergehenden geführten

wirkenden und leidendlichen Qualitäten zur Voraussetzung. Durch die Vereinigung je einer wirkenden und einer leidenden Qualität ergaben sich im ganzen vier mögliche Qualitätenverbindungen: Wärme-Trockenheit, Wärme-Feuchtigkeit, Kälte-Trockenheit, Kälte-Feuchtigkeit¹⁾. Die Verbindungen von Wärme und Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit sind unmöglich²⁾, da sich diese Qualitäten gegenseitig ausschließen. Sie bekämpften die Ansicht einiger Ärzte, welche nur zwei von diesen Verbindungen für möglich hielten, nämlich die des Kalten und Feuchten und die des Warmen und Trockenen, mit der Begründung, daß durch die überwiegende Wärme im menschlichen Körper die Feuchtigkeit und durch die überwiegende Kälte die Trockenheit aufgehoben, also im ersten Falle Trockenheit, im zweiten Feuchtigkeit herbeigeführt werde³⁾. Was die Bezeichnung anlangt, so nannten sie einen Körper warm, kalt, feucht, trocken, wenn die betreffende Qualität in ihm vorherrscht⁴⁾. Sie unterschieden eine normale und verschiedene abnorme Mischungen. Als normale Mischung (*εὐκρατον*) galt ihnen die Verbindung von Wärme und Feuchtigkeit⁵⁾. Einige Pneumatiker gingen sogar soweit, zu behaupten, daß die Verbindung dieser beiden Qualitäten niemals Krankheit erzeugen könne⁶⁾: das geschehe durch die drei anderen

Beweis der Abhängigkeit der pneumatischen Physiologie von ihm zur Gewissheit erhoben.

1) Gal. XIV 698. I 518. Vgl. Zeller III¹ S. 131 f. 184. Galen behandelt die Lehre von der Mischung der vier Elementarqualitäten im 1. Buch seiner Schrift *περὶ κράσεων* (I 509 f.), wie sie von den *χαριέστατοι τῶν πρὸ ἡμῶν ἱατρῶν τε καὶ φιλοσόφων* vorgetragen war mit besonderer Polemik gegen ihre Ansicht von der *εὐκρασία*. Da er (522) ausdrücklich den Athenaios und seine Schule als Vertreter dieser Ansicht nennt, so ist kein Zweifel, daß unter den *χαριέστατοι ἱατροί* die Pneumatiker und unter den *φιλόσοφοι* ihre Quellen, Aristoteles und die Stoa, die er ebenfalls in diesem Zusammenhang erwähnt (523), zu verstehen sind.

2) Gal. I 518.

3) Gal. I 511 ff.

4) Gal. I 463.

5) Gal. I 520 ff.

6) Gal. I 522: *πρὸς δὴ τοὺς τοιούτους λόγους ἀπομαχόμενοι τινες τῶν ἀπ' Ἀθηναίου τοῦ Ἀπταλέως ὁμόσε χωροῦσιν, οὔτε κατάστασιν ὑγρὰν καὶ θερμὴν μέμφεσθαι λέγοντες, οὔθ' εὐρεθῆναι τι νόσημα φάσκοντες ὑγρὸν καὶ θερμὸν, ἀλλὰ πάντως ἢ θερμὸν καὶ ξηρὸν ὑπάρχειν, ὡς τὸν πυρετὸν, ἢ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν, ὡς τὸν ὕδρον, ἢ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν, ὡς τὴν μελαγχολίαν. ἐπιμέμνηται δ' ἐνταῦθα καὶ τῶν ὥρων τοῦ ἔτους, ὑγρὸν μὲν καὶ ψυχρὸν εἶναι τὸν χειμῶνα φάσκοντες, ξηρὸν δὲ καὶ θερμὸν τὸ θέρος, καὶ ψυχρὸν*

Qualitätenverbindungen. So werde Fieber durch die Verbindung von Wärme und Trockenheit¹⁾, die Wassersucht durch die Verbindung von Kälte und Feuchtigkeit²⁾ und die Melancholie durch die Verbindung von Kälte und Trockenheit³⁾ hervorgerufen.

Die *δυσκρασία* d. h. die Abweichung von der normalen Mischung entsteht dadurch, daß eine der vier Qualitäten in übermäßiger Weise (*ἀμέτρως*) vorherrscht⁴⁾; dadurch wird zunächst Krankheit, und wenn das Übermaß der Qualität zunimmt, schließlich der Tod herbeigeführt. Sie unterschieden acht Dyskrasien: vier einfache (*ἀπλαῖ δυσκρασίαι*), bei denen nur je eine Qualität vorherrscht, und vier zusammengesetzte (*σύνθετοι*), bei denen ein Übermaß von Wärme und Kälte mit mehr Feuchtigkeit oder Trockenheit verbunden ist⁵⁾.

καὶ ξηρὸν τὸ φθινόπωρον, εὐκρατον δ' ἅμα καὶ θερμὴν καὶ ὑγρὰν ὥραν καλοῦσι τὸ ἔαρ· οὕτω δὲ καὶ τῶν ἡλικιῶν τὴν παιδικὴν εὐκρατόν τε καὶ θερμὴν καὶ ὑγρὰν εἶναί φασι. δηλοῦσθαι δὲ τὴν εὐκρασίαν αὐτῆς νομίζουσι καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῆς φύσεως, ἐρῶμενων τηρικαῦτα μάλιστα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸν θάνατόν φασιν εἰς ξηρότητα καὶ ψύξιν ἄγειν τὰ τῶν ζώων σώματα. καλεῖσθαι γοῦν ἀλίβαντας τοὺς νεκροὺς, ὡς ἂν μηκέτι λιβάδα καὶ ὑγρότητα κεκτημένους οὐδεμίαν, ἐξατμισθέντας ἅμα διὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ θερμοῦ καὶ παγέντας ὑπὸ τῆς ψύξεως. ἀλλ' εἶπερ ὁ θάνατος, φασί, τοιοῦτος, ἀναγκαῖον ἤδη τὴν ζωὴν, ὡς ἂν ἐναντίαν ὑπάρχουσιν αὐτῷ, θερμὴν τε εἶναι καὶ ὑγρὰν· καὶ μὴν εἶπερ ἡ ζωὴ, φασί, θερμόν τι χοῦμα καὶ ὑγρόν ἐστιν, ἀνάγκη πᾶσα, καὶ τὴν ὁμοιοτάτην αὐτῇ κράσιν ἀρίστην ὑπάρχειν· εἰ δὲ τοῦτο παντί που δῆλον ὡς εὐκρατοτάτην, ὥστ' εἰς ταῦτόν συμβαίνειν ὑγρὰν καὶ θερμὴν φύσιν εὐκράτῳ, καὶ μηδὲν ἄλλο εἶναι τὴν εὐκρασίαν ἢ τῆς ὑγρότητός τε καὶ θερμότητος ἐπικρατούσης. οἱ μὲν δὴ τῶν ἀμφὶ τὸν Ἀθηναίων λόγοι τοιοῖδε. δοκεῖ δὲ πως ἡ αὐτὴ δόξα καὶ Ἀριστοτέλους εἶναι τοῦ φιλοσόφου καὶ Θεοφράστου γε μετ' αὐτὸν καὶ τῶν Στωϊκῶν ... Nach einigen Pneumatikern beruhte die Gesundheit auf der εὐκρασία dieser Elementarqualitäten: Ps.-Galen XIX def. 79 p. 382, 8: ἡ ὑγίειά ἐστιν εὐκρασία τῶν τεσσάρων πρώτων στοιχείων, ἐξ ὧν τὸ σῶμα συνέστηκε, θερμοῦ, ψυχροῦ, ὑγροῦ, ξηροῦ.

¹⁾ Gal. a. a. O. Ps.-Gal. XIX def. 185 p. 398, 14f.

²⁾ Gal. a. a. O. Aret. caus. chr. II 1 p. 125, 2: ἔστι δὲ ἐς ἐπομβρίην ῥεῦμα ψυχρὸν, παχὺ, ὁκοῖον ἢ ὁμίχλη τῷ παντί· ἢ τροπὴ ὑγρῆς καὶ ψυχρῆς αἰτίας, ἐς τοιήνδε ἔξιν ἐτεροιοῦσης τὸν ἄνθρωπον.

³⁾ Gal. a. a. O. Vgl. Aret. caus. chr. I 5 p. 74 ff.

⁴⁾ Gal. I 521.

⁵⁾ Gal. VIII 149: ἐξήτουν δ' ἐγνωκέναι, τίνα δυσκρασίαν αὐτῆς (sc. des Gedächtnisschwundes) αἰτίαν ἡγεῖται (sc. Ἀρχιγένους) εἶναι τοῦ πάθους. οὐδὲ γὰρ ὅτι δυσκρασίαν τινὰ εἶναι νενόμιζεν, ἡμφίβαλλον, εἰδὼς τὴν αἵρεσιν τοῦ

Es ist bezeichnend für die Geschlossenheit des pneumatischen Systems, daß mit diesen vier Qualitätenverbindungen die Verschiedenheit alles Seienden erklärt wurde. Wie die verschiedenen Geschlechter, so haben auch die verschiedenen Lebensalter und Jahreszeiten ihre besondere Qualitätenmischung. Das weibliche Geschlecht ist von Natur kalt und feucht¹⁾, das männliche warm und trocken²⁾. Von den verschiedenen Lebensaltern ist das Knabenalter warm und feucht³⁾. Es ist also das Alter der normalen Mischung, die sich äußerlich bei dieser Altersstufe in dem hohen Grad von physischer Kraft offenbart⁴⁾. Dem Alter, das dem Tode am nächsten steht, eignet Kälte und Trockenheit⁵⁾; da diese Qualitätenverbindung den Tod herbeiführt, so muß die entgegengesetzte, die Verbindung von Wärme und Feuchtigkeit, die Quelle des organischen Lebens sein⁶⁾. Allerdings waren die Pneumatiker hinsichtlich der Qualitätenverbindung des Alters geteilter Meinung, indem einige Ärzte dieser Schule⁷⁾ an die Stelle der Trockenheit die

ἀνδρός· ἀλλ' ἐπειδὴ δυσκρασίας ἦδεν ὁκτὼ καθ' ἕκαστον μέρος συνισταμένης, τέτταρας μὲν ἀπλᾶς, τέτταρας δὲ συνθέτους, ἐπεθύμουν γινῶναι, τίνα τούτων ὁ Ἀρχιγένης ἀπεφάνηται τῆς βεβλαμμένης ἐνεργείας αἰτίαν εἶναι, πότερα ψύξιν ἢ ὑγρότητα τοῦ κατὰ τὴν καρδίαν πνεύματος ἢ σύνθετον ἐκ ψύξεως τε καὶ ὑγρότητος, ἢ ξηρότητα μετὰ ψύξεως ὑπολαμβάνει δύνασθαι τὸ πάθος ἐργάσασθαι τοῦτο . . . Vgl. Gal. VI 69. 384. IX 331. X 462. XIII 124. Galen ist in dieser Theorie völlig von der pneumatischen Schule abhängig.

1) Athenaios bei Orib. III 97: Τὸ κατεψυγμένον τῶν γυναικῶν καὶ κάθυγρον τῆς συστάσεως διορθωτέον τῇ θερμότερᾳ καὶ ξηροτέρᾳ διαίτῃ. Aret. caus. ac. m. I 6 p. 7: γυναῖκες δὲ ἀνδρῶν σπῶνται μὲν μᾶλλον, ὅτι ψυχραί· ἀτὰρ αἶδε περιγίγνονται μᾶλλον (beim Tetanus), ὅτι ὑγραί. Vgl. Aret. caus. chr. m. I 11 p. 102: εὐπαθέες δὲ γυναῖκες (beim Asthma) ἀνδρῶν μᾶλλον, ὅτι περ ὑγραί τε καὶ ψυχραί.

2) Gal. IV 634. 631.

3) Athenaios bei Gal. I 522. Aret. caus. ac. m. I 9, 18: πλεῖστον γὰρ τὸ θερμὸν ἐν τοιτέοισι (sc. παιδίοις ἄχρως ἡβης). Ps.-Gal. XIX def. 104 p. 374, 2.

4) Gal. a. a. O.

5) Diese Ansicht vertrat Archigenes nach Aret. caus. ac. m. I 6 p. 7: αἰτία γὰρ (sc. des Tetanus) ψύξις καὶ ξηρότης γήραος καὶ θανάτου ἢ φύσις. Gal. I 582.

6) Gal. I 522.

7) Gal. I 580 f. Ps.-Gal. XIX def. 104 p. 374, 3. Athenaios selbst gehörte zu den Vertretern dieser Meinung. Vgl. Orib. III 183 mit Gal. I 522. Act. III 162.

Feuchtigkeit setzten. Diese Abweichung erklärt sich daraus, daß sie die Qualitätenverbindung nach den überflüssigen Nahrungssäften und nicht nach den Körperteilen bestimmten. Die Qualitätenverbindung der ἀκμάζοντες ist Wärme und Trockenheit¹⁾; strittig war, ob ihnen oder dem Knabenalter mehr Wärme zukomme. Als Qualitätenmischung für das Mannesalter (παρακμάζοντες oder μέσοι) blieb demnach nur noch die Verbindung von Feuchtigkeit resp. Trockenheit und Kälte übrig²⁾.

Von den Jahreszeiten ist der Frühling diejenige, welche die Eukrasie am meisten befördert, da ihm Feuchtigkeit und Wärme eigen ist³⁾. Der Sommer ist die trockene und warme Jahreszeit, der Herbst die kalte und trockene resp. feuchte, der Winter endlich die kalte und feuchte⁴⁾ resp. trockene. Sie verglichen die Qualitätenverbindungen der Jahreszeiten mit derjenigen der Lebensalter, indem sie das Knabenalter dem Frühling, das Jünglingsalter dem Sommer, das Mannesalter dem Herbst und das Greisenalter dem Winter entsprechen ließen⁵⁾.

In jeder Jahreszeit unterschieden sie wieder Anfang, Mitte und Ende und behaupteten, daß die Mitte der Jahreszeit die ihr eigentümliche Qualitätenmischung am reinsten darstelle, während Anfang und Ende derselben sich der Qualitätenmischung der zunächst stehenden Jahreszeit angleiche⁶⁾.

Dem Monde schrieben sie großen Einfluß auf die Luftbeschaffenheit innerhalb der einzelnen Monate zu. Im ersten Viertel vom Neumond bis zum 7. Tage ist sie warm und feucht, im zweiten Viertel bis zum Vollmond warm und trocken, im dritten kalt und trocken, im vierten endlich kalt und feucht⁷⁾. Ebenso weisen Tag

¹⁾ Gal. I 583. Ps.-Gal. XIX a. a. O.

²⁾ Athenaios bei Orib. III 165: *Τοῖς δὲ παρακμάζουσιν ἀρμόζει δίαιτα ὑφειμένη καὶ ψυχῆς καὶ σώματος . . καὶ τὰς τροφὰς ἐκ προσαγωγῆς συστατέον, τῆς ἕξως αὐτῶν ἀρχὴν ψύξεως λαμβανούσης.* Ps.-Galen XIX a. a. O. Vgl. Gal. XV 187. XVI 101. Ideler a. a. O. I 303.

³⁾ Gal. I 522. Athenaios bei Aet. III 162 = Antyll bei Orib. II 287. Vgl. S. 113.

⁴⁾ Gal. a. a. O.

⁵⁾ Gal. a. a. O. Ps.-Gal. XIX def. 104 p. 374, 2 f.

⁶⁾ Athenaios bei Aet. III 162. Antyll bei Orib. a. a. O. Vgl. Macrob. comment in somn. Scip. I 6, 54 ff.

⁷⁾ Athenaios a. a. O. Antyll a. a. O.

und Nacht in ihren verschiedenen Abschnitten diese vier Qualitätenverbindungen auf.

Auch in den vier Cardinalsäften, welche den Körper erfüllen, dem Blut, dem Schleim, der gelben und schwarzen Galle treten die Qualitäten in combinierter Weise zu Tage: in dem Blut Wärme und Feuchtigkeit, in dem Schleim Kälte und Feuchtigkeit, in der gelben Galle Wärme und Trockenheit, in der schwarzen Galle Trockenheit und Kälte¹⁾. Von den Fieberarten, die in den Säften des Körpers ihren Sitz haben, hat das Quotidianfieber (*ἀμφημερινὸς πυρετός*) den Schleim zum Krankheitsstoff, wird also durch Kälte und Feuchtigkeit hervorgebracht, das Tertianfieber (*τριταῖος πυρετός*) durch Wärme und Trockenheit, da es in der gelben Galle seinen Sitz hat und das Quartanfieber (*τεταρταῖος πυρετός*) durch Kälte und Trockenheit, da die schwarze Galle der Sitz desselben ist²⁾.

In der Entwicklungslehre schloß sich Athenaios aufs engste an Aristoteles³⁾ an, vermutlich nach dem Vorgange der Stoa, die bekanntlich seit der Zeit des Antiochos unter Aufgabe der Unterscheidungslehren der älteren Stoiker sich der platonisch-aristotelischen Philosophie anzunähern bemüht war.

Zur Zeugung eines Wesens gehört zweierlei, ein Thätiges und ein Leidendes. Das Thätige ist der männliche Zeugungsstoff, insofern er die bewegende und bildende Kraft ist, das Leidende ist der weibliche Zeugungsstoff, weil er den stofflichen Bestandteil des Embryo hergiebt⁴⁾. Diese strenge Scheidung beider Principien begründete Athenaios ebenso wie Aristoteles damit, daß in einem

¹⁾ Ps.-Gal. XIX def. 65 p. 363, 14 ff.

²⁾ Vgl. Gal. VII 333 ff. Diese Lehre ist pneumatisch und als ihr Gewährsmann ist nach meiner Beweisführung Athenaios resp. Archigenes anzusehen.

³⁾ Zeller II² 524 ff.

⁴⁾ Gal. IV 611f: ἐν δὲ τοῖς ζώοις ἡ μὲν ὑποβεβλημένη πρὸς τὴν γένεσιν αὐτῶν οὐσία τὸ καταμήνιον ἐστὶ μόνον, ὡς Ἀριστοτέλης ἔλεγεν· ἡ δὲ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτῇ γίνεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ὁ Ἀθήναιος ὡσαύτως Ἀριστοτέλει τὴν μὲν ὕλην τῆς τοῦ ζώου γενέσεως ἐν τῷ καταμηνίῳ τίθεται, τὴν κινουσαν δὲ αὐτὸ δύναμιν ἐν τῷ τοῦ ἄρρενος σπέρματι. Vgl. Arist. gen. anim. I 2, 717 a 4 c. 20. 729 a 9.

Wesen nicht Form und Stoff zugleich sein könne¹⁾, dafs also das Weib unmöglich zugleich ein *περίττωμα σπερματικόν* und *αἱματικόν* haben könne. Er billigte also die Ansicht des Aristoteles, dafs das Weib keinen Samen bei der Begattung von sich gebe wie der Mann. Dagegen gab er ausdrücklich zu, dafs bei den Pflanzen beide Principien nicht getrennt, sondern in ein und derselben Pflanze vereinigt seien²⁾. Der männliche Zeugungsstoff ist wirklicher Same und gleichsam der Baumeister³⁾, der den Embryo gestaltet und formt, während der weibliche Samen, der sich in den Katamenien aus dem Körper aussondert⁴⁾, kein wirklicher Same ist⁵⁾. Es war daher nur eine folgerichtige Consequenz, wenn er die Behauptung aufstellte, dafs die Eierstöcke des Weibes ebenso wie die Brustdrüsen des Mannes nur dem Zweck der Harmonie der Körperteile beider Geschlechter dienen⁶⁾, da sie ihre *ἐνέργεια* nicht bewahrt

1) Gal. IV 621: οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀθήναιον ἔμπαιιν ἐχρήσαντο τῷ λόγῳ· διὰ τοῦτο γὰρ οὐκ εἶναι φασὶ τῷ θήλει περίττωμα σπερματικόν, ὅτι τὸ αἱματικόν ἔχει· δύο δ' οὐκ ἦν αὐτῷ περιτιώματα γενέσθαι. προστιθέασι δ' ἐνίοτε τῷ λόγῳ καὶ ὡς οὐχ οἷόν τε ἔστιν ἐν ζῶον ἀμφοτέρως ἔχειν ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς τοῦ γεννηθησομένου, τὴν τε ὕλην καὶ τὴν δύναμιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐκ οἶδ' ὅπως οἱ πλανώμενοι πάλιν αὐτοὶ κατὰ τὰ φυτὰ μὴ διακεκρίσθαι φασὶ τὰς ἀρχὰς τῆς γενέσεως, ἀλλ' ἀμφοτέρως ἐν αὐτοῖς εἶναι καὶ τὰς ὡς ὕλης καὶ τὰς ὡς δυνάμεως.

2) Gal. IV 621. Vgl. die vorhergehende Anmerkung.

3) Gal. IV 602: μέμνηται μὲν γὰρ καταμηνίων (sc. οἱ Πνευματικοί, insbesondere Athenaios), ὕλην οἰκείαν θέμενοι τῇ κυουμένῳ, τὸ δὲ σπέρμα δημιουργὸν αὐτοῦ, ἀνατεινόμενοι τε πολλὰ τῷ λόγῳ πρὸς τοὺς ἀφ' ὅλου τοῦ σώματος ἔρχεσθαι τὸ σπέρμα φάσκοντας καὶ δείξαντες, ὡς οὐχ ὁρῶσιν οὗτοι τὸν τε κοσμήσαντα καὶ τάξαντα τὸ παραγινόμενον, αὐτό τε φάμενοι τὴν ἐν τῷ σπέρματι δύναμιν εἶναι τοῦτο, διαπλάττουσάν τε καὶ μορφοῦσαν τὸ κύημα, μικρὸν ἴστερον ἐπιλαθόμενοι τούτων οὐκ αἰσθάνονται τοσαύτας τῇ ὕλῃ διδόντες δυνάμεις, ἃς ἔμπροσθεν ἐδίδοσαν τῷ δημιουργῷ. Vgl. Arist. gen. anim. I 22, 730 b.

4) Gal. IV 612.

5) Ps.-Plut. Placita V, 5, 2: Ἀριστοτέλης καὶ Ζήνων ὕλην μὲν ὑγρὰν προΐεσθαι (sc. τὰς θηλείας), οἷονεὶ ἀπὸ τῆς συγγυμνασίας ἰδρωτάς, οὐ μὴν σπερματικόν. Die Stoa teilte die Ansicht des Aristoteles.

6) Gal. IV 599: δι' ὃ καὶ Ἀθήναιος ἀπίθανός ἐστι φάσκων, ὥσπερ τοῖς ἄρῳεσι τοὺς τιτθοὺς, οὕτω καὶ τοῖς θήλεσι τὰ σπερματικὰ διακεῖσθαι μόρια, αὐτῆς μόνης τῆς ἀναλογίας τῶν μορίων ἐν τῇ πρώτῃ διαπλάσει γενομένης, οὐ μὴν τῆς γε ἐνεργείας φυλαχθείσης.

haben. Über den Ursprung des Samens teilte er die Ansicht des Aristoteles, daß er nicht durch Ausscheidung verbrauchter Stoffe aus den organischen Teilen des Körpers, sondern aus dem verkochten Blut entstehe¹⁾ und widerlegte die Meinung älterer Philosophen und Ärzte wie z. B. des Demokrit²⁾, des Hippokrates und Praxagoras³⁾, daß der Samen sich aus allen Teilen des Körpers aussondere⁴⁾. Da die Katamenien den Stoff hergeben, so bewirken sie die Entwicklung des Keimes zu einem Wesen derselben Gattung wie das ist, von dem sie herkommen, während der männliche Same den Keim bildet⁵⁾, nicht nur hinsichtlich seiner Gestalt, sondern auch hinsichtlich seiner Größe, der Lage und Verbindung seiner einzelnen Teile⁶⁾. Die Ähnlichkeit der Kinder mit der Mutter erklärte er aus der ihnen von der Mutter zugeführten Nahrung⁷⁾ und berief sich zur Stützung dieser Ansicht auf die Veränderungen, welche die Nahrung bei Tieren und Pflanzen hervorzubringen vermag. Weiter führte er die Thatsache an, daß Bastarde nach der

1) Gal. IV 626: καὶ ἦν ἡμῖν ὁμολόγημα κοινὸν τοῦτο πρὸς Ἀριστοτέλη καὶ Ἀθήναιον, ἐκ τῆς τοῦ αἵματος πέψεως τὴν γένεσιν αὐτῶ τιθεμένους, οὐκ ἐκ τῆς ἀπάντων τῶν τοῦ ζώου μορίων ἀποτήξεως κτλ. Arist. gen. anim. I c. 17—20.

2) Ps.-Plut. Placita V, 3, 6. Arist. gen. anim. I 32, 721 b. IV 1. Censor. V 2.

3) Ps.-Gal. XIX def. 439 p. 449, 15.

4) Gal. IV 602. 626.

5) Gal. IV 612.

6) Gal. IV 605: λέγω δὲ τὸ μὴ μόνον ἐγγίνεσθαι τῇ ὕλῃ τὸ εἶδος, ἐξ οὗ γίνεται τὸ μὲν ἄνθρωπος, τὸ δὲ δρυς ἢ πλάτανος ἢ κυτὸς, ἀλλὰ καὶ τὴν μορφὴν αὐτὴν ὑπὸ τοῦ σπέρματος τὴν ὕλην διαπλάττοντος ἀποτελεῖσθαι. στοχάζεσθαι δ' αὐτό φασι κατὰ τὴν μόρφωσιν οὐ τοῦ σχήματος μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς θέσεως ἐκάστου τῶν μορίων, ἔτι τε τῆς πρὸς ἄλληλα συμφύσεως.

7) Gal. IV 603: τὰ δ' ὁμοιούμενα παῖδια τῇ μητρὶ διὰ τὴν τροφήν ὁμοιοῦσθαι φασι, καὶ περὶ ἐντεῦθεν ἀποτείνουσι δολιχὸν τοῦ λόγου, δεικνύν-τες, ὅσαι διὰ τροφῆς ἀλλοιώσεις ἐγίνοντο καὶ ζώοις καὶ φυτοῖς. εἴτ' οὐκ αἰσθάνονται μηδεμίαν ὧν λέγουσιν ἀλλοιώσεων ἐπιδεῖξαι δυνάμενοι τὸ εἶδος ἐξαλλάττουσαν. αὐτίκα γὰρ τὸ Περσαῖον φυτὸν εἰς Αἴγυπτον μετακομισθὲν <οὐκ> ἐξηλλάγη τὴν ἰδέαν, ἀλλὰ χρηστῆς ἐπιλαβόμενον τροφῆς τὸν καρπὸν ἐδώδιμον ἔσχεν, οὐκ ὃν πρότερον τοιοῦτο· οὔτε τὰ πρόβατα μεταστάντα ποτὲ εἰς νομὴν ἑτέραν ταῖς ἔμπροσθεν αἰξὶν ὁμοιωθῆ, καθάπερ οὐδ' αἶγες προβάτοις ἢ ὄνοις καὶ ἵπποις. Vermutlich spielte das von Galen angeführte Beispiel von der περσέα auch in seiner Beweisführung eine Rolle. Vgl. Gal. VI 617. XII 569. Schol. Nic. Ther. 764. Fleckeisen Jahrb. LXXXVIII 5, 155.

Mutter umschlagen wie Pflanzen nach dem ernährenden Boden¹⁾. Das Junge, das durch Kreuzung einer Stute und eines Esels entstehe, nehme nicht das Aussehen eines Esels an, sondern werde ein Mittelding aus beiden, ebenso alle Bastarde aus Hund und Fuchs²⁾; er behauptete sogar, dafs das Junge in diesem Falle mehr von dem Weibchen als von dem Männchen an sich habe. So entstehe durch Kreuzung eines Schafes und eines Ziegenbockes ein Junges von der Art des Weibchens, das von dem Männchen nur die Art der Behaarung annehme; analoges trete bei der Kreuzung von Bock und Ziege ein. Trotzdem gab er inconsequenter Weise bei der Behandlung der Frage nach der Ähnlichkeit des Erzeugten mit der Mutter ausdrücklich zu, dafs der weibliche Zeugungsstoff auch Gestaltungskraft (*δύναμις*) besitze³⁾. In der Frage der Entstehung der ver-

¹⁾ Arist. gen. anim. II 738 b.

²⁾ Gal. IV 603: ἐν μέντοι ταῖς ἐπιμιξίαις τῶν ἐτερογενῶν ζώων αὐτὸς Ἀθήναιος ὁμολογεῖ προσγίνεσθαι τι τῷ κυνόμενῳ παρὰ τῆς μητρὸς, οὐκ εἰς τὴν τῆς χροίας ὑπάλλαξιν ἢ λεπτότητος ἢ παχύτητος ἢ εὐφωνίας ἢ τινος ἐτέρου τοιούτου· μικρὰ γὰρ ταῦτα καὶ τῆς ὕλης μόνης αὐτοῦ κατὰ τὸ ζῶον εἶδους εἶναι τὰ πάθη. τὰ δ' ἀπὸ τῆς μητρὸς ὅλον ἐξαλλάττει τὸ εἶδος. εἰ μὲν ὄνου σπέρμα ταῖς μήτραις ἵππος ὑποδέξεται, τὰ κνήματα οὐ τὸ τοῦ πατρὸς εἶδος μόνον ἴσχονται, ἀλλ' ἐξ ἀμφοτέρων τῶν γειναμένων μικτόν· εἰ δ' ἀλώπηξ κυνὸς, κἀνταῦθα τοῦ γεννωμένου μὴ κυνὸς, ἀλλὰ μικτοῦ τινος ἐξ ἀμφοῖν γενῶν ἀποτελουμένου. καὶ μὲν γε καὶ μεῖζον ἔτι τοῦ γε κατὰ τὸ ἔβδομον βιβλίον, ὅπερ ἐστὶ περὶ σπέρματος, αὐτῷ προσομολογεῖ ὁ Ἀθήναιος, οὐκ οἶδ' ὅπως οὐκ αἰσθάνεται. πλέον γὰρ ἔχειν φησὶ παρὰ τῆς μητρὸς ἢ τοῦ πατρὸς τὸ γεννώμενον, οἷον ἀφ' ἵππου μὲν τὸ ἡμίονον πλέον ἢ τοῦ ὄνου, ὥσπερ δὲ κἀπειδὴν ἀλώπηξ κυνὶ μιχθῇ, τὸ γεννηθέν, εἰ μὲν ὁ κύων ἄρῃην ὑπάρχει, τὸ τῆς ἀλώπεκος ἴσχει εἶδος, εἰ δ' ἀνάπαλιν εἰς τὴν τοῦ κυνὸς ιδέαν μεταπίπτει τὸ ἔγγονον, ὡς γίνεσθαι τὸ μὲν ἐξ ἀλώπεκος ἀλώπεκα κυνοειδῆ, τὸ δ' ἐκ κυνὸς ἀλωπεκοειδῆ κύνα. καὶ γὰρ εἰ πρόβατον τράγος ὀχεύσειε, πρόβατον γεννᾶσθαι φησι σκληρότριχον· εἰ δ' ἔμπαλιν αἶγα κριὸς μαλακότριχον, ὡς οὐδὲν ἦττον εἰς τὴν ιδέαν τοῦ γινομένου συντελεῖσθαι τι παρὰ τῆς μητρὸς, ἀλλὰ καὶ πλέον ἢ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐχρῆν δὲ μὴ ὅτι πλέον ἐκ τῆς μητρὸς εἶναι τοῖς ἐγγόνοις, ἀλλὰ μηδὲ τὸ ἔλαττον. Vgl. Arist. gen. anim. II 738 b.

³⁾ Gal. IV 613: κατὰ γὰρ τοι τοῦτον τὸν λόγον οὐ μόνον ὕλη τοῦ γεννηθησομένου τὸ αἷμα γίνοιτ' ἂν, ἀλλὰ καὶ σπέρμα δυνάμει. φαίνεται δὲ καὶ Ἀθήναιος ἐπὶ τοῦτον ἀφικνούμενος ἐξ ἀνάγκης τὸν λόγον ὕστερον, ἥνίκα ζητεῖ, πῶς ὁμοιοῦται τῇ μητρὶ τὸ ἔγγονον, ἀληθὲς μὲν τι λέγων, οὐ μὴν ἑαυτῷ ὁμολογούμενον, ὡς αὐθις δείξω. Vgl. IV 602.

schiedenen Geschlechter widerlegte er die Ansichten des Empedokles¹⁾ und Straton²⁾ und vereinigte die Annahme des Empedokles³⁾, daß die Knaben als die Wesen von größserer Lebenswärme sich schneller im Uterus entwickeln als die Mädchen, weil sie aus der rechten d. h. der wärmeren Seite des Uterus stammen, mit seiner Qualitäten-theorie in der Weise, daß er die Wärme und Feuchtigkeit der Gebärmutter als Grund für die Entwicklung des Foetus zum Knaben, die Kälte und Feuchtigkeit dagegen als Grund für die Entwicklung zum Mädchen annahm. Auch über die Entwicklung des Embryo hatte er im Anschluß an Empedokles Betrachtungen angestellt⁴⁾. Die Bildung desselben erfolge nach 40 Tagen; am neunten Tage heben sich einige blutige Umriss ab, nach 18 Tagen zeigen sich fleischige und sehnige Klumpen geronnenen Blutes und der Puls sei fühlbar. Nach 27 Tagen zeigen sich in einer schleimigen Haut schwache Spuren des Rückgrats und Kopfes, nach 36 oder 40 Tagen habe sich endlich die Gliederung der Frucht vollzogen.

1) Gal. IV 616 f.

2) Gal. IV 629.

3) Orib. III 79: Συμφωνεῖ δὲ τοῖς χρόνοις τῆς παντελοῦς τῶν ἐμβρύων διακρίσεως καὶ ὁ φυσικὸς Ἐμπεδοκλῆς καὶ φησιν, ὅτι θᾶπτον διαμορφοῦται τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος καὶ τὰ ἐν τοῖς δεξιοῖς τῶν ἐν εὐωνύμοις. Vgl. Gal. IV 631. 633. Vgl. S. 103.

4) Orib. III 78: περὶ διαμορφώσεως. ἐκ τῶν Ἀθηναίου. Ἡ δὲ πρώτη διαμόρφωσις τῶν ἐμβρύων διασημαίνει περὶ τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας· ἕως μὲν γὰρ θ' ἡμερῶν οἷον γραμμαὶ τινες αἱματώδεις ὑποφέρονται· περὶ δὲ τὰς ὀκτωκαίδεκα θρόμβοι σαρκώδεις καὶ ἰνώδη τινὰ διασημαίνεται, καὶ σφυγμὸς ἐν αὐτοῖς εὐρίσκεται ὁ τῆς καρδίας. Περὶ δὲ τὰς τρεῖς ἐννεάδας, ὡς φησιν ὁ Διοκλῆς, ἐν ὑμένι μυζώδει γίνεται φανερώς ἀμυδρὸς ὁ τύπος τῆς ῥάχεως καὶ ὁ τῆς κεφαλῆς. Περὶ δὲ τὰς τέσσαρας ἐννεάδας ὁρᾶται πρῶτον διακεκριμένον ὅλον τὸ σῶμα ἢ τὸ τελευταῖον, μιᾶς προστεθείσης τετραδος, περὶ τὴν τεσσαρακοντάδα. Συμφωνεῖ δὲ τοῖς χρόνοις τῆς παντελοῦς τῶν ἐμβρύων διακρίσεως καὶ ὁ φυσικὸς Ἐμπεδοκλῆς . . . Das Diokles-citat stammt aus seiner Schrift περὶ γυναικείων, vgl. Gal. XVII A 1006. Macrob. com. in somn. Scip. I 6, 65: *Straton Peripateticus et Diocles Carystius per septenos dies concepti corporis fabricam hac observatione dispensant ut hebdomade secunda credant guttas sanguinis in superficie folliculi, de quo diximus, apparere, tertia demergi eas introrsum ad ipsum conceptionis humorem, quarta humorem ipsum coagulari ut quiddam velut inter carnem et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat, quinta vero interdum fingi in ipsa substantia humoris humanam figuram magnitudine quidem apīs, sed ut in illa brevitale membra omnia et designata totius corporis lineamenta consistent.*

Die Absonderung des Samens beginnt nach seiner Meinung mit dem 14. Lebensjahre¹⁾: zeugungsfähig wird er schon im 18. Lebensjahre, bei den meisten aber erst im 27. Vom 63. Lebensjahre an verliert er seine Zeugungsfähigkeit und hört schliesslich ganz auf.

2.

Pathologie.

Von den pathologischen Theorieen dieser Schule ist uns bis auf Archigenes wenig überliefert. Wir erfahren gelegentlich²⁾, dass Athenaios eine besondere Art des Hustens von einer Dyskrasie der Respirationsorgane herleitete, die zur Folge habe, dass sich das Pneuma an sich selbst stofse und dadurch den Hustenreiz hervorrufe, ferner dass er den Starrfrost (ῥίγος) in derselben Weise wie Platon³⁾ erklärte und ihn mit dem Zittern (τρόμος) identifizierte,

¹⁾ Orib. III 62: πότε ἄρχεται τὸ σπέρμα καὶ πότε λήγει; ἐκ τῶν Ἀθηναίου. Ἀρχεται μὲν τοῖς πλείστοις ἀπὸ τῶν τεσσαρεςκαίδεκα ἐτῶν ἐκκρίνεσθαι τὸ σπέρμα· γόνιμον δὲ γίνεσθαι, τισὶ μὲν ἀπὸ τῶν ὀκτωκαίδεκα, τοῖς δὲ πλείστοις περὶ τὰς τρεῖς ἐβδομάδας. Ἀγονον δὲ γίνεται περὶ τὰς ἐννέα ἐβδομάδας· τοῖς δὲ εἰς τὸ παντελὲς γῆρας ἀφικνουμένοις καὶ εἰς τέλος ἐκλείπει.

²⁾ Gal. VII 174: γένος δέ ἐστι καὶ ἄλλο τι βηχὸς ἐπὶ δυσκρασίᾳ τῶν ὀργάνων τῆς ἀναπνοῆς, ὃ κατενόησαν μὲν οὐχ ἥκιστα καὶ τῶν ἀπὸ τῆς πνευματικῆς αἰρέσεως ἀνδρῶν οἱ δοκιμώτατοι, ὧν ἐστι καὶ Ἀθήναιος· τὴν μέντοι ἀνάγκην, δι' ἣν ἐπιγίνεται βῆξ διὰ δυσκρασίαν, τινὲς μὲν αὐτῶν οὐδ' ἐπεχείρησαν ὅλως εἰπεῖν, ἔνιοι δὲ προσπταίειν ἑαυτῷ φασὶ τὸ πνεῦμα, τινὲς δ' ἀσαφέστερον ἔτι τούτου ῥῆμα φθεγγάμενοι νομίζουσιν εἰρηκεῖναι τι. Χρὴ δ' οὐχ ὅτι τὴν αἰτίαν ἀγνοοῦσι μέμφεσθαι τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλ' ὅτι καλὸν ἐξεῦρον θεώρημα καὶ ἄξιον τῆς ἑαυτῶν φιλοπονίας ἐπαινεῖν. Galen erklärte ihn aus einer Erkältung der Respirationsorgane.

³⁾ Gal. VII 609: Ἀθηναίου δὲ ἄξιον θαυμάζειν τοῦ Αἰταλέως· πολὺ γὰρ ἔτι καὶ Πλάτωνος ὕστερος γενόμενος οὐκ ἐν τοῖς περὶ τῆς αἰτίας λογισμοῖς μόνον ἔπεται τῷ Πλάτῳ, — τοῦτο μὲν γὰρ ἀνεκτόν — ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν ἔννοιαν ὁμοίως ἐκείνῳ φαίνεται συγκεχυμένος. οὔτε γὰρ διωρίσατο ῥίγους καὶ τρόμου τὴν ἔννοιαν ὑπογράφων τε τὸ ῥίγος ὧδε πῶς φησὶ· „τῇ δὲ μάχῃ καὶ τῷ σεισμῷ τοῦτω τρόμος καὶ ῥίγος ἔπεται ψυχρόν τε (δὲ Hds.) τὸ πάθος ἅπαν τοῦτο καὶ τὸ δρῶν αὐτὸ ἔσχεν ὄνομα, ὥς που, φησὶ, καὶ ὁ Πλάτων λέγει.“ οὗτος γὰρ αὐτὴν τὴν λέξιν εἴρηκε τοῦ Πλάτωνος. ἔχει δὲ ἡ σύμπασα τὸνδε τὸν τρόπον· „τὰ γὰρ δὴ τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν μεγαλομερέστερα εἰς τὰς ἐκείνων οὐ δυνάμενα ἔδρας ἐνδύναται, συνωθοῦντα ἡμῶν τὰ νοτερά

dafs er die Lethargie für eine Geisteskrankheit erklärte, die mit Niedergeschlagenheit verbunden sei¹⁾, während Leonidas nach Art der Methodiker darunter eine Stockung der Atome in den Gehirnhäuten verstand, durch welche Wahnsinn, Fieber, Niedergeschlagenheit, Depression und ein grofser Puls hervorgerufen werde²⁾, endlich dafs er sich um einen Zweig der Pathologie, der von den andern Schulen der Zeit gemeiniglich vernachlässigt wurde³⁾, um die Ätiologie, grofse Verdienste erworben habe. Während die Empiriker nach dem Vorgange der Skepsis⁴⁾ nur die Erforschung der offenbaren Ursachen (*φαινόμενα*) als notwendiges Erfordernis ansahen⁵⁾, die der *ἄδηλα* dagegen als überflüssig verwarfen, forderte die dogmatische Schule gleichmäfsige Berücksichtigung beider Arten von Ursachen⁶⁾. Die Pneumatiker schlossen sich hierin den Dogmatikern an⁷⁾, während die Methodiker offenbar unter dem Einflufs der Lehrsätze des Asklepiades⁸⁾ nur viererlei Arten von *αἴτια* anerkannten: die *προκαταρκτικά*, *συνεκτικά*, *αὐτοτελῆ* und *συναίτια*⁹⁾. Unter den *αἴτια προκαταρκτικά* verstanden sie die äufseren Gelegenheitsursachen, wie körperliche Anstrengung, übermäfsige Hitze und Kälte, welche die Krankheit hervorrufen, ohne bei ihrem Bestehen fortzuwirken¹⁰⁾. Die *αἴτια*

(*νοσερά* Hds.) — εἰσὶ δὲ τὰ σμικρότερα (-ότατα Hds.) — ἔξωθεν τὸν ἕτερον ἐξ ἀνωμάλου κεκινημένου τε ἀκίνητον δι' ὁμαλότητα καὶ τὴν ξύνωσιν ἀπεργαζόμενα πῆγνυσι. τὸ δὲ παρὰ φύσιν συναγόμενον μάχεται κατὰ φύσιν αὐτὸ ἐαυτῷ εἰς τὸ ἐναντίον ἀπωθοῦν. τῇ δὲ μάχῃ καὶ τούτῳ τῷ σεισμῷ τρόμος καὶ ῥῆγος ἐτέθη. ψυχρὸν δὲ τὸ πάθος ἅπαν τοῦτο καὶ τὸ θερμὸν αὐτὸ ἔσχεν ὄνομα.“ Vgl. Tim. 62b. Orib. III 209.

¹⁾ Cael. Aur. A. M. II 1: *Athenaeus Attaliensis* (*Tharsensis* Hds.) *furorem inquit mentis cum moestitudine* (sc. *lethargiam*).

²⁾ Cael. Aur. a. a. O.

³⁾ Gal. XIV 689 f.

⁴⁾ Gal. XI 381. Sext. Emp. adv. log. II 191.

⁵⁾ Gal. I 81.

⁶⁾ Cels. I p. 3, 11.

⁷⁾ Ps.-Gal. XIX def. 162. 163 p. 394, 5 f.

⁸⁾ Plin. XXVI 13. Cael. Aur. A. M. I 2.

⁹⁾ Ps.-Dioskorides ed. Kühn II 51 f.

¹⁰⁾ Ps.-Diosk. a. a. O.: *Μεταβαίνουσι δὲ ἐνταῦθα ἐπὶ τὰς τῶν αἰτίων διαφορὰς καὶ λέγουσιν* (sc. *οἱ Μεθοδικοί*), *ὅτι τῶν αἰτίων τινὰ μὲν ἐστὶ τὰ προκατάρξαντα, ἃ ποιήσαντα πάθος χωρίζεται· οἷον κόπος καὶ ψύξις, ἔγκανσις καὶ τὰ παραπλήσια.*

συνεκτικά¹⁾ faßten sie als die eigentlichen fortwirkenden Ursachen auf, von deren Vorhandensein, Zunahme, Abnahme und Aufhören die entsprechenden Stadien der Krankheit abhängig sind. Als diejenigen Ursachen, welche für sich allein unabhängig von andern die Erkrankung herbeiführen, galten ihnen die αἴτια αὐτοτελῆ, während sie als die ihnen entgegengesetzte Klasse von Ursachen die zusammenwirkenden (συναίτια)²⁾ betrachteten. Die pneumatische Schule ging in der Ausbildung dieser Lehre noch einen Schritt weiter. Wir haben gesehen, daß Athenaios für die Naturerklärung zwei Principien annahm, das Wirkende und das Leidende. Das Wirkende (τὸ ποιοῦν) oder die wirkende Ursache (τὸ ποιητικὸν αἶτιον) betrachtete er als die Ursache im höchsten Sinne und nannte sie τὸ προκαταρκτικόν³⁾. Diese αἴτια im höchsten Sinne sind nach seiner Theorie die Qualitäten. Andererseits verstand er unter den αἴτια προκαταρκτικά im engeren Sinne die äußeren Gelegenheitsursachen, durch welche die προηγούμενα αἴτια hervorgerufen werden⁴⁾. Der Begriff der προηγούμενα αἴτια scheint von ihm in die Ätiologie der antiken Medizin eingeführt worden zu sein⁵⁾. Sie bewirken nach seiner Auffassung, daß die αἴτια προκαταρκτικά zur Krankheit werden. Der übermäßige Genuß von Speisen z. B. ist ein αἶτιον προκαταρκτικόν: die durch den über-

¹⁾ Ps.-Diosk. a. a. O.: τὰ δὲ συνεκτικὰ διὰ τὸ ποιεῖν τὸ πάθος καὶ παραμένειν, τοῦτ' ἐστὶν ὧν μὲν παρόντων τὰ ἀποτελέσματα πάρεστιν, αὐξανομένων δὲ αὖξεται καὶ μειουμένων μειοῦται καὶ παυσαμένων παύεται.

²⁾ Ps.-Diosk. a. a. O.: καὶ αὐτοτελῆ δύναται εἶναι καθ' ἑαυτὰ παραγινόμενα τῶν ἀποτελεσμάτων.

³⁾ Ps.-Gal. XIX def. 155 p. 392, 13: Ἀθήναιος δὲ ὁ Ἀιταλεὺς οὕτω φησὶν· αἰτιὸν ἐστὶ τὸ ποιοῦν <τι>. τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ προκαταρκτικόν. Archigenes nannte sie τὸ δρῶν τι Gal. VIII 20.

⁴⁾ Gal. XV 112: εἰ δὲ τῷ κυρίῳ κατ' αὐτῶν ὀνόματι χρῶτό τις, προηγούμενα τῶν νόσων ἔρεῖ τὰ τοιαῦτα τῶν αἰτιῶν, ὥσπερ Ἀθήναιος. ὑφ' οὗ δὲ πάλιν αὐτὰ ταῦτα τὰ προηγούμενα γίνεσθαι, προκαταρκτικά τε καὶ προκατάρχοντα καλέσεις. πλῆθος γὰρ ἐδεσμάτων, ἀπειρία τε καὶ λουτρὰ καὶ γυμνάσια μὴ κατὰ καιρὸν γινόμενα καὶ πάνθ' ὅσα διήλθον ἐν τῷ περὶ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτιῶν ὑπομνήματι, τῶν προηγούμενων αἰτιῶν ἐκάστης νόσου γίνεται ποιητικά. Vgl. Ps.-Galen XIX def. 155 p. 392, 10. Gal. VII 302.

⁵⁾ Gal. a. a. O. Leonidas unterscheidet zwei Arten des Knochenfrasses, je nachdem er auf einer αἰτία προκαταρκτικῇ oder auf einer αἰτία προηγούμενῃ beruht: Paul. Aeg. VI 84.

mäßigen Genuß von Speisen hervorgerufene Überfüllung der Gefäße mit Blut ist das *προηγούμενον αἷτιον*¹⁾. Das *αἷτιον συνεκτικόν* faßte er ohne Zweifel als die im strengen Sinne wirkende Ursache auf²⁾. Der ganze Schwarm der philosophischen *αἷτια* war den Pneumatikern bekannt: aufser den vorhergenannten noch die *αἷτια αὐτοτελῆ, συναίτια, συνεργά, πρόδηλα, οὐ πρόδηλα, καθάπαξ ἄδηλα*³⁾, *πρὸς καιρὸν ἄδηλα*⁴⁾. Bei dem von mir erwiesenen Zusammenhang ihres Systems mit stoischer Doctrin, speciell mit Chrysipp, halte ich die Annahme der Abhängigkeit ihrer Ätiologie von den Lehren desselben Philosophen für sehr wahrscheinlich⁵⁾, zumal sich drei ihrer Definitionen (der *συνεκτικά, συναίτια, συνεργὰ αἷτια*)⁶⁾ mit denen der Stoa decken und ihre Definition des Begriffs *αἷτιον* echt stoisch ist⁶⁾.

¹⁾ Gal. a. a. O. Gal. I 380. XV 302. Alexander *περὶ πυρετῶν* c. 27.

²⁾ Ps.-Gal. XIX def. 157 p. 393, 5.

³⁾ Ps.-Gal. XIX def. 162 p. 394, 6, wo nach Philippon de Philodemi libro qui est *περὶ σημείων* etc. p. 66 A. 2 für *καθάπερ καθάπαξ* zu lesen ist.

⁴⁾ Ps.-Gal. XIX def. 158 f. p. 393. Dafs diese Definitionen nicht aus Gal. XV 302 f. entlehnt sind, beweist ihre gröfsere Reichhaltigkeit. Andererseits sind die von Galen aufgezählten Arten von *αἷτια* nicht sein Eigentum, weil er hier im Widerspruch zu seiner sonstigen Gewohnheit die Entlehnung deutlich kennzeichnet. In der Mitte dieses Abschnittes heifst es nämlich (p. 302, 17): *λέγουσι μὲν αὐτοτελὲς εἶναι τὸ αὐτὸ καθ' αὐτὸ ποιοῦν τὸ τέλος* und zum Schluss (p. 303, 13): *εἰδέναι δὲ δεῖ πάντως τὰ αἷτια, εἴπερ μηδὲν ἀναιτίως γίνεται. καὶ τοῦτ' ἔστιν ἀπάντων σχεδόν τι τῶν φιλοσόφων ὁμολόγημα κοινόν*. Von wem die Zusammenstellung herrührt, vermag ich nicht zu entscheiden. Vgl. Ps.-Gal. *Εἰσαγωγή* XIV 691 ff.

⁵⁾ Anders urteilt Philippon a. a. O.

⁶⁾ Ps.-Gal. XIX def. 157 p. 393, 5:

Συνεκτικὸν αἷτιον ἔστιν ὃ παρὸν μὲν παροῦσαν φυλάττει τὴν νόσον, ἀναιρούμενον δὲ ἀναιρεῖ, ὡς ὃ ἐν τῇ κύστει λίθος, ὡς ὕδατις, ὡς πτερυγιον, ὡς ἐγκανθίς κτλ.

def. 159: *Συναίτιον ἔστιν ὃ σὺν εἰτέρῳ δυνάμιν ἴσην ἔχον ποιοῦν τὸ ἀποτέλεσμα, αὐτὸ δὲ κατ' ἰδίαν μόνον οὐ δυνάμενον ποιῆσαι.*

def. 160: *Συνεργόν ἔστιν αἷτιον ὃ ποιοῦν ἀποτέλεσμα, δυσχερῶς δὲ,*

Sext. Emp. Hyp. III 15:

Τούτων δὲ τῶν αἰτίων οἱ μὲν πλείους ἡγοῦνται τὰ μὲν συνεκτικὰ εἶναι, τὰ δὲ συναίτια, τὰ δὲ συνεργὰ, καὶ συνεκτικὰ μὲν ὑπάρχειν ὧν παρόντων πάρεστι τὸ ἀποτέλεσμα καὶ ἀιρομένων αἴρεται καὶ μειουμένων μειοῦται . . . συναίτιον δὲ ὃ τὴν ἴσην εἰσφέρει δυνάμιν εἰτέρῳ συναιτίῳ πρὸς τὸ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα συνεργὸν δὲ ὃ βραχεῖαν εἰσφέρει δυνάμιν καὶ πρὸς τὸ μετὰ

Dem Aretaios verdanken wir die genaue Kenntniss der pathologischen Principien des Archigenes. Das Charakteristische derselben ist ihr enger Zusammenhang mit den physiologischen Grundanschauungen der pneumatischen Schule. Jede Erkrankung des menschlichen Körpers beruht nach der Theorie der Pneumatiker auf einer Dyskrasie der vier Elementarqualitäten¹⁾, die bestimmte Anomalien des Pneuma und der Säfte im Gefolge hat. Es handelte sich also in seiner Pathologie in erster Linie darum, die jedesmalige Dyskrasie der Krankheit festzustellen. Gleichzeitig gewann er damit einen sicheren Mafsstab für die Beurteilung der Disposition der verschiedenen Lebensalter, Geschlechter und Jahreszeiten zu den einzelnen Krankheiten²⁾. Am deutlichsten läfst sich diese Theorie an der Lethargie und Phrenitis veranschaulichen. Die Lethargie betrachtete er als eine Erkrankung des Gehirns, welche mit Trägheit, geistiger Depression und Schlafsucht verbunden ist³⁾. Als Geisteskrankheit hat sie ihren Sitz im Gehirn; das charakteristische Merkmal dieses Leidens ist die Schlafsucht. Demnach beruht es auf einer Dyskrasie derjenigen Elementarqualitäten, welche das *πνεῦμα* zu betäuben imstande sind. Diese Qualitäten sind Kälte und Feuchtigkeit⁴⁾; denn die Erfahrung lehrt, dafs übermäfsige Kälte die Lebenskraft erstarrt, dafs übermäfsige Feuchtigkeit Schlafsucht hervorruft, dafs ferner das Knabenalter wegen seiner Feuchtig-

συλλαμβάνον πρὸς τὸ ῥᾶον αὐτὸ ῥαστώνης ὑπάρχειν τὸ ἀποτέλεσμα,
γενέσθαι, καὶ ἰδίαν τι ποιεῖν οὐ οἷον ὅταν δυοῖν βάρος τι βασταζόντων
δυναμένον. μόλις τρίτος τις προσελθὼν συγκου-
φίσῃ τοῦτο.

Vgl. Gal. XIV 691 f. XV 302. Zeller III¹ 132 A. 2. Die Stoa wieder scheint diese Fülle von *αἷτια* der älteren dogmatischen Schule entlehnt zu haben.

1) Gal. VIII 149. Ps.-Gal. XIX def. 133 p. 386. Orib. III 97.

2) Darin ist die pneumatische Schule von den älteren Dogmatikern z. B. von Praxagoras abhängig: vgl. Fuchs, *Anecdota medica Graeca*, Rh. Mus. 49 p. 554, 9 f.

3) Aret. cur. ac. I 2, 204 f.

4) Schon Hippokrates hatte die Lethargie auf den feucht-kalten Saft d. h. den Schleim zurückgeführt, der das Gehirn beschwere und dadurch die geistige Thätigkeit beeinträchtige. Vgl. Fuchs a. a. O. 541, 20. Diokles betrachtete dies Leiden als eine Erkältung des im Herzen und Gehirn befindlichen *πνεῦμα ψυχικόν*, welche das Blut gerinnen mache. Vgl. Gal. XIV 741.

keit einen gesunden Schlaf hat, während das Greisenalter wegen seiner Trockenheit an Schlaflosigkeit leidet¹⁾.

Aus Aretaios ersehen wir, daß Archigenes in der That eine Dyskrasie von Kälte und Feuchtigkeit als Ursache der Lethargie ansah: er forderte, daß das Krankenzimmer erwärmt sei mit der Begründung, daß die Kälte (*ψύξις ἔμφυτος*) die Krankheit hervorrufe²⁾, ferner empfahl er den Gebrauch von Bibergeil, weil es den Körper warm und trocken mache und dadurch den Krankheitsstoff beseitige³⁾. Mit der Zunahme von Kälte und Feuchtigkeit im menschlichen Körper ist naturgemäfs eine Anomalie des Saftes verbunden, dem diese Qualitätenverbindung eigen ist, d. h. des Schleimes. Seit Hippokrates galt der Schleim bei vielen Ärzten als Krankheitsursache⁴⁾; bei Archigenes sinkt er zur Bedeutung des Krankheitsstoffes herab, der durch seine übermäfsige Kälte und Feuchtigkeit auf das Pneuma betäubend einwirkt und deshalb aus dem Körper entfernt werden muß⁵⁾.

Die Behandlung der Lethargie soll nach Archigenes derjenigen der Phrenitis entgegengesetzt sein⁶⁾: daraus folgt, daß er diese Krankheit aus der entgegengesetzten Ursache herleitete, d. h. aus einer Dyskrasie von Wärme und Trockenheit. Wieder bestätigt Aretaios⁷⁾ diese Schlussfolgerung. In der That erklären beide Qualitäten am besten den aufgeregten Zustand, der diesem Leiden eigen ist. Der Krankheitsstoff ist demnach die Galle⁸⁾ und als solcher aus dem Gehirn und dem Unterleibe, der nach seiner Meinung gleichfalls Sitz der Phrenitis sein kann, zu entfernen⁹⁾.

¹⁾ Gal. VIII 161.

²⁾ Aret. cur. ac. m. I 2, 200.

³⁾ Aret. cur. ac. m. I 2, 205.

⁴⁾ Gal. XIV 741. Fuchs a. a. O.

⁵⁾ Aret. cur. ac. m. I 2, 201 f.

⁶⁾ Aret. cur. ac. m. I 2.

⁷⁾ Aret. cur. ac. m. I 1, 189. 197.

⁸⁾ Aret. a. a. O. 198.

⁹⁾ Vgl. Cael. Aur. A. M. I 2, 9. Hippokrates sah das Gehirn als Herd der Krankheit an und als Krankheitsursache die Galle, welche das Blut in den Gehirnhäuten verderbe (Fuchs a. a. O. 541). Praxagoras faßte sie als ein Leiden des Herzens auf, Diokles als ein Leiden des Zwerchfells, während Erasistratos sich der hippokratischen Ansicht anschloß. Beiläufig: bei der Beurteilung der Herkunft der von Fuchs edierten anecdota ist von Cael. Aur. A. M. I 8 auszugehen, wo dieselbe doxographische Zusammenstellung, nur in größerer Reichhaltigkeit wiederkehrt: sie beweist, daß Soran *περὶ αἰτιῶν παθῶν* Quelle ist.

Die meisten Krankheiten beruhen auf einer Dyskrasie von Kälte und Feuchtigkeit oder Trockenheit. Auf Kälte und Feuchtigkeit führte er vornehmlich die chronischen Krankheiten zurück wie Schwindel¹⁾, Epilepsie²⁾, Phthisis³⁾, Asthma⁴⁾, Wassersucht⁵⁾ und Diabetes⁶⁾, von den akuten Krankheiten die Synkope⁷⁾. Das weibliche Geschlecht ist diesen Krankheiten leichter ausgesetzt als das männliche, weil ihm diese Qualitätenverbindung von Natur eigen ist⁸⁾, kalt-feuchte Gegenden begünstigen sie am meisten⁹⁾.

Eine Dyskrasie von Kälte und Trockenheit verursacht Tetanos¹⁰⁾, Pleuritis¹¹⁾, Paralyse¹²⁾, Kephalaia¹³⁾ und Melancholie¹⁴⁾. Weiber bekommen diese Krankheiten leichter als Männer, weil sie kalter Natur sind, sie kommen aber eher mit dem Leben davon, weil sie von Natur warm sind¹⁵⁾. Das Greisenalter ist wegen der ihm eigenen Qualitätenverbindung am meisten zu ihnen disponiert¹⁶⁾, während Kinder selten von ihnen befallen werden, und wenn sie an ihnen erkranken, leicht geheilt werden¹⁷⁾. Von den Jahreszeiten endlich ruft naturgemäfs der Winter diese Krankheiten am häufigsten hervor¹⁸⁾.

Auf einer Dyskrasie von Wärme und Trockenheit beruhen das Brennfieber¹⁹⁾, die Manie²⁰⁾, die Lungenentzündung²¹⁾ und die Cholera²²⁾. Diese Krankheiten sind im Sommer am häufigsten, darnach im Herbst, seltener im Frühling, am seltensten im Winter²³⁾. Von den Lebensaltern werden das Jünglings- und Mannesalter am

¹⁾ Aret. caus. chr. I 2, 71.

²⁾ Aret. caus. chr. I 4, 74. cur. 316. Fuchs 541.

³⁾ Aret. caus. chr. I 8, 95.

⁴⁾ Aret. caus. chr. I 11, 102. Fuchs 533.

⁵⁾ Gal. I 522. Aret. caus. chr. II 1.

⁶⁾ Aret. caus. chr. II 2.

⁷⁾ Aret. caus. ac. II 3, 40.

⁸⁾ Aret. caus. chr. I 11, 102. Athenaios bei Orib. III 97.

⁹⁾ Aret. cur. chr. I 4, 316.

¹⁰⁾ Aret. caus. ac. I 6, 7. Aet. VI 39.

¹¹⁾ Aret. caus. ac. I 10, 23.

¹²⁾ Aret. caus. chr. I 7, 89. Aet. VI 28.

¹³⁾ Aret. caus. chr. I 1, 70.

¹⁴⁾ Gal. I 522. Aret. caus. chr. I 5, 74 f.

¹⁵⁾ Aret. caus. ac. I 6, 7. Aet. VI 39.

¹⁶⁾ Aret. caus. ac. I 10, 23. I 6, 7. chr. I 7, 89. Aet. VI 28.

¹⁷⁾ Aret. caus. ac. I 10, 23. chr. I 7, 89.

¹⁸⁾ Aret. caus. chr. I 7, 89.

¹⁹⁾ Aret. caus. ac. II 4, 41.

²⁰⁾ Aret. caus. chr. I 6, 79.

²¹⁾ Aret. caus. ac. II 1, 26.

²²⁾ Aret. caus. ac. II 5, 44.

²³⁾ Aret. caus. ac. II 5, 44.

häufigsten von ihnen befallen, während das Greisenalter davon verschont bleibt.

Am seltensten ist eine Dyskrasie von Wärme und Feuchtigkeit Ursache einer Erkrankung; einige Pneumatiker leugneten sogar¹⁾, daß diese Qualitätenverbindung Krankheit hervorrufen könne. Unter den von Archigenes behandelten Krankheiten ist der Blutauswurf die einzige, welche auf diese Dyskrasie zurückgeführt wird²⁾. Ich schliesse es aus seiner Bemerkung, daß diese Krankheit durch den Frühling begünstigt werde, daß sie dagegen im Winter sehr selten sei³⁾.

Mit der widernatürlichen Steigerung einer dieser Qualitätenverbindungen ist, wie bereits oben erwähnt wurde, regelmäfsig eine Anomalie des Saftes, welcher dieselbe Qualitätenmischung aufweist, oder des Pneuma verbunden. Bei der Epilepsie z. B., die von ihm auf Kälte und Feuchtigkeit zurückgeführt wurde, stellt sich eine Anomalie des Schleimes (*φλέγμα* kalt-feucht) ein⁴⁾. Daher gilt häufiges Erbrechen von zähen und kalten Schleimmassen⁵⁾ als Symptom dieser Krankheit und in der Therapie wurden Abführmittel empfohlen, welche imstande sind, den Schleim zu vermindern⁶⁾. Der Krankheitsstoff der Melancholie, die auf einer Dyskrasie von Kälte und Trockenheit beruht, ist der schwarzgallige Saft (*χολή μέλαινα* kalt-trocken), der sich im Gehirn oder im Magen festsetzt und auf das Pneuma einwirkt⁷⁾. Archigenes empfahl deshalb bei dieser Krankheit schwarze Nieswurz oder atti-

¹⁾ Gal. I 522.

²⁾ Archigenes bei Aet. VIII 62. Aret. caus. ac. II 2, 37.

³⁾ Aret. a. a. O.

⁴⁾ Hippokrates ist der Begründer der Theorie, daß der Schleim die Ursache der Epilepsie ist: er füllt das Gehirn an und verstopft die Ausgänge dergestalt, daß sich das im Gehirn lokalisierte *ψυχικὸν πνεῦμα* nicht den Nerven mitteilen kann (Fuchs a. a. O. 542). Praxagoras und Diokles schlossen sich ihm an mit dem Unterschiede, daß sie den Sitz der Krankheit in die Aorta (*παχεῖα ἀρτηρία*) verlegten: dadurch, daß sich in ihr schleimige Säfte ansammeln und Blasen werfen, werde die Bewegung des vom Herzen ausgehenden *ψυχικὸν πνεῦμα* behindert. Galen billigte die Ansicht des Hippokrates: VII 201.

⁵⁾ Aret. caus. ac. I 5 p. 1. 5.

⁶⁾ Aret. cur. ac. I 5, 217. cur. chr. I 4.

⁷⁾ Aret. caus. chr. I 5, 74.

schen Thymian, um die schwarze Galle aus dem Körper zu entfernen.

Die Synanche, die allgemein für eine Entzündung des Schlundkopfes angesehen wurde¹⁾, führte er auf eine Dyskrasie der eingeatmeten Luft zurück, die einen zu hohen Grad von Wärme und Trockenheit erlangt hat und dadurch störend auf das Pneuma einwirkt²⁾. In ähnlicher Weise erklärte er den hysterischen Anfall nicht wie Soran für eine Entzündung, sondern für eine Erkältung des Pneuma³⁾. Die Dyskrasie von Kälte und Trockenheit, die der Darmverschlingung zu Grunde liegt⁴⁾, wirkt auf das Pneuma dergestalt ein, daß es sich in den Schlingen der oberen Gedärme festsetzt und eine Entzündung derselben hervorruft. Beim epileptischen Anfall ist infolge der durch den Schleim hervorgerufenen Verstopfung die Perspiration des Pneuma behindert⁵⁾: es sammelt sich infolge dessen im Brustkasten an und rüttelt alles auf. Die *ἐμπνευμάτωσις* beruht auf einer durch eine Dyskrasie bewirkten Ansammlung von Pneuma im Magenmund und Magen, wodurch eine Spannung dieser Organe herbeigeführt und die Verdauungsthätigkeit des Magens gestört wird⁶⁾.

Die Pneumatiker unterschieden bei jeder Krankheit zwischen *αἰτία*, *διάθεσις*, *νόσος*, *πάθος* und *σύμπτωμα*. Unter *αἰτία* verstanden sie die wirkende Ursache und unterschieden, wie wir oben gesehen haben, zwischen verschiedenen Arten derselben, mit *διάθεσις* bezeichneten sie alles das, was zum Krankheitszustande gehört⁷⁾. Die beiden allgemeinen Begriffe von Krankheit *νόσος* und *πάθος* unterschieden sie in der Weise, daß sie mit *νόσος* die Dyskrasie⁸⁾, mit *πάθος* dagegen die durch die Dyskrasie hervorgerufene Verletzung der natürlichen Funktion der Körperteile⁹⁾ bezeichneten. Die Folgen endlich der verletzten Funktion nannten sie *σύμπτωμα*¹⁰⁾. Das *πάθος* hat seinen Sitz in dem Körperteil,

¹⁾ Vgl. Cels. IV 7. Gal. VIII 269. Fuchs a. a. O. 543.

²⁾ Aret. caus. ac. I 7, 11.

³⁾ Aet. XVI 68. Vgl. S. 98 f.

⁴⁾ Aet. IX 28. Aret. caus. ac. II 6, 45. Vgl. S. 39 f.

⁵⁾ Aret. caus. ac. I 5, 5.

⁶⁾ Ps.-Gal. XIX def. 258 p. 419, 8.

⁷⁾ Gal. XV 111.

⁸⁾ Ps.-Gal. XIX def. 133 p. 386, 6.

⁹⁾ Ps.-Gal. a. a. O. def. 134 p. 386, 15. Gal. VIII 20. 136.

¹⁰⁾ Ps.-Gal. a. a. O. def. 170 p. 395, 16.

dessen Funktion verletzt ist¹⁾. Bisweilen wird aber ein Körperteil in seiner Funktion dadurch beeinträchtigt, daß er von der ursprünglich afficierten Stelle, die ihm benachbart oder durch Nervenstränge mit ihm in Verbindung steht, in Mitleidenschaft gezogen wird²⁾. Diese Krankheitszustände sind die secundären oder sympathischen: Archigenes gebührt das Verdienst, sie scharf von den primären unterschieden zu haben. Er verglich sie mit dem Schatten, den die primären *πάθη* werfen³⁾ und führte als Beispiel dafür die Trübung der Augen an infolge von Ansammlung feinteiliger Speisereste im Magen, die zur Folge habe, daß Gase der im Magen enthaltenen Flüssigkeiten zum Kopfe emporsteigen. In seiner speciellen Pathologie finden wir die weitgehendste Berücksichtigung dieser Theorie. Beim Asthma ist z. B. die Lunge der eigentliche Sitz der Krankheit; durch die Lunge werden wieder die beiden Hilfsorgane der Respiration, Zwerchfell und Brustkasten dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, daß die Krankheit häufig in ihnen lokalisiert erscheint⁴⁾. Die Epilepsie entsteht primär im Kopf; secundär hat sie in den mittleren Organen ihren Sitz⁵⁾. Beim hysterischen

1) Gal. VIII 20: *Τῶν κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ζώου πασῶν ἐνεργειῶν ἐκάστης τι μέρος ἰδίον ἐστίν, δι' οὗ γίνεται. καὶ τοίνυν καὶ βλάπτεσθαι τὴν ἐνέργειαν ἀναγκαῖον ἐστίν, παθόντος κατὰ τι τοῦ δημιουργοῦντος αὐτήν. πάσχει δὲ ποτὲ μὲν οὕτως εὐλυστον πάθος, ὡς εὐθὺς ἅμα τῷ δράσαντι χωρισθέντι πεπαῦσθαι, ποτὲ δ' οὕτως δύσλυστον, ὡς παραμένειν ἐπὶ πλεῖστον. ἔστιν δ' ὅτε καὶ τὸ δρῶν αὐτὸ διοδεῦον, οὐκ ἐστηριγμένον ἐν τῷ μορίῳ τὸ πάθος ἐργάζεται, καὶ τοῦτ' εἰκάζει σκιᾶ πάθους ὁ Ἀρχιγένης, ὡς ἐπὶ τῶν ὁμοίων τοῖς ὑποχρεομένοις φανταζομένων ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὧν ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς ἡθροιστῆται περίττωμα λεπτομερές· ἀτμῶν γὰρ τινῶν ἐντεῦθεν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀναφερομένων, περιπίπτουσα τούτοις ἢ ὀπτική δύναμις ὁμοίως φαντάζεται τῇ κατὰ τοὺς ὑποχρεομένους. Vgl. Gal. VIII 136.*

2) Gal. VIII 136: *Περὶ τῶν πεπονθότων τόπων . . . ὀλίγοι τε τῶν ἱατρῶν ἐπραγματεύσαντο πλέον τε παρέλιπον ἀνεξέργαστον ἢ μετεχειρίσαντο· καταλιπὼν οὖν ἐγὼ τοὺς ἄλλους Ἀρχιγένουσ ἐμνημόνευσα μόνου δικαίως ὑπὲρ ἐκείνους ἅπαντας ἐπηνημένον· λέγοντος δ' αὐτοῦ βλάπτεσθαι τινὰς ἐνεργείας ἄνευ τοῦ βλάπτεσθαι τὸ μέρος τοῦ σώματος, ἐν ᾧ γίνονται, διορισμοῦ τὸν λόγον ἔφην δεῖσθαι· δύνασθαι γὰρ τινὰ λέγειν ὀρθῶς, εἰ καὶ μὴ μόνιμον ἤδη διάθεσιν ἔχοι τὸ κατὰ συμπάθειαν ἐτέρου βλαπτόμενον, ἀλλ' ὡς αὐτὸς ἔφην, καθάπερ τινὰ σκιὰν αὐτὸ τοῦτο τὸ πάθος ὑπάρχειν αὐτοῦ Vgl. Gal. VIII 20.*

3) Gal. a. a. O.

4) Aret. caus. chr. I 11, 102.

5) Aret. cur. chr. I 4, 310 f. Aet. VI 50.

Erstickungsanfall steigt der Uterus in die Höhe und presst Leber, Zwerchfell, Lunge und Herz zusammen: daher die Erstickungsanfälle und die Stimmlosigkeit. Ausserdem werden aber auch die Carotiden wegen ihrer Sympathie mit dem Herzen zusammengedrückt, woraus sich wieder die Schwere im Kopf, die Gefühllosigkeit und die Schlafsucht erklärt ¹⁾).

Den Sitz der Krankheit glaubte er durch die verschiedenen Arten der Schmerzempfindung bestimmen zu können, deren er in spitzfindiger Weise nach Art seiner Pulstheorie eine große Zahl unterschied ²⁾).

Die Fieberlehre der pneumatischen Schule, die insbesondere dem Athenaios und Archigenes ihre hohe Ausbildung verdankte, beruht auf denselben Theorieen. Während die Methodiker im Anschluß an Asklepiades ³⁾ der Ansicht huldigten, daß das Fieber durch Verstopfung der zwischen den Atomen verlaufenden Hohlgänge zustande komme, knüpften Athenaios und seine Schule an die Theorie der älteren Dogmatiker an, welche jede Fieberart von einer Fäulnis der vier Säfte des menschlichen Körpers hergeleitet hatten ⁴⁾. Darin wichen sie von ihnen ab, daß sie diese Fäulnis auf eine Dyskrasie zurückführten: über die bei dieser Dyskrasie wirkenden Qualitäten waren sie verschiedener Meinung. Nach Athenaios ⁵⁾ beruhte sie auf einer abnormen Steigerung von Wärme und Trockenheit, nach Archigenes ⁶⁾ auf Wärme und Feuchtigkeit. Ausserdem teilten sie den Verlauf eines jeden Fiebers in bestimmte Perioden: Herodot in die vier Stadien des Anfangs, der Zunahme, der Höhe und der Abnahme ⁷⁾, Archigenes liefs unmittelbar auf den Anfang die ἀκμή folgen und unterschied bei der παρακμή zwei Stadien: die παρακμή und die ἄνεσις ⁸⁾.

Mit Zugrundelegung der Theorie von den drei verschiedenen

¹⁾ Aret. caus. ac. II 11, 60f. Vgl. S. 98.

²⁾ Gal. VIII 70. 73. 86. 90. 110. ³⁾ Gal. VII 615.

⁴⁾ Gal. VII 295: ἐπεὶ δὲ τῶν λοιμωδῶν ἐμνημόνευσα πυρετῶν ὑπὸ σηπεδόνοιο ἀπάντων γινομένων, ἄξιον ἐπιστάιτα τὸν λόγον ἐν τῷδε διασχέψασθαι περὶ παλαιοῦ δόγματος, ἅπαντα πυρετὸν ἐπὶ τῇ τῶν χυμῶν σήψει φάσκοντος γίνεσθαι. κινδυνεύει γὰρ οὖν δοξάζειν ὥδε καὶ ὁ τῶν ἀπ' Ἀθηναίου χορὸς, ἄνδρες οὐχὶ φαυλότατοι τὰ τ' ἄλλα τῆς τέχνης καὶ οὐχ ἥκιστα πυρετῶν ἐπιστήμης, περὶ ὧν καὶ γὰρ τό γε πλεῖστον αὐτοῖς σύμμεμι, πλὴν ἐν τι παρήμι, τοὺς ἐφημέρους ὀνομαζομένους πυρετούς. Vgl. VII 404.

⁵⁾ Gal. I 522. ⁶⁾ Orib. II 270. ⁷⁾ Orib. I 417. ⁸⁾ Gal. VII 424.

Bestandteilen des menschlichen Körpers, den festen, flüssigen und pneumatischen, unterschieden sie drei Hauptarten von Fiebern: Eintagsfieber, septische und hektische¹⁾, je nachdem die Fäulnis im Pneuma, den flüssigen oder festen Teilen ihren Sitz hat. Ihre Ansicht, daß die Eintagsfieber durch Fäulnis der Säfte hervorgebracht werden, fand nicht die Billigung des Galen²⁾, er vertrat vielmehr die Anschauung, daß sie auf eine abnorme Steigerung der eingepflanzten Wärme zurückzuführen seien. Als charakteristische Merkmale dieser Fieberart betrachteten sie die äußere Gelegenheitsursache³⁾, die angenehme Beschaffenheit der Wärme, die sich gleichmäßig über den ganzen Körper erstreckt⁴⁾, die Qualität des Urins, der gleich am ersten Tage verdaut erscheint, und die Beschaffenheit des Pulses, der zwar voller und schneller geht, aber durchaus gleichmäßig ist⁵⁾. Das septische Fieber erkannten sie daran, daß keine offenbare Gelegenheitsursache, wie bei dem Eintagsfieber, voraufgeht⁶⁾, ferner an der Beschaffenheit der Körperwärme, die fressend ist, so daß sie bei der Berührung gleichsam beißt und frisst, wie wenn Rauch in die Augen und in die Nase steigt⁷⁾, an der unverdauten Beschaffenheit des Urins und der vermehrten Geschwindigkeit des Pulses⁸⁾. Die Annahme des Archigenes, daß der harte Puls ein charakteristisches Merkmal dieser Fieberarten sei⁹⁾, wird von Galen verworfen mit der Begründung, daß die Härte des Pulses, die sich bisweilen bei ihnen einstellt, sich aus irgend einem Symptom erkläre, bei den Eintagsfiebern aus starker Erkältung, Nervenanspannung, großer Hitze, Ermattung, Mangel von Nahrungsmitteln, Schlaflosigkeit und übermäßiger Entleerung, beim septischen Fieber aus einer Entzündung, einem Skirrhus der Eingeweide, einer Nervenanspannung u. s. w.¹⁰⁾. Die gemeinschaftlichen Kennzeichen der hektischen Fieber faßten sie dahin zusammen, daß sie von Anfang bis zu Ende gleichmäßig, aber mit geringer Heftigkeit anhalten, daß die Hitze eine trockene Beschaffenheit hat, daß jedesmal nach dem Essen der Puls verändert und

¹⁾ Vgl. S. 88 f. Th. Puschmann. Alex. v. Tralles I 119 f.

²⁾ Gal. VII 295.

³⁾ Gal. VII 302 f.

⁴⁾ Gal. VII 303.

⁵⁾ Gal. VII 302.

⁶⁾ Gal. VII 304 f. Vgl. S. 90.

⁷⁾ Gal. VII 307.

⁸⁾ Gal. VII 308.

⁹⁾ Gal. VII 310 f. 686. IX 366.

¹⁰⁾ Gal. VII 311.

die Hitze vermehrt erscheint¹⁾, daß endlich die Arterien sich weit heißer anfühlen als die umgebenden Teile²⁾.

Eine besondere Art des hektischen Fiebers ist nach ihrer Theorie das marasmische Fieber (*πυρετός μαρασμώδης*). Es entwickelt sich aus dem hektischen dadurch, daß die im Herzen befindlichen Säfte aufgezehrt werden³⁾. Über seine Entstehung, die verschiedenen Arten und die Unterscheidungsmerkmale desselben hatten die Pneumatiker, insbesondere Philippos, ein Schüler des Archigenes⁴⁾, eingehend gehandelt. Philippos unterschied zwischen dem *μαρασμώδης πυρετός*, dem *ἐκ νόσου γῆρας* und dem eigentlichen *μαρασμός*. Der Marasmus tritt nur im Greisenalter auf, ohne mit Fieber verbunden zu sein, und beruht auf dem Schwinden der eingepflanzten Wärme. Der Tod ist in diesem Falle weiter nichts als eine allgemeine Austrocknung nach dem Laufe der Natur⁵⁾. Er verglich das allmähliche Erlöschen der natürlichen Wärme mit der Flamme, die, wenn sie des Stoffes Herr geworden ist, zu hellem Feuer entfacht wird und schließlich, wenn der Stoff verzehrt ist, langsam verlöscht⁶⁾. Die Abzehrung, die sich aus einer Krankheit entwickelt (*ἐκ νόσου γῆρας*), hielt er für eine besondere Form des marasmischen Fiebers⁷⁾, weil das charakteristische Merkmal des Fiebers, Härte des Pulses, auch ihr eigen ist. Ihre Verschiedenheit vom eigentlichen Marasmus schloß er daraus, daß sie nicht nur im Alter, sondern auch bei Knaben auftritt⁸⁾. Er führte sie auf dieselbe Ursache zurück wie den Marasmus d. h. auf das allmähliche Verlöschen der eingepflanzten Wärme⁹⁾. Galen rühmt ihm nach, daß er das Wesen dieser Krankheit richtig erkannt habe, indem er sie mit ausgebrannten, in Asche zerfallenden Kohlen verglich¹⁰⁾. Den *πυρετός μαρασμώδης* faßte er als eine hitzige und trockene Krankheit auf, bei welcher der Mensch sehr schnell seiner natürlichen Wärme beraubt wird und verdorrt wie ein vertrockneter Baum wegen Alters oder nahen Feuers oder großer Dürre¹¹⁾. Er unterschied zwei Arten: den *περιφρυγής* und den *συγκοπώδης μαρασμός*¹²⁾. Bei beiden ist

¹⁾ Gal. VII 322 f.

³⁾ Gal. VII 313.

⁵⁾ Gal. VII 315. 672.

⁷⁾ Gal. VII 685.

⁹⁾ Gal. IX 176.

¹¹⁾ Gal. VII 315.

²⁾ Gal. VII 328.

⁴⁾ Gal. VII 685. Vgl. S. 19 A. 2.

⁶⁾ Gal. VII 674.

⁸⁾ Gal. VII 315. 685. IX 176.

¹⁰⁾ Gal. IX 176.

¹²⁾ Gal. VII 686 f.

der Puls häufig und klein: den *περιφρυνής* erkannte er an der Wärme des Atems; er entwickelt sich aus einem starken Brennfieber und beruht auf Wärme und Trockenheit, der *συγκοπώδης* entwickelt sich dagegen aus einer *συγκοπή*.

Nach der Art der Bewegung der Wärme teilten sie alle Fieber in intermittierende und continuierende, je nachdem sie nach bestimmten Unterbrechungen wiederkehren oder weder bei Tag noch bei Nacht aussetzen¹⁾. Zu den intermittierenden rechneten sie die Quotidian-, Tertian- und Quartanfieber²⁾. Diese drei Fieberarten, die als Unterarten der septischen Fieber galten, werden von ihnen nach ihrer bekannten Theorie auf bestimmte Dyskrasieen zurückgeführt: das Quotidianfieber auf Kälte und Feuchtigkeit, das Tertianfieber auf Wärme und Trockenheit und das Quartanfieber auf Kälte und Trockenheit. Der Krankheitsstoff der alltäglichen Fieber wird demnach durch den Schleim, derjenige der dreitägigen durch die gelbe Galle und derjenige der viertägigen durch die schwarze Galle gebildet³⁾. Das Quotidianfieber kommt am häufigsten im Winter, bei kalter und feuchter Luftbeschaffenheit, vor, in kalten und feuchten Gegenden und im Greisenalter. Das dreitägige Fieber tritt vornehmlich im jugendlichen Alter (*ἀκμάζοντες*) und zur Sommerszeit auf; es entsteht in heißen und trockenen Gegenden, es erkrankten daran solche Constitutionen, die hitzige und trockene Nahrungsmittel zu sich nehmen oder erhitzende und austrocknende Arzneimittel gebrauchen. Das Quartanfieber ist das gewöhnliche Fieber der *παρακμάζοντες*: die Herbstzeit, kalte und trockene Nahrungsmittel und Getränke befördern die Entwicklung dieser Fieberform⁴⁾. Jedes dieser Fieber

¹⁾ Vgl. S. 88.

²⁾ Gal. VII 336.

³⁾ Gal. VII 334 f. IX 648 f.

⁴⁾ Die Qualitätentheorie, die dieser Bestimmung zu Grunde liegt, ist die des Athenaios:

ἀμφημερινὸς πυρετός, kalt-feucht, Schleim, Winter, Greisenalter.

τριταῖος πυρετός, warm trocken, gelbe Galle, Sommer, *ἀκμάζοντες*.

τεταρταῖος πυρετός, kalt-trocken, schwarze Galle (IX 659), Herbst, *παρακμάζοντες*.

Vgl. Gal. I 522. Orib. III 183. Aet. III 162. Ich schliesse daraus, daß Athenaios die Quelle ist. Für Archigenes gilt folgendes Schema:

kalt-trocken, schwarze Galle, Winter, Greisenalter (Aret. caus. ac. I 6, 7).

kalt-feucht, Schleim, Herbst, *ἀκμάζοντες*, *γυναῖκες* (Aret. a. a. O.).

warm-trocken, gelbe Galle, Sommer, *νέοι*, *ἄνδρες* (Aret. a. a. O.).

ist mit Frostanfällen verbunden¹⁾, die infolge des verschiedenen Krankheitsstoffes verschieden sind: beim Quotidianfieber stellt sich nur ein Gefühl des Frostes ein²⁾, während beim dreitägigen Fieber der Frostschauer ein stechendes und bohrendes Gefühl verursacht³⁾ und im viertägigen Fieber mit Eiskälte verbunden ist, die bis auf die Knochen dringt⁴⁾. Während bei diesen Fieberarten der Schüttelfrost vorangeht und das Fieber nachfolgt, kannte Archigenes eine Art des Quotidianfiebers, bei der Schüttelfrost und Fieber von Anfang an im ganzen Körper zu gleicher Zeit auftreten: er nannte sie den *πυρετὸς ἡπίαλος*⁵⁾.

Von den continuierenden Fiebern, die sie von der gelben Galle herleiteten⁶⁾, kannten sie zwei Arten: die *πυρετοὶ σύνοχοι* und *συνεχεῖς*⁷⁾, von denen die *σύνοχοι* nur einen Anfall von Anfang bis zu Ende machen, ohne auszusetzen, während bei den *συνεχεῖς* Zunahme und Abnahme deutlich zu unterscheiden sind⁸⁾. Zu den *συνεχεῖς* rechneten sie den *ἡμιτριταῖος*, den *πυρετὸς καυσώδης* und *τυφώδης*⁹⁾. Unter dem halbdreitägigen Fieber verstand Agathinos nach dem Vorgange der Methodiker¹⁰⁾ ein verlängertes dreitägiges Fieber, das sich nur hinsichtlich der Dauer des Anfalls vom Tertianfieber unterscheidet¹¹⁾. Er unterschied drei Arten desselben: den *μέγας*, *μέσος* und *μικρὸς ἡμιτριταῖος*, je nachdem der Anfall sich über vier *διαστήματα*, d. h. über 48 oder über 36 oder über 24 Stunden erstreckt¹²⁾, ohne dafs ein Nachlaß eintritt. Den Namen leitete er von seiner Ähnlichkeit mit dem Tertianfieber ab,

¹⁾ Gal. IX 664.

²⁾ Gal. IX 653.

³⁾ Gal. VII 335. IX 652.

⁴⁾ Gal. VII 335. IX 652.

⁵⁾ Was Galen (VII 347) über die Entstehung dieser Fieberart mitteilt, scheint ebenfalls auf pneumatischer Doctrin zu beruhen, dafs nämlich bei ihr nur ein Teil des Schleimes in Fäulnis gerät: der in Fäulnis übergegangene ruft das Fieber hervor, während der andere Teil den Schüttelfrost hervorbringt.

⁶⁾ Gal. VII 336.

⁷⁾ Ps.-Gal. XIX def. 186 p. 318, 16 f. XVII A. 890. VII 336. IX 665.

⁸⁾ Bei Gal. XIX def. 186 ist zu lesen: ἡ συνεχῇ πυρετὸν καλοῦσι τὸν εἰς ἀπυρεξίαν πρὶν τελέως <λυθῆναι> μὴ παυόμενον κτλ. Vgl. Gal. IX 664. Quelle ist Archigenes.

⁹⁾ Ps.-Gal. XIX 135 p. 387, 7.

¹⁰⁾ Cels. III 3. Ps.-Gal. XIX 402, 12.

¹¹⁾ Gal. VII 367. 373.

¹²⁾ Gal. XVII A 120. 228. 942. VII 468.

da es, wie dieses, jeden dritten Tag wiederkehrt¹⁾. Archigenes erklärte diese Fieberart, ebenso wie Galen, für eine Verbindung des Tertian- mit dem Quotidianfieber²⁾, bei der entweder das eine oder das andere Fieber die Oberhand habe und führte die Entstehung derselben auf Fäulnis zweier Säfte, des Schleimes und der gelben Galle zurück.

Das Brennfieber (*πυρετός καυσώδης*) beruht als continuierendes Fieber auf einer Dyskrasie von Wärme und Trockenheit: sein Krankheitsstoff ist die gelbe Galle³⁾. Die charakteristischen Symptome sind eine trockene, beissende Hitze, Trockenheit der Zunge und des Mundes, heftiger Durst, vermehrte Respiration, galliges Erbrechen, Kälte der Extremitäten, gallige Färbung des Urins und Auftreten von Delirien⁴⁾. Haben Wärme und Trockenheit ihre höchste Steigerung erfahren, so endet es mit einer reichlichen Schweisssecretion und allmählicher Auflösung des Körpers. Archigenes empfahl, wie Herodot, bei diesem Fieber den Genuß von kaltem oder geschmolzenem Wasser⁵⁾.

Die hippokratische Lehre von den kritischen Tagen, deren Einfluß auf die Prognose Asklepiades nicht anerkannt hatte⁶⁾, wurde von der Schule des Archigenes wieder aufgenommen⁷⁾, wenn auch über die Bedeutung der einzelnen Tage Meinungsverschiedenheit herrschte⁸⁾: Einstimmig wurden von ihnen als kritische Tage der 7., 11., 14., 20. Tag⁹⁾ anerkannt. Archigenes wies dem 21. Tage eine gröfsere Bedeutung zu als dem 20.¹⁰⁾, dem 27. eine geringere als dem 28. Nach dem 40. Tage hört die Bedeutung der kritischen Tage auf¹¹⁾. Die Krisis der *σύνοχοι πυρετοί* tritt nach Archigenes Ansicht am 4. Tage ein¹²⁾, bei den *συνεχεῖς πυρετοί* richtet sie sich nach der Stärke und der Bewegung der Wärme. Sie erfolgt am 3. Tage, wenn das Fieber grofs ist und eine schnelle Bewegung

¹⁾ Gal. VII 469.

²⁾ Gal. VII 365. 369.

³⁾ Aret. caus. ac. II 4, 41.

⁴⁾ Ps.-Gal. XIX def. 188 p. 399.

⁵⁾ So schon Hippokrates: Epid. IV 59. V 19. Vgl. Cels. III 7. Petron bei Cels. III 9. Aret. caus. ac. II 8, 55. caus. chr. I 1, 168. Orib. I 422. 425. Philumenos bei Aetius V 78. Gal. VII 183.

⁶⁾ Cels. III 4, 80.

⁷⁾ Gal. IX 775.

⁸⁾ Gal. IX 778.

⁹⁾ Gal. IX 781.

¹⁰⁾ Gal. IX 816.

¹¹⁾ Gal. IX 839.

¹²⁾ Gal. IX 717.

hat, am 5. dagegen, wenn es minder grofs ist und die Wärme sich nur langsam bewegt. Die Krisis fällt immer mit dem Anfall zusammen: daher ist sie am 4. Tage bei diesen Fiebern so selten, dafs Archigenes es nur zweimal, Galen einmal erlebt haben will¹⁾.

Archigenes teilte die Fieber nach ihrem Charakter in folgende Arten: *κατόξεις, ὀξεῖς, χρόνιοι, βραχυχρόνιοι*²⁾, deren Benennungen er nicht nur von der Zahl der Fiebertage, sondern auch von der Bewegung und der Natur des Fiebers abhängig machte³⁾. Ein Fieber, das bis zum 7. Tage anhält, nannte er *κάτοξιν*, ein solches, das sich bis zum 14. Tage ausdehnt, *ὀξύν*; dabei machte er zur Vorbedingung, dafs es mit Schnelligkeit und Gefahr verbunden ist⁴⁾. Demnach kann ein Fieber, das sich langsam und träge bewegt und mit fieberlosen Zwischenzeiten auftritt, niemals ein *πυρετός ὀξύς* sein. Ein Fieber, das bis zum 40. Tage anhält, nannte er *χρόνιος*; die langwierigen Fieber aber, die weder gefährlich noch bedeutend sind, nannte er *βραχυχρόνιοι*⁵⁾.

Die hohe Ausbildung der Pulslehre ist ebenfalls ein Verdienst dieser Schule. Sie ist zwar nicht frei von dialektischen Spitzfindigkeiten und müßigen Wortklaubereien, aber ihre grofse Bedeutung für die Vervollkommnung der Diagnose kann niemand leugnen. Der Ruhm, die Pulslehre im Altertum wissenschaftlich begründet zu haben, gebührt dem grofsen alexandrinischen Arzte Herophilos von Chalkedon. Die von seinem Lehrer Praxagoras stammende Entdeckung des natürlichen Pulses der Schlagadern⁶⁾, sowie die von ihm im Gegensatz zu Praxagoras verfochtene Ansicht, dafs die Schlagadern mit Pneuma und Blut angefüllt seien⁷⁾, bilden die Grundlage seines Systems. Die Verdienste seines berühmten Zeitgenossen Erasistratos um diese neue Lehre sind im Verhältnis zu ihm gering. Schuld daran ist sein hartnäckiges Festhalten an der Theorie des Praxagoras, dafs die Arterien nicht Blutgefäfsse, sondern Luftkanäle seien⁸⁾. In der Folgezeit hat sie in den Schulen beider Meister zu

¹⁾ Gal. IX 717.

²⁾ Ausserdem kannte er noch *πυρετοὶ εὐτροποὶ* und *κακοήθεις*: Orib. II 270.

³⁾ Gal. IX 887.

⁴⁾ Gal. IX 888.

⁵⁾ Gal. IX 887. 940.

⁶⁾ Gal. V 561. VII 702.

⁷⁾ Gal. IV 731.

⁸⁾ Gal. XI 153. Vgl. Gal. VIII 759 f.

heftigen Streitigkeiten geführt¹⁾, ist dann im 1. Jh. n. Chr. von den Methodikern und Pneumatikern wieder aufgenommen worden und hat sich besonders in der Schule der letzteren, des Athenaios, Agathinos, Magnus, Herodot und Archigenes zu jener Vollkommenheit ausgebildet, die uns in Galens Schriften entgegentritt. Die umfangliche Schrift des Archigenes *περὶ σφυγμῶν*²⁾ ist für uns das letzte abschließende Werk auf diesem Gebiet, der die Folgezeit, insbesondere Galen, seine genaue Kenntnis dieser Lehre verdankt. Im folgenden versuche ich eine Rekonstruktion dieser Schrift: durch sie wird zugleich ein Schlaglicht auf die Lehren der übrigen Pneumatiker fallen³⁾.

Die Grundlage der pneumatischen Pulserklärung bildet die dem Herophilos entlehnte Annahme⁴⁾, daß die Schlagadern Pneuma und Blut zugleich enthalten und daß durch deren Circulation der Puls hervorgerufen werde⁵⁾, sowie daß die Schlagadern die Kraft zur Ausdehnung und Zusammenziehung ihrer Häute vom Herzen erhalten, d. h. daß Herz und Arterien in steter Wechselbeziehung zu einander stehen. Jeder Puls besteht aus vier Zeiten, der Zusammenziehung, Ausdehnung und den beiden Pausen, von denen sie die beiden Bewegungen der Diastole und Systole als die eigentliche Kraftäußerung (*ἐνέργεια*) der Arterien und des Herzens betrach-

¹⁾ Gal. VIII 719.

²⁾ Gal. VIII 754.

³⁾ Die Quellen für unsere Kenntnis der antiken Pulslehre sind eine Anzahl von galenischen Schriften: sein kurzer Grundriß *περὶ τῶν σφυγμῶν τοῖς εἰσαγομένοις* (VIII 453 f.), sein aus vier Teilen bestehendes Hauptwerk über diesen Gegenstand: *περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν* (VIII 493 f.), *περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν* (VIII 766 f.), *περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς αἰτίων* (IX 1 f.) und *περὶ προγνώσεως σφυγμῶν* (IX 205 f.) und seine *Σύνοψις περὶ σφυγμῶν ἰδίας πραγματείας* (IX 431). Vgl. Ilberg: Über die Schriftstellerei des Klaudios Galenos, Rh. Mus. XLIV 219 f. Sein Commentar zu der Pulsschrift des Archigenes in 8 B. ist leider verloren gegangen. Außerdem kommen in Betracht ein unter dem Namen des Galen erhaltener, in Wirklichkeit einer pneumatischen Feder entstammender Abriss *περὶ σφυγμῶν πρὸς Ἀντώνιον φιλομαθῆ καὶ φιλόσοφον* (Gal. XIX 629), die kurzen Definitionen in der Pseudogalenischen Schrift *ὅροι ἰατρικοί* (Gal. XIX 404 f.), der gemeiniglich unter dem Namen des Rufus gehende Tractat *περὶ σφυγμῶν* (Daremborg-Ruelle p. 219 f.) und endlich die von V. Rose, Anecd. gr. II herausgegebene Schrift des Pseudo-Soran *de pulsibus* (263 f.) und *peri s gmon* (275 f.).

⁴⁾ Gal. IV 731.

⁵⁾ Gal. VIII 733. 870. VII 598. Ps.-Gal. XIX def. 73. 74, 365.

teten¹⁾. Mit dieser Annahme standen sie im Widerspruch zu Herophilos und Asklepiades, von denen der erstere gewöhnlich nur die Zusammenziehung als ihre eigentliche Kraftäußerung ansah²⁾, während Asklepiades sich nicht deutlich darüber aussprach, ob überhaupt eine dieser Bewegungen als Kraftäußerung gelten dürfe³⁾. Ein wichtiger Unterschied ihrer Theorie von derjenigen der älteren Ärzte besteht darin, daß sie mit Berufung auf die Analogie der Atmungsorgane die Behauptung verfochten, daß die Arterien sich bei der Systole füllen, bei der Diastole dagegen leeren⁴⁾.

Athenaios und sein Schüler Agathinos hatten eine mehrfache Bedeutung des Wortes *σφυγμός* unterschieden⁵⁾: sie verstanden darunter nicht nur die Bewegung der Schlagadern und des Herzens, sondern auch mit Anlehnung an Erasistratos die abnorme Arterienbewegung bei Entzündungen, die bloße Ausdehnung oder Zusammenziehung der Arterien, die Aufeinanderfolge mehrerer Ausdehnungen und Zusammenziehungen, die Pulsation an der Handwurzel, endlich die Bewegung der sichtbar gespannten Arterien. Archigenes war beiden darin gefolgt⁶⁾, als grundwesentlich aber galt ihm folgende Definition⁷⁾, die zu Beginn seines Werkes zu lesen war: „*σφυγμός ἐστὶ καρδίας καὶ ἀρτηριῶν διαστολὴ φυσικὴ τε καὶ συστολὴ φυσικὴ*“⁸⁾. Er übernahm also die Defini-

¹⁾ Gal. VIII 755: οἱ δ' ἀπ' Ἀθηναίου πάντες, ὡς εἴρηται, τὰς κινήσεις ἀμφοτέρως ἐνεργείας ἡγοῦνται, τὴν τε ἐν τῷ διαστέλλεσθαι γινομένην καὶ τὴν ἐν τῷ συστέλλεσθαι ... Vgl. 754.

²⁾ Gal. VIII 747. 754.

³⁾ Gal. VIII 755.

⁴⁾ Gal. V 162 f. VIII 713. IX 424. Ps.-Gal. XIX def. 74, 366. Vgl. S. 140.

⁵⁾ Gal. VIII 750.

⁶⁾ Gal. VIII 752.

⁷⁾ Gal. VIII 754. Ps.-Gal. XIX def. 110 p. 375, 16.

⁸⁾ Athenaios verstand unter Puls die natürliche, unbeabsichtigte Ausdehnung der in den Arterien und im Herzen befindlichen Wärme, die sich von sich weg und zu sich hin bewegt und die Bewegung des Herzens und der Arterien veranlaßt (Gal. VIII 756. Vgl. Ps.-Gal. XIX def. 110 p. 376): Ἀθήναιος τὸν σφυγμὸν ὁρίζειται κίνησιν κατὰ διαστολὴν φυσικὴν καὶ ἀπροαίρετον τοῦ ἐν ἀρτηρίαις καὶ καρδίᾳ θερμοῦ ἐξ ἑαυτοῦ τε καὶ εἰς ἑαυτὸ κινουμένου καὶ συγκινοῦντος καρδίαν καὶ ἀρτηρίας. Er definierte auch den Puls als Ausdehnung und Zusammenziehung auf Grund der Perspiration des Herzens und der Arterien oder als sichtbare, an und für sich wahrnehmbare Perspiration, vgl. 756 f. Magnus definierte folgendermaßen: *σφυγμός ἐστὶ διόγκωσις καὶ συνίξησις αἰσθητὴ καρδίας καὶ τῶν ὁμοιοπαθούντων αὐτῇ*. Agathinos verstand unter Puls die Bewegung von Herz und Arterien: vgl.

tion seines Lehrers, daß unter Puls jede Bewegung der Arterien und des Herzens zu verstehen sei¹⁾, mit dem Zusatze, daß nur die normale Bewegung den Puls ausmache²⁾. Dieser Zusatz hat den Zweck, der Unterscheidung des Pulsschlages vom *τρόμος*, *σπασμός* und *παλμός* zu dienen, die er demnach wie sein Lehrer³⁾ als abnorme Bewegungen der Arterien⁴⁾ auffafste⁵⁾.

Ausführlich behandelte er die Frage nach der Ursache der Bewegung der Arterien und berücksichtigte dabei alles, was Herophilos darüber gesagt hatte⁶⁾, ohne seine offenkundigen Versehen zu berichtigen, dagegen polemisierte er gegen die Auffassung des Herophilos von den vier Kräften, welche das Leben regieren (*δυνάμεις τὰ ζῶα διοικοῦσαι*).

Herophilos hatte in seiner Pulslehre vier Hauptunterschiede der Pulsarten angenommen⁷⁾: Gröfse, Schnelligkeit, Stärke und Rhythmos; außerdem als Eigenschaften derselben Regelmäßigkeit, Gleichmäßigkeit und deren Gegenteile. Archigenes nahm deren nach dem Vorgange seiner Schule⁸⁾ acht

VII 750. Die übrigen Pneumatiker definierten in ähnlicher Weise. Gal. VIII 757: καὶ ἄλλοι δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς πνευματικῆς αἰρέσεως ὅρους ἐποιήσαντο τοῦ σφυγμοῦ βραχὺ τῶν προειρημένων παραλλάττοντας, ὡς εἶπον, ὥστ' οὐ χρὴ μνημονεύειν αὐτῶν ἐπειγομένους καθ' ὅσον οἶόν τε διαδραμεῖν τὸν λόγον.

¹⁾ Gal. VIII 750.

²⁾ Gal. VIII 722. 754.

³⁾ Gal. VIII 751.

⁴⁾ Gal. VIII 722.

⁵⁾ Herophilos hatte ebenfalls zu Beginn des 1. Buches seiner Pulslehre den Unterschied von *σφυγμός*, *τρόμος*, *σπασμός* und *παλμός* behandelt (Gal. VIII 716. 724). Er erkannte richtig mit Polemik gegen Praxagoras (VIII 723), der diese Erscheinungen für quantitativ, nicht qualitativ verschieden vom Pulsschlag hielt (Gal. a. a. O. Rufus 220), daß sie mit dem Pulse nichts zu thun haben, sondern vielmehr von den Muskeln und Nerven ausgehen. Diese einleitenden Bemerkungen des Herophilos sind zum Teil gegen seinen Lehrer, zum andern Teil gegen Aigimios, den ersten Verfasser einer Pulslehre unter dem Titel *περὶ παλμῶν*, gerichtet (Gal. VIII 716. Ruf. p. 219).

⁶⁾ Gal. VIII 870. Daß Archigenes der Gegenstand der Polemik des Galen ist, folgt aus dem Zusammenhange.

⁷⁾ Gal. VIII 956. 959. 592 (aus Archigenes). 625 (aus Archigenes).

⁸⁾ Das besagt, worauf mich Herr Prof. von Wilamowitz aufmerksam macht, die Ausdrucksweise *διηχημέναι παρὰ τοῖς γούν καθαρείοις*. Sie beweist, daß diese Pulslehre, und zwar ihre als Axiome angesehenen Fundamente, älter und eine Unterscheidungslehre der Schule sind. Es ist mir wahrscheinlich, daß Agathinos der Urheber dieser Lehre ist (vgl. Gal. VIII 593).

an ¹⁾ und nannte sie einfache Beschaffenheiten (*ἀπλάτ ποιότητες*): er bezeichnete sie als allgemein bekannt (*διηχημέναι*)²⁾ und war der Ansicht, daß sie keines Beweises bedürfen. Es sind folgende: *μέγεθος*, *σφοδρότης*, *τάχος*, *πυκνότης*, *πληρότης*, *τάξις ἢ ἀταξία*, *ὁμαλότης ἢ ἀνωμαλία*, *δυθμός*. Weiter wollte er im Gegensatz zu Herophilos, der diese Begriffe als die artbildenden Unterschiede auffasste, unter seinen Qualitäten Gattungsbegriffe verstanden wissen, von denen die fünf ersten wieder drei Arten unter sich begreifen, zwei Extreme und eine natürliche (*μέσος, σύμμετρος*) Pulsart³⁾. Darnach umfaßt die erste Gattung (*τὸ μέγεθος τοῦ σφυγμοῦ*)⁴⁾ den *σφυγμὸς μέγας*, *μικρὸς*, *μέσος*, die zweite (*σφοδρότης τοῦ σφυγμοῦ*) den *σφυγμὸς σφοδρὸς*, *ἀμυδρὸς*, *μέσος*⁵⁾, die dritte (*τάχος τοῦ σφυγμοῦ*) den *σφυγμὸς ταχὺς*, *βραδὺς*, *μέσος*⁶⁾, die vierte (*πυκνότης τοῦ σφυγμοῦ*) den *σφυγμὸς πυκνὸς*, *ἀραιὸς* und *μέσος*⁷⁾, die fünfte (*πληρότης τοῦ σφυγμοῦ*) den *σφυγμὸς πλήρης*, *κενὸς*, *μέσος*⁸⁾. Die beiden folgenden *γένη*, von denen das sechste den regelmässigen und unregelmässigen, das siebente den gleichmässigen und ungleichmässigen Puls unter sich befaßte⁹⁾, liefs er unbenannt (*ἀκατονόμαστα*), weil er keinen gemeinsamen Gattungsbegriff fand, trotzdem er sie mit demselben Rechte, wie die vorbenannten Gattungen, als *τάξις* und *ὁμαλότης* hätte bezeichnen können. Eine Ableitung dieser Qualitätenunterschiede hielt er für überflüssig; ebenso erscheint ihre Achtzahl ziemlich willkürlich und Archigenes selbst hat dies dadurch anerkannt, daß er die Qualität der Härte, die den harten und weichen Puls unter sich begreift und die er im vierten *λόγος* seiner Schrift, also mitten unter den andern Qualitäten abgehandelt hatte, zu Anfang seiner Schrift, wo er eine Aufzählung derselben

¹⁾ Gal. VIII 576. 578. Die Worte des Archigenes werden gelautet haben: *Ὅτιν' λέγονται ποιότητες παρέπεσθαι τοῖς σφυγμοῖς, αἱ διηχημέναι παρὰ γούν τοῖς καθαρείοις* (vgl. Archigenes bei Orib. II 203), *μέγεθος*, *σφοδρότητα*, *τάχος*, *πυκνότητα*, *πληρότητα*, *τάξιν ἢ ἀταξίαν*, *ὁμαλότητα ἢ ἀνωμαλίαν*, *δυθμόν*“.

²⁾ Gal. VIII 578.

⁴⁾ Gal. VIII 578. 591.

⁶⁾ Gal. VIII 593.

⁸⁾ Gal. VIII 582.

³⁾ Gal. VIII 590. 591. 605 u. öft.

⁵⁾ Gal. a. a. O.

⁷⁾ Gal. VIII 593.

⁹⁾ Gal. VIII 592 ff.

giebt, übergeht¹⁾. Die *σκληρότης* war im Sinne des Archigenes ebenso gut eine Qualität wie die übrigen; die Zurückweisung derselben als Qualität hätte nur dann Berechtigung, wenn er sie nicht als einfache, sondern als zusammengesetzte Qualität angesehen hätte²⁾. Diese Annahme trifft aber für Archigenes nicht zu, weil er durch die Erklärung dieser Pulsgattung als *ἡ κατὰ σύστασιν ἢ διάλυσιν ἀντίληψις* deutlich zu erkennen giebt, daß er sie zu den einfachen Qualitäten rechnete³⁾.

Außer diesem seinen Vorgängern entlehnten Einteilungsprincip nach den Qualitäten bezeugt Galen für Archigenes ein zweites Einteilungsprincip. Den harten und weichen Puls hatte er, wie wir eben gesehen haben, unter den Begriff der Consistenz der Arterie (*κατὰ σύστασιν ἢ διάλυσιν τῆς ἀρτηρίας*) rubriciert; den starken und schwachen Puls ordnete er dem Begriff des *τόνος* der Bewegung unter (*κατὰ τόνον τῆς κινήσεως*)⁴⁾. Vollständig erhalten ist dieses zweite Einteilungsprincip in einem Scholion zu einer Pariser Hds. der Pseudogalenischen Schrift *περὶ σφυγμῶν πρὸς Ἀντιώνιον*⁵⁾, das Daremberg in seiner Ausgabe des Rufus⁶⁾ herausgegeben hat: *Τὰ δέκα γένη τῶν σφυγμῶν ἐκ τῶν Ἀρχιγένους· α' τὸ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς. β'. τὸ παρὰ τὸ ποιὸν τῆς κινήσεως· γ' τὸ παρὰ τὸν*

¹⁾ Gal. VIII 577: *αὐτίκα γέ τοι κατὰ τὰς ὀκτὼ τὰς πρώτας ποιότητας οὐδαμοῦ μνημονεύσας* (sc. Archigenes) *σκληρότητος καὶ μαλακότητος ἐξῆς ὑπὲρ αὐτῶν διαλέγεται. πρῶτον μὲν γὰρ περὶ μεγέθους, δεύτερον δὲ περὶ σφοδρότητος, καὶ τρίτον περὶ πληρότητος, τέταρτον δὲ περὶ σκληρότητος διείλεκται.*

²⁾ Gal. VIII 578.

³⁾ Gal. a. a. O.: *ἐξηγούμενος* (sc. Archigenes) *δὲ τί ποτ' ἐστὶ, τὴν κατὰ σύστασιν ἢ διάλυσιν τῆς ἀρτηρίας ἀντίληψιν εἶπεν, ἐξ ὧν δηλονότι τῶν ἀπλῶν αὐτὴν εἶναι βούλεται. ταῦτα μὲν οὖν εὐθὺς κατ' ἀρχὰς ἡμάρτηται τῷ Ἀρχιγένει περὶ τὴν ἐξαρίθμησιν τῶν πρώτων ποιοιήτων, ἃς οὐδ' ἀποδείξαι, πῶς τοσαῦται τὸν ἀριθμὸν εἰσιν, ἠξίωσεν, ἀλλ' ἀπλῶς ὡδί πως ἔρῳψε τὸν λόγον κτλ.*

⁴⁾ Gal. VIII 647: *Δῆλον οὖν ὡς οὐδ' ὅπη διήνεγκεν ὁ σφοδρὸς σφυγμὸς τῆς αἰτίας, ὑφ' ἧς γίγνεται, διηρθρωμένως ἐγίνωσκεν ὁ Ἀρχιγένης. καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ τόνῳ τῆς κινήσεως τῶν ἀρτηριῶν τὴν σφοδρότητα τίθεται, δεόν τοῦτο μὲν αἷτιον εἰπεῖν σφοδρότητος, αὐτὴν δὲ κατὰ τὸ ποιὸν τῆς πληγῆς φάναι συνίστασθαι βίαιόν τινα οὖσαν καὶ ἀντιβατικὴν προσβολήν.*

⁵⁾ Gal. XIX 634.

⁶⁾ Ruf. ed. Ruelle p. 231.

τόνον τῆς δυνάμεως· δ' τὸ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς πληγῆς· ε' τὸ παρὰ τὸν χρόνον τῆς ἡσυχίας· ς' τὸ παρὰ τὴν σύστασιν· ζ' τὸ παρὰ τὴν ὁμαλότητα καὶ ἀνωμαλίαν· η' τὸ παρὰ τὴν τάξιν καὶ ἀταξίαν· θ' τὸ παρὰ τὸ πλήθος καὶ τὸ κενόν· ι' τὸ παρὰ τὸν ῥυθμόν. Da thatsächlich die beiden von Galen für Archigenes bezeugten Gattungen in dieser Aufzählung wiederkehren, so halte ich jeden Zweifel an der Authenticität des Autornamens für ausgeschlossen. Somit haben wir als Thatsache zu constatieren, daß Archigenes in seiner Pulslehre zehn Pulsgattungen unterschieden hat; bei dem Zusammenhang seiner Lehren mit philosophischen Theorieen ist es sehr wahrscheinlich, daß die Zehnzahl der aristotelischen Kategorieen ihn veranlaßt hat, für seine Pulsgattungen nach dieser Rundzahl zu suchen.

Das gewonnene Resultat ist deshalb von hoher Bedeutung, weil mit einem Schlage klar wird, daß die Pulseinteilung, die Galen seinen beiden Schriften *περὶ τῶν σφυγμῶν τοῖς εἰσαγομένοις* und *περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν* zu Grunde gelegt hat, und die in der Pseudogalenischen Schrift *περὶ σφυγμῶν πρὸς Ἀντώνιον* wiederkehrt, dem Archigenes in etwas modificierter Gestalt entlehnt ist, wovon eine Gegenüberstellung jeden überzeugen kann:

Gal. VIII 455 f.:	Gal. XIX 629:	Archigenes:
1. κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς· μέγας, μικρός, μέσος.	1. παρὰ τὸ ποσὸν τῶν διαστάσεων· μέγας, μικρός.	1. τὸ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς· μέγας, μικρός, μέσος.
2. κατὰ τὸ ποιὸν τῆς κινήσεως· ταχύς, βραδύς, μέσος.	2. παρὰ τὸ ποιὸν (ποσόν Hds.) τῆς κινήσεως· ταχύς, βραδύς.	2. τὸ παρὰ τὸ ποιὸν τῆς κινήσεως· ταχύς, βραδύς, μέσος.
3. κατὰ τὸ τῆς πληγῆς ποιόν· σφοδρός, ἀμυδρός, μέσος.	3. παρὰ τὸν τόνον τῆς δυνάμεως· σφοδρός, ἀμυδρός.	3. τὸ παρὰ τὸν τόνον τῆς δυνάμεως· σφοδρός, ἀμυδρός, μέσος.
4. <κατὰ τὴν σύστασιν>· σκληρός, μαλακός, μέσος.	4. παρὰ τὴν σύστασιν τοῦ ὀργάνου· σκληρός, μαλακός.	4. τὸ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς πληγῆς· ἰσχυρός ?

- | | | |
|---|---|--|
| 5. <i>κατὰ τὸν χρόνον τῆς
ἡσυχίας oder κατὰ τὸ
ποσὸν τοῦ χρόνου·
πυκνός, ἀραιός, μέ-
σος.</i> | 5. <i>παρὰ τὸ ποσὸν τῶν
ἡρεμιῶν·
πυκνός, ἀραιός.</i> | 5. <i>τὸ παρὰ τὸν χρόνον
τῆς ἡσυχίας·
πυκνός, ἀραιός, μέ-
σος.</i> |
| 6. <i>κατὰ τὴν ὁμαλότητα
καὶ ἀνωμαλίαν.</i> | 6. <i>παρὰ τὴν ὁμαλότητα
καὶ τὴν ἀνωμαλίαν.</i> | 6. <i>τὸ παρὰ τὴν σύ-
στασιν·
σκληρός, μαλακός,
μέσος.</i> |
| 7. <i>κατὰ τὴν τάξιν ἢ ἀ-
ταξίαν.</i> | 7. <i>παρὰ τὴν τάξιν καὶ
ἀταξίαν.</i> | 7. <i>τὸ παρὰ τὴν ὁμαλό-
τητα καὶ ἀνωμαλίαν.</i> |
| 8. <i>κατὰ τὸ πλῆθος καὶ
τὸ κενόν·
πλήρης, κενός, μέσος.</i> | 8. <i>παρὰ τὸ πλήρες καὶ
κενόν.</i> | 8. <i>τὸ παρὰ τὴν τάξιν
καὶ ἀταξίαν.</i> |
| 9. <i>κατὰ τὸν ρυθμόν.</i> | 9. <i>παρὰ τὸν ρυθμόν
(ἀριθμόν Hds.).</i> | 9. <i>τὸ παρὰ τὸ πλῆθος
καὶ τὸ κενόν.</i> |
| | 10. <i>παρὰ τὴν θερμασίαν
τὴν ἀναδιδομένην
διὰ τοῦ σώματος τῆς
ἀριτηρίας.</i> | 10. <i>τὸ παρὰ τὸν ρυθμόν.</i> |

Kehren wir zu der Schrift des Archigenes zurück, von der Galen bezeugt, daß sie nicht aus mehreren, sondern aus einem umfänglichen Buche bestanden hat¹⁾. Sie war mit Zugrundelegung der Qualitäten-einteilung nach einzelnen *λόγοι* geordnet, von denen jeder ein oder mehrere *κεφάλαια* umfasste. Ihre Folge läßt sich aus Galen fast vollständig herstellen.

λόγος α'. περὶ μεγέθους σφυγμοῦ²⁾.

Der Anfang des ersten Capitels ist von Galen³⁾ erhalten: „τὸ μέγεθος τοῦ σφυγμοῦ γενικῶς λέγεται· ἔχει γὰρ μέγεθος καὶ ὁ μικρὸς σφυγμὸς καὶ ὁ μέγας.“ Zu dieser Gattung rechnete er den großen, kleinen, und den in der Mitte zwischen beiden Extremen liegenden Puls (*μέσος*)⁴⁾. Da das Substrat des Pulses,

¹⁾ Gal. VIII 754.

²⁾ Gal. VIII 591: σὺν δὲ, μὴ ταραχθεὶς ἐν τούτῳ, λαβὼν ἀνάγνωθι τὸ τοῦ Ἀρχιγένους βιβλίον αὐτοῖς πρῶτον μὲν τὸ ἐπίγραμμα τοῦ κεφαλαίου τοιοῦτον ἔχον· „περὶ μεγέθους σφυγμοῦ“. Vgl. VIII 578. 582.

³⁾ Gal. VIII 591.

⁴⁾ Gal. VIII 591. 603.

die Schlagadern, Körper sind, die sich infolge der Füllung mit Blut und Pneuma in die Länge, Breite und Höhe ausdehnen können, so konnte er unter dem Begriff *μέγεθος* nur die körperliche Gröfse verstehen, oder wie er sich ausdrückte, den Umfang der Erhebung der Schlagadern¹⁾: *αὐτὸς γοῦν ὁ Ἀρχιγένης μέγεθος εἶναι φησι σφυγμοῦ τὸν ὄγκον τῆς ἐπαναστάσεως τῶν ἀρτηριῶν*. Nach den drei Dimensionen der Körper unterschied er als Unterarten des grossen Pulses den langen (*μακρός*), breiten (*πλατύς*), hohen (*ύψηλός*) und als Unterarten des kleinen den kurzen (*βραχύς*), schmalen (*στενός*) und niedrigen (*ταπεινός*) Puls²⁾. Seine Definitionen der drei ersten Unterarten sind bei Galen zu lesen³⁾. Darnach erklärte er die Entstehung des langen Pulses aus der übermäfsigen Ausdehnung der Schlagadern in die Länge, während Breite und Höhe derselben normal bleiben, die des breiten Pulses aus der übermäfsigen Ausdehnung der Arterien in die Breite und die des hohen aus der übermäfsigen Erhebung derselben. Aus der Combination dieser drei Definitionen ergibt sich von selbst der Schluss, dafs er die Entstehung des grossen Pulses von der übermäfsig grossen Ausdehnung der Schlagadern nach den drei Dimensionen und die des kleinen von der übermäfsig kleinen Ausdehnung abhängig gemacht hat. Wir erhalten demnach folgende Definitionen der zu dieser Gattung gehörenden neun Pulsarten:

1. *Μέγας ἐστὶ σφυγμός ὁ κατὰ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος τῆς ἀρτηρίας ἐπὶ πολὺ διῡσταμένης γινόμενος*. Vgl. Gal. VIII 455. 461. Ps.-Gal. XIX def. 208 p. 404, 1. Ruf. 228. Ps.-Gal. XIX 634.

2. *Μικρὸς σφυγμός ἐστὶν ὁ τοῦναντίον ἐπ' ἐλάχιστον κατὰ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος ἐπαιρομένης τῆς ἀρτηρίας ἐπιτελούμενος*. Gal. VIII 455. Ps.-Gal. XIX def. 208 p. 404, 3.

3. *Μέσος ἐστὶν ὁ μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων κατὰ φύσιν σύμμετρος*. Ps.-Gal. XIX def. 208 p. 404, 6.

4. *Μακρός ἐστὶ σφυγμός ὁ κατὰ μῆκος τῆς ἀρτηρίας διῡσταμένης ἐφ' ἱκανόν, στενουμένης δὲ κατὰ τὸ πλάτος*

¹⁾ Gal. VIII 598.

²⁾ Gal. VIII 602.

³⁾ Gal. a. a. O.: „εἰσὶ δὲ τινες ἄλλοι σφυγμοὶ οὔτε μέσοι οὔτε μεγάλοι οὔτε μικροὶ κατὰ μέγεθος θεωρούμενοι ἢ τὰς γε τοῦ μεγέθους διαστάσεις.“ Es folgen seine Definitionen.

καὶ ταπεινότερον ἐγειρομένης γινόμενος. Gal. VIII 603. Vgl. 455. 461.

5. Πλατύς ἐστι σφυγμός ὁ πλατείας μὲν τῆς διαστολῆς, ταπεινῆς δὲ <καὶ> κατὰ τὸ μῆκος βραχείας ὑποπιπτούσης γινόμενος. Gal. VIII 603. 608. Vgl. 461.

6. Ὑψηλός ἐστι σφυγμός ὁ ἱκανῶς εἰς ὕψος ἐπαιρομένης <τῆς ἀρτηρίας>, στενῆς δὲ καὶ βραχείας κατὰ μῆκος γινόμενος σπάνιος ὢν. Gal. VIII 603. 461.

7. Βραχύς ἐστι σφυγμός ὁ κατὰ μῆκος τῆς ἀρτηρίας ἐπ' ἐλάχιστον διῷσιαμένης, στενουμένης δὲ κατὰ τὸ πλάτος καὶ ταπεινότερον ἐγειρομένης γινόμενος. Vgl. Gal. VIII 455. 605.

8. Στενός ἐστι σφυγμός ὁ στενῆς μὲν τῆς διαστάσεως, ταπεινῆς δὲ καὶ κατὰ τὸ μῆκος βραχείας ὑποπιπτούσης γινόμενος.

9. Ταπεινός ἐστι σφυγμός ὁ ἐπ' ἐλάχιστον κατὰ βάθος ἐπαιρομένης τῆς ἀρτηρίας, στενῆς δὲ καὶ βραχείας κατὰ μῆκος γινόμενος.

Zu dieser Klasse gehören noch mehrere zusammengesetzte Pulsarten, deren Vorhandensein Archigenes daran erkannte, daß bei der Berührung zwei Dimensionen der Pulsadern besonders auffallen: er kannte deren sechs¹⁾, je nachdem die Arterie bei der Berührung zugleich übermächtig kurz und niedrig, kurz und eng, lang und breit, lang und hoch, breit und hoch, eng und niedrig erscheint²⁾.

Im übrigen hatte er sich in dem ersten λόγος auf die Definitionen der einzelnen Pulsarten und auf kurze Bemerkungen über die unterscheidenden Merkmale derselben beschränkt, dagegen die

¹⁾ Gal. VIII 606: *Τί γάρ φησιν εὐθὺς ἐφεξῆς· „συντρεχουσῶν γὰρ πολλάκις καὶ δυοῖν τινων διαστάσεων, ὥσθ' ἅμα βραχὺν καὶ ταπεινὸν εἶναι ἢ βραχὺν καὶ στενὸν, ἐπὶ τε τῆς ἐτέρας συζυγίας μακρὸν καὶ πλατὺν ἢ μακρὸν κοὶ ὑψηλόν.“* Gal. VIII 615: *σύνδυο δὲ διαστάσεις ἅμα νοεῖν οὐθ' ὡς πρὸς τὴν τοῦ ὕλου σφυγμοῦ συμπλήρωσιν ἀναγκαῖον οὐθ' ὡς πρὸς μίαν τὴν κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς. διὰ τοῦτο περὶ τὸς ὁ περὶ αὐτῶν λόγος καὶ καλῶς μὲν ὑφ' ἡμῶν ἐκόντων παρελήφθη, κακῶς δ' ὁ Ἀρχιγένους οἶον ἐσπάραξεν αὐτὸ, καὶ μόνας ἐξ εἰπῶν συζυγίας, τὰς ἄλλας μίαν οὖσας καὶ εἴκοσι παρέλιπεν.*

²⁾ Die Theorie Galens ist im Wesentlichen eine spitzfindige Weiterbildung der pneumatischen. Er unterschied, je nachdem eine Dimension der Pulsader oder alle drei von der normalen Beschaffenheit abweichen, 9—27 verschiedene Arten (Gal. VIII 502 f. 615).

Frage nach ihrer Entstehung und nach der Prognose, die sie ermöglichen, unerörtert gelassen ¹⁾).

λόγος β'. περὶ σφοδρότητος σφυγμοῦ ²⁾).

Da Archigenes erst im dritten Capitel vom starken Pulse handelte ³⁾, so schliesse ich daraus, daß der erste λόγος περὶ μεγέθους die drei ersten Capitel umfaßte. Zu dieser Klasse rechnete er den starken und schwachen Puls: σφοδρός, ἀμυδρός und μέσος ⁴⁾. Der Anfang ist erhalten: „Τὴν σφοδρότητα τοῦ σφυγμοῦ οὐκ εἶναι ἀπλῶν ποιοτήτων φησὶ Μάγνος ⁵⁾. ὅλως γὰρ ⁶⁾, φησὶν, ἡ σφοδρὰ πληγὴ οὐ γίνεται, εἰ μὴ ναστοῦ ὄντος τοῦ προσπίπτοντος, μεγάλου καὶ ταχέος ἐπιφερομένου. ἐφ' ᾧ μετ' ὀλίγον οὕτως ἄρα φησί· καὶ σφοδρότης σφυγμοῦ ἐκ τάχους, μεγέθους [σφοδρότητος], πληρότητός ἐστι σύνθετος.“ Er polemisierte also zu Beginn dieses λόγος gegen die Auffassung des Pneumatikers Magnus, der die σφοδρότης nicht für eine einfache, sondern für eine aus μέγεθος, πληρότης und τάχος zusammengesetzte Qualität hielt und seine Meinung mit aller Entschiedenheit gegen Angriffe seiner Schule vertrat. Archigenes verstand unter der σφοδρότης den τόπος der Bewegung der Arterien, er identifizierte sie also mit der Ursache der zu dieser Klasse gehörenden

¹⁾ Gal. VIII 658.

²⁾ Gal. VIII 578. 591. 638. 659.

³⁾ Gal. VIII 638.

⁴⁾ Gal. VIII 591: „οὐκοῦν γένος μὲν ἡ σφοδρότης, εἶδη δ' αὐτῆς ὅ τε σφοδρὸς σφυγμὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ ὁ μέσος.“

⁵⁾ Gal. VIII 638.

⁶⁾ Die folgenden Worte stehen Gal. VIII 932. Sie gehören nach meiner Meinung an diese Stelle. Die eigenen Worte des Magnus lauteten so (Gal. VIII 640): „χρὴ τοίνυν καὶ μέγεθος ἀξιόλογον εἶναι τοῖς σφυγμοῖς καὶ πληρότητα καὶ μετὰ τάχους προσπίπτειν τοῖς δακτύλοις, εἰ μέλλει τις κυριολογεῖν σφοδρὸν σφυγμὸν ὀνομάζων. πῶς οὖν τοῦτον καλῶς ἐν ταῖς ἀπλαῖς διαφοραῖς κατέταξαν, σύ (sc. Demetrios, der Adressat seiner Schrift περὶ τῶν ἐφευρημένων μετὰ τοὺς Θεμίσωνος χρόνους VIII 640) μοι διαίτησον. σοὶ γὰρ ἐπιβάλλει μᾶλλον τὰς κυριολογίας κρίνειν καὶ ἀπὸ τῶν ὀνομάτων τεκμαίρεσθαι τὴν ὑπόστασιν τῶν σηματομένων. ἐγὼ δ' οὐκ ἀλλάσσω τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην μέχρι τοῦδε. φημὶ δὲ τὸ τῆς σφοδρότητος ὄνομα σημαίνειν οὐχ ἀπλὴν διαφορὰν σφυγμῶν, σύνθετον (σύμμετρον Hds.) δὲ ἐκ μεγέθους καὶ τάχους καὶ πληρότητος.“

Pulsarten¹⁾. Seine Vorgänger²⁾ hatten in der Erklärung derselben weit mehr das Richtige getroffen; sie leiteten sie aus der Heftigkeit des Pulsschlages her, die sie bald *τὸ ἀντιβατικὸν τῆς προσβολῆς τῶν ἀρτηριῶν*, bald *τὸ βίαιον* oder *τὸ ἰσχυρὸν* oder *τὸ ἀνατρεπτικὸν* nannten. Archigenes erwähnte ihre Erklärung³⁾, verwarf sie aber mit der seltsamen Berichtigung, daß die Heftigkeit des Pulsschlages während der ganzen Ausdehnung der Arterien und nicht erst am Ende derselben auftrete, gleich als wenn seine Vorgänger gesagt hätten: *ἔστιν σφοδρότης ἀντιβατικὴ πληγὴ κατὰ τὸ πέρασ τῆς διαστολῆς γινομένη*. In seinen Definitionen des starken und schwachen Pulses vereinigte er beide Charakteristika in der Weise, daß er sie vom *τόνος* der Arterienbewegung und der Beschaffenheit des Pulsschlages abhängig machte: *„σφοδρός ἐστι σφυγμὸς ὁ μείζονα τόνον ἔχων τῆς κινήσεως καὶ ῥοιζώδης*

¹⁾ Gal. VIII 643: *κατὰ γοῦν τοῦτον αὐτὸν λόγον τὸν περὶ τῆς σφοδρότητος ὁ Ἀρχιγένης, ὅταν μὲν γράφῃ· „ὡς ἐκ τοῦ καθ' ἓνα χωρισμοῦ φαιερὰ γίγνεται καθ' αὐτὴν ἢ σφοδρότης οὕσα ὁ τόνος, ὡς εἶπον, τῆς τῶν ἀρτηριῶν κινήσεως.“* Vgl. 938. 644. 647. 650. 659. Über die Ursache der Stärke des Pulses waren die Ärzte verschiedener Meinung: während Herophilos und Athenaios sie in der Stärke der animalischen Kraft in den Arterien sahen, machten Asklepiades und Erasistratos sie von der Menge und Feinheit des Pneuma abhängig (Gal. VIII 646). Galen verstand unter der *σφοδρότης* die Heftigkeit des Pulsschlages, als Ursache betrachtete er den *τόνος* der Arterienbewegung (VIII 647. 668).

²⁾ Agathinos gehörte z. B. zu den Vertretern dieser Ansicht. Seine Definitionen lauteten (Gal. VIII 937): *„διότι μὲν οὖν σφοδρός ἐστιν ὁ σφυγμὸς βιαίως κρούων τὴν ἀφὴν καὶ κατὰ τὴν πρόσασιν ἰσχυρῶς αὐτὴν ἀνατρέπων, δῆλον τ' ἐστὶν αὐτόθι καὶ συμφωνεῖται τοῖς πλείστοις.“* εἴτ' ἐπιφέρων φησί· *„τῶν ἐναντίων ἐπινενοημένων δηλονότι περὶ τὸν ἀμυδρὸν σφυγμόν· ἀμενηνῶς γὰρ καὶ ἐκλύτως πρόσσεισι τῇ ἀφῇ.“*

³⁾ Gal. VIII 644: *Πολλῶ τοίνυν ἄμεινον οἱ πρὸ Ἀρχιγένους περὶ σφυγμῶν γράψαντες, οἱ μὲν τὸ ἀντιβατικὸν, οἱ δὲ τὸ βίαιον, οἱ δὲ τὸ ἰσχυρὸν, οἱ δὲ τὸ ἀνατρεπτικὸν τῆς προσβολῆς τῶν ἀρτηριῶν ἐκάλεσαν σφοδρότητα. καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ Ἀρχιγένης ἐπίσταται. τί γοῦν φησι;*

„δοκεῖ δὲ τισι ἐν τῇ τῆς ἀφῆς πληγῇ κείσθαι, καθ' ὃ καὶ πληγὴν „ἀπ' ἀρτηρίας φασὶν αὐτὴν τινες.“

εἴτ' οὐκ οἶδ' ὅπως οἴεται διαβάλλειν αὐτῶν τὴν δόξαν ὡς πῶς γράφων·

„φαίνεται δὲ καθ' ὅλην τὴν διαστολὴν τὸ στεγανὸν τῆς ὀρμῆς, „καθ' ὃ καὶ εἰ προσπιέσκειμεν τοὺς δακτύλους, στερεωτέρα ὑποπίπτει ἢ πληγὴ, οὐ κατὰ τὸ πέρασ τῆς διαστολῆς, ἀλλὰ ἀνωτέρω „(κατωτέρω Hds.) τότε γινομένη.“ Vgl. VIII 938.

ων· ἀμυδρός δὲ ὁ ἐκλελυμένον τὸν τόνον ἔχων καὶ ἀσύστροφον τὴν πληγὴν“¹⁾. Außerdem kannte er mehrere subtile Unterarten²⁾ des schwachen Pulses, so den σφυγμὸς ἀβαρής oder ἀμαυρός, dessen Wesen darin besteht, daß der Pulsschlag ohne Kraft und Schwere ist; davon unterschied er eine andere Pulsart, den σφυγμὸς βαρύς, bei welcher der Schlag ebenfalls kraftlos, aber schwer ist. Galen bezeichnet beide Pulsarten als Geschenke des Archigenes³⁾: ihre Unterscheidung sei nur leeres Gerede, da sich die Schwere des Pulsschlages niemals nachweisen lasse. Ferner unterschied er den behinderten (παραπεποδισμένος) oder unterdrückten (πεπιεσμένος) Puls, bei dem sich die Schwere nicht äußerlich, sondern innerlich fühlbar macht, den gereizten (ἐξερι-

¹⁾ Gal. VIII 647. Die Bedeutung des Zusatzes ῥοιζώδης ὧν wird klar durch die zweite Definition. Darnach beruht der schwache Puls auf Kraftlosigkeit der Bewegung und auf Schwäche (ἀσύστροφον = ἀσθενῆ) des Schlages. Da sich beide Definitionen entsprechen, kann der Zusatz nur die Stärke des Pulsschlages bezeichnen. Vgl. Gal. 649 f. Die Definitionen bei Ps.-Galen XIX def. 213 p. 406, 5 gehen demnach auf Archigenes zurück: σφοδρός ἐστι σφυγμὸς ὁ τὴν κίνησιν εὐτονον ἔχων καὶ βιαίαν ποιούμενος τὴν πληγὴν. ἀμυδρός ἐστιν ὁ ἐκλυτον ἔχων τὸν τόνον καὶ τὴν πληγὴν ποιούμενος ἀσθενῆ. μέσος ἐστὶν ὁ ἀναλογίαν τινὰ σώζων πρὸς ἑκάτερον τούτων.

²⁾ Gal. VIII 651: ἡ μὲν οὖν ῥῆσις αὕτη τοῦ Ἀρχιγένους τόνδε τὸν τρόπον ἔχει·

„ἐστὶ δὲ κατὰ τὴν σφοδρότητα τοιαύταις καὶ ἄλλαις ἐντυγχάνειν „διαφοραῖς, ἐν αἷς ἐκλελυμένη ἐμπίπτει ἡ πληγὴ καὶ ἀβαρής, ὃν „ἀμαυρὸν σφυγμὸν ἤδη τινὲς ἐκάλεσαν. ἄλλη δὲ βαρεῖα μὲν, ἐκ- „λυτος <δέ>· ταύτην ἀμυδροῦ σφυγμοῦ διαφορὰν θείη τις ἂν. ἡ „δ’ οὐκ ἐκλυτος μὲν, ἀλλ’ οἷον παραπεποδισμένη καὶ εἴσω ῥέπον „τὸ βάρος ἔχουσα, πεπιεσμένη καὶ δεδυκνῦα, διαφορὰ κατὰ σφοδρό- „τητα εἶη ἂν σφυγμοῦ. καὶ κατὰ τὸν σφοδρὸν, ἡ μὲν τις πληγὴ „εἶη ἂν ἐξεριστική, ὑγρότερον ἐξωθοῦσα τὴν ἀφὴν, οἷα ἀπὸ τροφῆς „μάλιστα νεαρᾶς ἐγγίνεται, ἡ δὲ δύσθραυστός ἐστι μᾶλλον, οἷον „διηγκωνισμένου (vgl. 662) τοῦ κινουῦντος, ἡ δ’ ἐν πάθει (πείσει „Hds.) τισι καὶ ἐπὶ τοῖς ἐν σαρκὶ πλεονασμοῖς φαίνεται.“

Vgl. VIII 628, wo dasselbe Excerpt verkürzt wiederkehrt.

³⁾ Gal. VIII 659: ἐν δὲ τῷ περὶ τοῦ βαρέος τε καὶ ἀβαροῦς, ὡς αὐτὸς ὀνομάζει, λόγῳ, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἔτι καὶ τοῦτο θαυμασιῶς οὕτως ἔγραψεν· „ὃν ἀμαυρὸν σφυγμὸν ἤδη τινὲς ἐκάλεσαν“ (vgl. vorhergehende Anmerkung) . . . οὗτοι μὲν δὴ δύο σφυγμοὶ, βαρύς τε καὶ ἀβαρής, Ἀρχιγένεια δῶρα, μέχρι τοῦ λαληθῆναι προελθόντες οὐδεμίαν ἔχουσι διάγνωσιν.

στικός) Puls, der sich feucht anfühlt und sich besonders nach der Mahlzeit einstellt, den *διηγωνισμένος*¹⁾, der eine Steigerung des starken Pulses darstellt. Auch den *ἰσχυρὸς σφυγμός* unterschied er nach dem Grad der Stärke des Pulsschlages vom *σφοδρός*²⁾.

*λόγος γ'. περὶ πληρότητος σφυγμοῦ*³⁾.

Diese Gattung befaßt den vollen und den leeren Puls unter sich⁴⁾. Beide Pulsarten, die nach dem einstimmigen Urteil des Archigenes und Galen⁵⁾ dem Herophilos unbekannt waren, hatten den jüngeren Ärzten viel Kopfzerbrechen gemacht⁶⁾: die einen suchten die Ursache derselben in dem Zustande der Arterienhaut (*κατὰ τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας*)⁷⁾ die andern in der *οὐσία*, welche die Arterie enthält, wobei sie bald auf das *ποσόν*, bald auf das *ποιόν*, bald auf beides den Hauptnachdruck legten. Archigenes⁸⁾ entschied sich für die Ansicht derjenigen Ärzte, welche die *πληρότης* von der in den Arterien enthaltenen Flüssigkeit (*κατὰ τὸ ἔγχυμα τῆς ἀρτηρίας*) herleiteten. Der volle Puls ist nach seiner Definition daran kenntlich, daß die Schlagader bei der Berührung mit Flüssigkeit vollgepfropft erscheint, während der leere Puls eine blasenartige Erhebung der Schlagader zeigt, die beim Druck auf die Arterie keinen Widerstand leistet⁹⁾: „ἔστι δὲ πλήρης σφυγμός ὁ ναστο-

¹⁾ Gal. VIII 666.

²⁾ Gal. VIII 666.

³⁾ Gal. VIII 578. 592.

⁴⁾ Gal. VIII 591: εἶτα πάλιν ἐφειλίξας τὸ βιβλίον ὀλίγον τὴν ἀρχὴν ἀνάγνωθι τοῦ περὶ τῆς πληρότητος λόγου τοιαύτην οὖσαν. „τῷ πλήρει σφυγμῷ καὶ τῷ κενῷ ἔστι κοινὸν γένος. τοῦτ' ἔσθ' ὅτε πληρότης καλεῖται“. Vgl. 582.

⁵⁾ Vgl. Gal. VIII 592. 959.

⁶⁾ Vgl. Gal. VIII 670.

⁷⁾ Gal. VIII 575: εὐρίσκω γὰρ τοὺς νεωτέρους ἰατροὺς, τοὺς μὲν, ὅταν ὁ τῆς ἀρτηρίας χιτῶν ὅπως ἔχει συστάσεως μηνῦσαι θελήσωσι, τῷ τε τοῦ πλήρους ὀνόματι καὶ τῷ τοῦ κενοῦ κατὰ τοῦτο χρωμένους, τοὺς δ' ὅταν τὴν ἐν τῇ κοιλότητι περιεχομένην οὐσίαν. καὶ ταύτης οἱ μὲν τὸ ποσὸν διὰ τῶν ὀνομάτων δηλοῦσθαι νομίζουσιν, οἱ δὲ τὸ ποιόν, οἱ δ' ἀμφοτέρω.

⁸⁾ Gal. VIII 509: ἄλλο γένος ἦν σφυγμῶν ἐμφαῖνον, ὥς φασι (sc. Archigenes) τὸ τῆς ἀρτηρίας ἔγχυμα, μακροῦ δεόμενον, ὥς ἐμοὶ δοκεῖ, εἰς διάγνωσιν ἀκριβῆ λόγου. Vgl. 944.

⁹⁾ Gal. VIII 509. 941. Die Definitionen bei Ps.-Gal. XIX def. 209 p. 404,9 geben wieder die Ansicht des Archigenes wieder: „πλήρης ἔστι σφυγμός ὁ διάμεστος πρὸς τὴν ἀφῆν ὑποπίπτων, ὥστε καὶ αὐτὸν μὲν τὸν χιτῶνα τῆς

τέραν ἐπιδεικνὺς τὴν ἀρτηρίαν καὶ τὴν ὑπόπτωσιν αὐτῆς δια-
σεσαγμένην ἐγχύλως· κενὸς δὲ ὁ πομφολυγώδης τὴν ἔγερσιν
τῆς ἀρτηρίας ποιούμενος, ὥστε κατὰ τὸν ἐπιπιεσμὸν τῶν δα-
κτύλων κενεμβάτησιν ὑποπίπτειν.“ Sein Lehrer Agathinos hatte
die πληρότης von der Spannung (τόνος) des in den Arterien ent-
haltenen Pneuma hergeleitet und beide Pulsarten in folgender Weise
definiert ¹⁾: „παρακολουθεῖ γὰρ ἐν ταῖς ἐπισκέψεσι πληρότητος
καὶ κενότητος σφυγμοῦ, τοῦ μὲν πλήρους τεταμένον καὶ ἔξερει-
στικὸν δι’ ὅλον τὸ πνεῦμα παριστάντος, τοῦ δὲ κενοῦ διαρρέον
καὶ ταῖς ἀντιβάσεσιν ἐναφαιζόμενον, ὡς ῥήξει τινὸς ὑδατί-
νης πομφόλυγος εἰκέναι.“ Die Vergleichung dieser beiden De-
finitionen mit denen des Archigenes läßt deutlich die Abhängigkeit
desselben von Agathinos erkennen: der Unterschied besteht darin,
daß Archigenes den Saft d. h. das Blut, Agathinos dagegen das
Pneuma als den in der Schlagader enthaltenen Stoff ansah. In
seiner Auffassung des Begriffs πληρότης ist sich Archigenes nicht
consequent geblieben; bald versteht er darunter den in der Arterie
enthaltenen Stoff, bald die Beschaffenheit der Arterienhäute und
endlich die Spannung des Pneuma ²⁾. Wenn er z. B. als ein
charakteristisches Merkmal des vollen Pulses die ohnmächtige Kraft-
wirkung der Arterienbewegung (τὸ καρῶδες τῆς δυνάμεως) an-
sieht, die ein kundiger Arzt ebenso leicht erkennen könne wie ein
Weinkenner den vollen Wein, so weist das Wort καρῶδες, das
eine Dyskrasie des Pneuma bezeichnet, darauf hin, daß er in diesem

ἀρτηρίας ἐπισημότερον δοκεῖν γεγονέναι· μάλιστα δὲ τὸ ἐντὸς αὐτῆς μεσιό-
τερόν τε καὶ σωματωδέστερον καταλαμβάνεσθαι. κενός ἐστι σφυγμός, καθ’
ὃν αὐτῆς τε τῆς ἀρτηρίας ἡ περιοχὴ παντάπασιν ἰσχνὴ καὶ πομφολυγώδης
ἐστὶν καὶ τὸ ἐγχυμα ἄμαυρόν καὶ ἐξίτηλον, ὥστε καὶ ἂν τις πίεσῃ τοῖς
δακτύλοις κενεμβατήσεως ἀντίληψιν ὑποπίπτειν. Μέσος ἐστὶ σφυγμός ὁ
σύμμετρος μεταξὺ πλήρους τε καὶ κενοῦ μέσος καὶ ὅς κατὰ φύσιν ἐστί.“

¹⁾ Gal. VIII 936.

²⁾ Gal. VIII 575: Ἀρχιγένηι δ’ ὡς εἰκεν, οὐκ ἀρκεῖ μόνον ταῦτα, προσ-
επισάγει δ’ ἡμῖν καὶ τὸ τῆς τοῦ πνεύματος δυνάμεως σημαινόμενον.
576: Ὅσον δ’ εἰς τὰ προκείμενα χρηστὸν εἰρήσεται, τὸ μήθ’ ὀρίζεσθαι
πάντα ἀξιοῦν μήτε πολλὰ σημαινόμενα προειπόντα τὸν ὀρισμὸν ἓνα ποιεῖν,
ὅπερ ἐπὶ τοῦ πλήρους σφυγμοῦ διημάριται τῷ Ἀρχιγένηι. διὰ τοῦτο οὐδ’
αὐτὸς ὁ ὅρος αὐτοῦ σαφής ἐστίν, οὐδ’ ἔχει συμβαλεῖν, εἴτε περὶ τοῦ σώματος
τῆς ἀρτηρίας, εἴτε περὶ τῆς ἐν τῇ κοιλότητι περιεχομένης οὐσίας διαλέγεται.
κινδυνεύει γὰρ ὀνόματος ὀρισμὸν, οὐ πράγματος ποιεῖσθαι. Vgl. 943 f.

Falle die *πληρότης* von der Kraftwirkung des Pneuma abhängig gemacht hat¹⁾).

λόγος δ' περὶ τῆς σκληρότητος σφυγμοῦ²⁾.

Zu dieser Klasse rechnete Archigenes den harten und weichen Puls. Gal. VIII 592 (584): „ἔστι δὲ μαλακότητος καὶ σκληρότητος σφυγμοῦ κοινὸν γένος, ὃ τάχ' ἂν τριβείη καλεῖται σκληρότης.“ Beide Arten leitete er im Gegensatz zu den zeitgenössischen Ärzten³⁾ von der Consistenz der Arterie (*σύστασις ἢ διάλυσις τῆς ἀρτηρίας*) her. Dieselbe Herleitung weisen die von Ps.-Galen XIX def.

¹⁾ Gal. VIII 944: τί δ' ἐν τῷ περὶ πληρότητος λόγῳ ποτὲ μὲν λέγειν αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως·

„ὥστε καὶ εἴ τις τὸν πλήρη μὴ κατ' οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν θεωρεῖν βούλοιτο.“

καὶ μετ' ὀλίγον·

„τάχα δὲ τὸ ἐν δυνάμει καρῶδες ἐπὶ τῶν τοιούτων τὸν πλήρη σφυγμὸν χαρακτηρίζει, ὀνόματα ὄντα τῆς δυσκρασίας τοῦ πνεύματος. καὶ ὃν τρόπον διαγευσάμενοι οἴνου τὸν πλήρη διαγινώσκουσιν οἱ οἶνογεῦσται, οὕτω καὶ οἱ σφυγμῶν ἔμπειροι τὸν πλήρη κατὰ τὸ καρῶδες τῆς δυνάμεως, καὶν μεσόκενος ἢ, διαθεωροῦσιν.“
„ὃν τρόπον δὲ καὶ ἐρίων ἢ σύστασις αὐτόθεν ἐστὶ ληπτὴ, καθ' ἣν κενὰ καὶ πλήρη λέγεται, καὶ οἴνου ποιότης οὐ προστάτιουσα, ἀλλ' αὐτόθι παρακειμένη τῇ γλώττῃ διαγινώσκεται, καθ' ἣν τοὺς πλήρεις καὶ κενούς οἶνους διαχωρίζομεν καὶ τοῦ σώματος δ' αὐτοῦ κenoῦ καὶ πλήρους ἀντιλαμβανόμεθα, ἐν τε τῷ κατὰ φύσιν τι ἔχειν ἄλλο ἐν τε ταῖς παρὰ φύσιν διαθέσεσιν καὶ ἐπὶ φλεγμονῆς, οἰδήματος, ἐμφυσήματος, οὕτω καὶ τὰς ἀγυμνάστους σάρκας τῶν γεγυμνασμένων διακρίνομεν.“

Vgl. Gal. VIII 678.

²⁾ Gal. VIII 578. 592.

³⁾ Gal. VIII 508: τὸ δὲ τέταρτον τῶν γενῶν τὸ κατὰ τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας συνιστάμενον εἰς τρεῖς τέμνεται καὶ αὐτὸ διαφορὰς καὶ καλεῖται παρὰ μὲν τοῖς πλείστοις τῶν ἰατρῶν καὶ μάλιστα τοῖς νεωτέροις τῷ τοῦ πλήρους ὀνόματι καὶ τῷ τοῦ κenoῦ. τὸ γὰρ μέσον ἀμφοῖν ἀνώνυμον κἀνταῦθα. παρ' ἡμῖν δ' οὐχ οὕτως. ἀλλ' ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν σκληρὸς, ὁ δὲ ἕτερος μαλακὸς ὀνομάζεται καὶ δηλοῦσιν ἀμφότεροι τῆς ἀρτηρίας τὴν σύστασιν. εἰ δ' ὀρθότερον οὕτως ἢ ἐκείνως ὀνομάξιν, ὅτῳ καὶ τούτων μέλει, διὰ τῶν ἐξῆς μαθήσεται. Daß Galen diese Berichtigung aus Archigenes entlehnt hat, ergibt sich aus VIII 578: ἐξηγούμενος δὲ (sc. Archigenes) τί ποτ' ἐστὶ, τὴν κατὰ σύστασιν ἢ διάλυσιν τῆς ἀρτηρίας ἀντίληψιν εἶπεν, ἐξ ὧν δηλονότι τῶν ἀπλῶν αὐτὴν (sc. τὴν σκληρότητα) εἶναι βούλεται. Vgl. Ruf. 232.

210 p. 405, 1 erhaltenen Definitionen auf. Ich nehme sie deshalb unbedenklich für Archigenes in Anspruch: „*Σκληρός ἐστὶ σφυγμός, ἐφ’ οὗ νευρώδης, ὡς ἂν εἴποι τις, καὶ ἀπόκροτος ἢ ἀρτηρία φαίνεται καὶ τὸ ἐνὸν πνεῦμα τεταμένον, ὥστε καὶ τὴν πληγὴν ἔχειν τι ἀποπληκτικόν. Μαλακὸς σφυγμός ἐστὶν ὁ ὑπεναντίος τῷ σκληρῷ ἀνειμένην καὶ ἀπαλὴν ἔχων τὴν ἀρτηρίαν καὶ τὸ ἐνὸν πνεῦμα ἐκλελυμένον καὶ τὴν πληγὴν προσηνεστέραν. Μέσος σφυγμός ἐστὶν ὁ μεταξὺ τοῦ σκληροῦ τε καὶ μαλακοῦ κατὰ φύσιν σύμμετρος*“¹⁾). Da von Archigenes ausdrücklich bezeugt wird²⁾), daß er bei der Erklärung des Begriffs der *σκληρότης* auch die Beschaffenheit der Wärme der Arterie berücksichtigt hat, so glaube ich schliessen zu dürfen, daß er den warmen und kalten Puls zu dieser Klasse gerechnet hat. Ihre Definitionen stehen bei Ps.-Gal. XIX def. 212 p. 405, 18: *Θερμὸς σφυγμός ἐστὶν, ὅτε ἢ ἀρτηρία τῶν πλησίων μερῶν θερμότερα ἄπτεται ὥσπερ ἐν ἐκτικῷ πυρετῷ. ψυχρὸς σφυγμός ἐστὶν, ἐν ᾧ ἢ ἀρτηρία ψυχρότερα καταλαμβάνεται. Μέσος ἐστὶν, ὃς τὴν τοῦ ψυχροῦ τε καὶ θερμοῦ σύμμετρίαν ἔχει*. Vermutlich gehören auch die von Ps.-Gal. XIX 211 p. 405, 9 erhaltenen Definitionen des feuchten und trockenen Pulses hierher. Das einzige, was wir noch aus diesem λόγος erfahren, ist, daß Archigenes den harten Puls als ein untrügliches Kennzeichen aller Fieber betrachtet hat³⁾).

*λόγος ε΄. περὶ τάχους καὶ πυκνότητος σφυγμοῦ*⁴⁾).

In diesem Abschnitt behandelte er den schnellen und langsamen, den häufigen und seltenen Puls⁵⁾). Die beiden ersten Pulsarten leitete er von der Beschaffenheit der Arterienbewegung (*κατὰ τὸ ποιὸν τῆς κινήσεως*), die beiden letzten von dem Zeitmaße der Pause (*κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἡσυχίας*) her⁶⁾). Über ihre Ent-

¹⁾ Daß die Beschaffenheit des Pneuma in der Definition des Archigenes ebenfalls Berücksichtigung fand, bezeugt Gal. VIII 693.

²⁾ Gal. VIII 693.

³⁾ Gal. VII 310. 311. 686. Vgl. S. 00.

⁴⁾ Gal. VIII 628: *Πάλιν δ’ ἐν τῷ περὶ πυκνότητος καὶ τάχους ὡδί πως γράφει· „ὀλίγοι δέ τινες ἐμφαίνουσι σαινόμενοι διαφορὰς“ καὶ κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ παντὸς λόγου· „ταχύτητος μὲν δη καὶ πυκνότητος διαφοραὶ αὐταί.“* Vgl. 593.

⁵⁾ Gal. VIII 593.

⁶⁾ Ruf. 232.

stehung waren die Ärzte verschiedener Meinung, je nachdem sie zugeben, daß die Zusammenziehung der Arterie fühlbar sei oder nicht¹⁾. Diese Frage nach der Fühlbarkeit der *συστολή* war ein Gegenstand des Streites in den verschiedenen Schulen gewesen: während Herophilos und die Herophileer sie fast ohne Ausnahme bejahten²⁾, behaupteten die Empiriker³⁾, daß nur der Pulsschlag fühlbar sei, einige Erasistrateer endlich und nach ihnen einige Pneumatiker wie Agathinos leugneten die Fühlbarkeit der *συστολή*⁴⁾. Archigenes schloß sich der Ansicht des Herophilos an und behauptete sogar, daß man selbst bei mageren Menschen die Bewegungen der Arterien an den fleischlosen Körperteilen deutlich erkennen könne⁵⁾. Diejenigen, welche die Fühlbarkeit leugneten, unterschieden zwischen der Zeit der Bewegung, die sie mit dem Pulsschlag (*πληγή*) oder der Ausdehnung (*διαστολή*) identifizierten und derjenigen der Ruhe (*ἡσυχία, διάλειμμα*). Von dem Zeitmaße der Bewegung machten sie den schnellen und langsamen, von dem der Ruhe den häufigen und seltenen Puls abhängig. Der schnelle Puls entsteht, wenn die Ausdehnung der Arterie kurze Zeit in Anspruch nimmt, der langsame, wenn sie zu ihrer Ausdehnung längere Zeit gebraucht, der häufige, wenn die Zeit der Pause kurz ist und umgekehrt⁶⁾. Da von den Pneumatikern, soviel wir wissen, Agathinos zu den Vertretern dieser Ansicht gehörte, so ist es nicht unmöglich, daß von ihm die entsprechenden Definitionen in Ps.-Galens *ὄροι* def. 214 p. 406, 10 (= Gal. VIII 511)⁷⁾ entlehnt sind: „*Ταχὺς σφυγμός ἐστιν ὁ μὲν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ κινουμένης τῆς ἀρτηρίας γινόμενος. βραδύς ἐστι σφυγμός ὁ ἐν πολλῷ χρόνῳ κινουμένης τῆς ἀρτηρίας γινόμενος. μέσος ἐστὶ σύμμετρος ὁ ἐν συμμέτρῳ χρόνῳ κινουμένης τῆς ἀρτηρίας γινόμενος.* def. 215: „*Πυκνὸς σφυγμός ἐστιν ὁ δι' ὀλίγου χρόνου τῆς ἀρτηρίας διαστελλομένης γινόμενος. ἀραιός ἐστιν ὁ διὰ πολλοῦ χρόνου τῆς ἀρτηρίας διαστελλομένης γινόμενος. μέσος ἐστὶν ὁ μεταξὺ τοῦ πυκνοῦ τε καὶ ἀραιοῦ σύμμετρος.*“ Diejenigen Ärzte, welche die Fühlbar-

1) Gal. VIII 509.

2) Gal. VIII 787.

3) Gal. VIII 776.

4) Gal. VIII 771. 786. 787.

5) Gal. VIII 779.

6) Gal. VIII 511.

7) Galen bezeugt selbst am Schluß von c. 6 p. 512, daß er diese Definition entlehnt habe.

keit der *συστολή* zugaben, wie Herophilos und Archigenes, unterschieden bei jedem Puls vier Zeitmomente: Zusammenziehung, Ausdehnung und zwischen beiden jedesmal ein Moment der Ruhe. Die Entstehung des schnellen und langsamen Pulses erklärten sie aus dem Zeitmafs der Ausdehnung und Zusammenziehung, die Entstehung des häufigen und seltenen Pulses machten sie dagegen von dem Zeitmafs der beiden Ruhepausen nach der *διαστολή* und *συστολή* abhängig¹⁾. Wieder sind die entsprechenden Definitionen von Pseudogalen a. a. O. erhalten: ihre Zurückführung auf Archigenes scheint mir gesichert zu sein: *Ταχύς ἐστι σφυγμός ὁ σύντομον ἔχων τὴν διαστολὴν καὶ συστολήν. βραδύς ἐστι σφυγμός ὁ βραδεῖαν ἔχων τὴν διαστολὴν τε καὶ τὴν συστολήν. μέσος ἐστὶν ὁ σύμμετρον ἔχων τὴν διαστολὴν καὶ συστολήν. Πυκνός σφυγμός ἐστίν, ὅτε βραχύς ἐστὶν ὁ χρόνος μεταξὺ τῆς διαστολῆς καὶ συστολῆς. ἀραιός ἐστι σφυγμός, ὅτε ὁ τῆς ἡσυχίας χρόνος τῆς μεταξὺ διαστολῆς καὶ συστολῆς μέσης χρονίζει μακρός. μέσος ἐστὶν ὁ διὰ τοῦ συμμέτρου μεταξὺ χρόνου τῆς ἀρτηρίας διαστελλομένης γινόμενος.*

In der Erklärung der Entstehung des schnellen Pulses war Archigenes von Magnus abgewichen, der behauptet hatte, daß der schnelle Puls durch die Kraft der Bewegung der Arterien hervorgebracht werde, der häufige durch die Schwäche ihrer Bewegung²⁾.

1) Gal. VIII 512 f.

2) Gal. IX 8: οὔτε γὰρ ὁ ταχύς, ὥς τιςιν ἔδοξεν, οὔθ' ὁ μέγας οὔθ' ὁ πυκνός ἐκπυρρυνμένης αἰὲς γίνεται τῆς φύσεως, οὔθ' ὁ βραδύς ἢ μικρὸς ἢ ἀραιὸς σβεννυμένης, ἀλλ' οἱ περὶ τούτων ἀμφισβητοῦντες ὁμοίως ἀμαρτάνουσιν Ἀρχιγένει πρὸς Μάγνον διαφερομένῳ περὶ τάχους σφυγμοῦ, ὥς οὐχ ὑπὸ ῥώμης μᾶλλον ἢ ἀρρώστιας γίνεται δυνάμεως. Gal. IX 18: ἄξιον οὖν ἐνταῦθα μέμψασθαι καὶ Ἀρχιγένει καὶ Μάγνῳ καὶ πολὺ γε μειζόνως τῷ Ἀρχιγένει. ὁ μὲν γὰρ εἰ καὶ μὴ πᾶν τὸ ἀληθές, ἀλλὰ μέρος τι καλῶς κατεῖδεν, ὁ δ' Ἀρχιγένους δέον τὸ λείπον προσθεῖναι καὶ τὸ καλῶς ἠύρημένον ἀνατρέπειν πειρᾶται γράφων ὡδί· δίκαιον γὰρ αὐτὴν παραθέσθαι τὴν λέξιν· „ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀρτιγενῶν μικρὸς παντελῶς ὁ σφυγμός ἐστι καὶ οὐ σφοδρὸς καὶ πυκνός ἄγαν καὶ ταχύς. Μάγνος δὲ οὐκ εἶναι ταχὺν αὐτόν φησι, δι' ὅλου συστήσαι βουλόμενος τὸ μὴ οἰκεῖον ἀσθενεῖα τὸν ταχὺν σφυγμὸν εἶναι, ἀλλὰ τὸν πυκνόν· ἐστὶ γὰρ καὶ τὰ τηλικαῦτα ἀσθενῆ.“ καὶ μικρὸν ὁ Ἀρχιγένους προελθὼν „ἐμοὶ μὲν οὐ κατὰ ἰσχὺν, φησὶ, τὸ τάχος δοκεῖ κεῖσθαι, ὅταν εὖρω ἐπὶ χολερικῶν καὶ ἐπὶ καρδιακῶν συνηρημένην τὴν κίνησιν τῶν ἀρτηριῶν“. Vgl. IX 21.

Archigenes vertrat die entgegengesetzte Ansicht¹⁾ und begründete sie damit, daß bei der Cholera und Herzkrankheit, denen der schnelle Puls eigen sei, die Bewegung der Arterien geschwächt sei. Aus dieser Auffassung erklärt sich seine von Galen bestrittene Behauptung²⁾, daß der Puls der Neugeborenen schnell sei.

λόγος ε'. περὶ ῥυθμοῦ.

Ob Archigenes seine Theorie von Rhythmos des Pulses in diesem *λόγος* oder im letzten vorgetragen hat, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen. Die Worte des Galen (VIII 659) scheinen darauf hinzudeuten, daß dieser *λόγος* dem über die Gleichmäßigkeit und Ordnung des Pulses vorausgegangen ist. Im allgemeinen macht ihm Galen den Vorwurf, daß er in diesem *λόγος* zu wenig auf die diagnostischen Merkmale der verschiedenen zu dieser Klasse gehörenden Pulsarten geachtet habe; andererseits erkennt er an, daß er die einzelnen Pulsarten ausführlich behandelt habe³⁾. Der Rhythmos des Pulses wurde entweder von dem Verhältnis des Zeitmaßes der Diastole mit nachfolgender Pause zu dem der Systole mit Pause oder von dem Zeitverhältnis der Diastole zur Systole oder endlich von dem der Diastole zu der ganzen übrigen Zeit abhängig gemacht⁴⁾. Welche Ansicht Archigenes vertreten hat, muß zweifelhaft bleiben. Da er diese ganze Theorie im Wesentlichen dem Herophilos entlehnt hat⁵⁾, so ist es notwendig, auf dieselbe näher einzugehen, zumal über diesen Teil seiner Pulslehre so genügende Zeugnisse vorliegen, daß eine Reconstruction möglich ist. Das Charakteristische derselben besteht darin, daß er die rhythmischen Gesetze der Musik auf sie übertragen hat⁶⁾. Bedenkt man, daß kurz vor Herophilos von einem Schüler des Aristoteles, Aristoxenos von Tarent, die Theorie der Musik in mustergültiger, von allen Musikern des Altertums anerkannter Weise behandelt worden ist, so liegt die Vermutung nahe, daß Herophilos das musikalische System desselben bei der Behandlung der Pulstheorie herangezogen

¹⁾ Gal. IX 19

²⁾ Gal. IX 18. Dieselbe Ansicht bei Gal. VIII 464 und XIX 635.

³⁾ Gal. VIII 659.

⁴⁾ Gal. VIII 512. 909.

⁵⁾ Gal. VIII 870 f.

⁶⁾ Plin. h. n. XI 219. XXIX 6. Censorin d. n. c. XII p. 30, 17 (J.).

hat¹⁾. Bestätigt wird diese Vermutung durch die Übereinstimmung mit ihm im Inhalt und in der Terminologie. Die Theorie des Herophilos ist zu rekonstruieren aus Gal. VIII 515. 871. 911. IX 278. 463. Dafs diese Partieen zusammengehören, folgt mit Notwendigkeit aus der Übereinstimmung des Inhalts²⁾. Ihre Zurückführung auf Herophilos wird gesichert durch seine wiederholte Erwähnung. Die herophileische Definition von $\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$ steht bei Ps.-Soran de pulsibus³⁾: „*Quid est rhythmus pulsus? Herophilus* (2 Hds.: Pórfilus, Porfilus pr. m. Profilus corr.): *rhythmus est motio in temporibus ordinationem habens definitam*“, oder griechisch $\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma \acute{\epsilon}\sigma\tau\iota \kappa\acute{\iota}\nu\eta\sigma\iota\varsigma \acute{\epsilon}\nu \chi\rho\acute{o}\nu\omicron\iota\varsigma \tau\acute{\alpha}\xi\iota\nu \acute{\epsilon}\chi\omicron\upsilon\sigma\alpha \acute{\omega}\rho\iota\sigma\mu\acute{\epsilon}\nu\eta\nu$ ⁴⁾. Er verstand also unter Rhythmos des Pulses die Bewegung desselben nach einer bestimmten Ordnung von Zeiteilen. Wie in der Musik der rhythmofähige Stoff sich in alle möglichen Zeitgrößen bringen läßt, also sowohl eine eurhythmische als arrhythmische Gestalt annehmen kann⁵⁾, so ist es beim Pulse mit dem Verhältnis von Diastole und Systole. An sich hat jeder Puls seinen Rhythmos, ist also $\acute{\epsilon}\rho\theta\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$. Als solcher begreift er unter sich den $\acute{\alpha}\rho\theta\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$ und $\epsilon\upsilon\text{-}\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$ $\sigma\phi\upsilon\gamma\gamma\mu\acute{o}\varsigma$ ⁶⁾: $\acute{\alpha}\rho\theta\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$ heifst jeder Puls, bei dem das normale rhythmische Verhältnis gestört ist. Er läßt sich wieder in drei Gruppen teilen: $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$, $\acute{\epsilon}\tau\epsilon\rho\acute{o}\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$ und $\acute{\epsilon}\kappa\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}\varsigma$. Da nach der Theorie des Herophilos jeder Altersstufe ein besonderer Puls eigen ist, so nannte er den Puls, bei dem das rhythmische

1) Gal. VIII 912.

2) Vgl. besonders Gal. VIII 515 und 911.

3) V. Rose, Anecdota gr. II 265.

4) Seine Definition ist also von seinem Schüler Bakcheios herübergenommen worden. Ps.-Gal. XIX def. 220 p. 408, 18: $\text{Βακχεῖος ὁ Ἡροφίλειος εἶπε· ῥυθμός ἐστι κίνησις ἐν χρόνοις τάξιν ἔχουσα} \langle \acute{\omega}\rho\iota\sigma\mu\acute{\epsilon}\nu\eta\nu \rangle$. Ähnlich der Herophileer Zenon. Vgl. Ps.-Gal. 409, 1. Bei Aristoxenos heifst es: $\text{Ἀκόλουθον δὲ ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις καὶ αὐτῷ τῷ φεινομένῳ τὸ λέγειν, τὸν ῥυθμὸν γίνεσθαι, ὅταν ἡ τῶν χρόνων διαίρεσις τάξιν τινὰ λάβῃ ἀφωρισμένην}$. Ich citiere nach Bartels Aristoxeni elementorum rhythmicorum fragmentum, Bonn 1854, p. 6, 4.

5) Vgl. Aristoxenos p. 7, 6: $\text{Τὸ δὲ ῥυθμιζόμενον ἐστὶ μὲν κοινόν πως ἀρρυθμίας τε καὶ ῥυθμοῦ· ἀμφοτέρω γὰρ πέφυκεν ἐπιδέχεσθαι τὸ ῥυθμιζόμενον τὰ συστήματα, τό τε εὐρρυθμον καὶ τὸ ἀρρυθμον}$.

6) Gal. VIII 515 = Ps.-Gal. XIX def. 221, 8 f. Die gemeinsame Quelle ist Archigenes, der wieder den Herophilos benützte: Gal. IX 470 f.

Verhältnis gewahrt erscheint, *εὐρυθμος*; im anderen Falle *ἄρρυθμος*. Zeigt der Puls das rhythmische Verhältnis der nachfolgenden Altersstufe, so nannte er ihn *παράρρυθμος*; hat er den Rhythmos einer der beiden andern Lebensalter, so galt er als *ἐτερόρρυθμος*; weist er keinen der den Lebensaltern eigenen Rhythmen auf, so wurde er als *ἔρρυθμος* bezeichnet. Jeder Puls zerfällt in zwei Hauptteile, Diastole und Systole, von denen er die Diastole als die Senkung, die Systole als die Hebung betrachtete und deren Verhältnis er nach der Zahl der *χρόνοι πρώτοι* bestimmte¹⁾. Die Zeitabschnitte der Diastole und Systole stehen bei jedem Pulsschlage in einem bestimmten Verhältnis zum *χρόνος πρώτος*, sie sind entweder ebenso groß oder das zweifache, dreifache, vielfache desselben²⁾. Er unterschied, wie Aristoxenos, zwei *λόγοι* des rhythmischen Pulses: 1. *λόγος ἴσος*, 2. *λόγος ἄνισος*³⁾. Beim *λόγος ἴσος* ist die Zeitdauer der Diastole derjenigen der Systole gleich,

1) Gal. IX 463: γέγραπται μὲν οὖν καὶ Ἡρόφιλος τὰ κατὰ τοὺς χρόνους μετὰ τῆς διαστολῆς τε καὶ συστολῆς, ἕνεκα τῶν ἡλικιῶν εἰς ῥυθμοὺς ἀνάγοντι τὸν λόγον. ὥσπερ γὰρ ἐκείνους οἱ μουσικοὶ κατὰ τινὰς ὠρισμένας χρόνων τάξεις συνιστῶσι παραβάλλοντες ἀλλήλαις ἄρσιν καὶ θέσιν, οὕτως καὶ Ἡρόφιλος ἀνάλογον μὲν ἄρσει τὴν διαστολὴν ὑποθέμενος, ἀνάλογον δὲ θέσει τὴν συστολὴν τῆς ἀρτηρίας ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ νεογενοῦς παιδίου τὴν τήρησιν ἐποιήσατο Gal. VIII 911.

2) Gal. VIII 913: πῶς οὖν Ἡρόφιλος πρῶτόν τινα πρὸς αἰσθησιν ὑποτίθεται χρόνον, ᾧ τοὺς ἄλλους μετρῶν ἢ δυοῖν ἢ καὶ τριῶν ἢ καὶ πλειόνων εἶναι φάσκει, ἥτοι τελέων τε καὶ ὡς αὐτοὶ καλοῦσιν ἀπαράύξων ἢ καὶ ἀπηυξημένων ἐπ' ὀλίγον ἢ ἐπὶ πλεῖον ἢ ἐπὶ πλεῖστον;

3) Gal. VIII 516: ἀπάντων δὲ τῶν ῥυθμῶν οἱ μὲν ἐν ἴσῳ λόγῳ συνίστανται, οἱ δὲ ἐν ἀνίσῳ· ἐν ἴσῳ μὲν, ὅταν ὁ τῆς διαστολῆς χρόνος ἴσος ὑπάρχῃ τῷ τῆς συστολῆς· ἐν ἀνίσῳ δὲ, ὅταν θάτερος αὐτῶν ὑπερέχῃ. γίνεται δὲ τοῦτο ποτὲ μὲν ἐν ῥηταῖς, ποτὲ δὲ ἐν ἀρῥήτοις ταῖς ὑπεροχαῖς· καὶ ἐν ῥηταῖς μὲν διχῶς ἢ ὡς ἐν πολλαπλασίῳ λόγῳ ἢ ὡς ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμὸν, ὅσπερ καὶ ἐπιμόριος ὀνομάζεται. πολλαπλάσιος μὲν οὖν λόγος ἐστὶν ὁ διπλάσιος ἢ τριπλάσιος ἢ τετραπλάσιος ἢ τις τῶν ἐξῆς. ὡς ἀριθμοῦ δὲ πρὸς ἀριθμὸν, ὅταν ἡλίκων ἢ διαστολὴ δυοῖν ἢ χρόνων, τηλικούτων ἢ συστολῇ, πέντε ἢ ἐπὶ ἢ ἐννέα ἢ ἑνδεκα· ἀρῥήτοις δὲ τριχῶς μὲν καθόλου· ἢ γὰρ ὁ τῆς διαστολῆς χρόνος ἀρῥητός ἐστιν ἢ ὁ τῆς συστολῆς ἢ ἀμφότεροι. κατὰ μέρος δὲ τούτων ἕκαστος ποτὲ μὲν ἐπ' ὀλίγον παρηυξημένους ἔχει τοὺς ἀρῥήτους χρόνους, εἴτε πλείους εἴεν, εἴθ' εἰς ὁ πρῶτος, ποτὲ δὲ ἐπὶ πλεόν, ποτὲ δὲ ἐπὶ πλεῖστον. ὅτι δὲ πρῶτον χρόνον οὐ πρὸς τὴν φύσιν αὐτὴν, ἀλλὰ πρὸς αἰσθησιν ἀκούειν χρὴ, πρόδηλον. οὕτω γὰρ ἔχει καὶ παρὰ τοῖς μουσικοῖς. Vgl. Aristoxenos 14, 4 ff.

beim *λόγος ἄνισος* ist ihr Zeitverhältnis ungleich. Diese Ungleichheit ist entweder rational (*ῥηταὶ ὑπεροχαί* = *ῥητοὶ χρόνοι* des Aristoxenos). Rational ist sie, wenn sich das Verhältnis der Zeitteile der Diastole und Systole durch ganze Zahlen als ein Vielfaches des *χρόνος πρῶτος* darstellen läßt, d. h. wenn der eine Bestandteil des Pulses das *διπλάσιον*, *τριπλάσιον*, *τετραπλάσιον* u. s. w. des andern ist oder wenn sich das Verhältnis durch ganze Zahlen, die nicht ein Vielfaches des zweiten Bestandteiles sind, darstellen läßt (*λόγος ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμόν*), z. B. wenn die Diastole aus 2 Zeiten, die Systole dagegen aus 5, 7, 9, 11 *χρόνοι πρῶτοι* besteht¹⁾. Irrational sind entweder nur die Diastole oder nur die Systole oder beide Bewegungsmomente zu gleicher Zeit. Irrational heißen sie, wenn sie in einem nicht durch ganze Zahlen auszu-drückenden Verhältnis zum *χρόνος πρῶτος* stehen. Herophilos bezeichnete sie als *χρόνοι ἀπηυξημένοι* (*παρηυξημένοι*) *ἐπ' ὀλίγον ἢ ἐπὶ πλεῖον ἢ ἐπὶ πλεῖστον*, die *χρόνοι ῥητοί* als *τέλειοι* oder *ἀπάρανξοι*. Ein Unterschied der herophileischen Theorie von der des Aristoxenos ist ihre grössere Reichhaltigkeit. Während Aristoxenos nur drei Arten von Metren unterschieden hatte: *τὸ γένος ἴσον*, *διπλάσιον* und *ἡμιόλιον* und jedes andere Verhältnis für arhythmisch ausgegeben hatte, liefs Herophilos den *λόγος τριπλάσιος*, *τετραπλάσιος* u. s. w., sogar den *λόγος ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμόν* als rhythmisch gelten. Dagegen schlofs er sich darin wieder an Aristoxenos an, dafs er den dreizeitigen Puls als kürzesten betrachtete, also den denkbar kleinsten, den zweizeitigen nicht anerkannte²⁾. Im engen Anschlufs an diese Theorie behandelte Hero-

¹⁾ Gal. VIII 913. 915 f.

²⁾ Ruf. p. 224, 1: *Τῶν μὲν οὖν ἀρτιγενῶν παίδων ὁ σφυγμὸς ὑπάρχει βραχὺς παντελῶς καὶ οὐ διωρισμένος ἐν τε τῇ συστολῇ καὶ τῇ διαστολῇ. Τοῦτον τὸν σφυγμὸν Ἡρόφιλος ἄλογον συνεστάναι φησὶν· ἄλογον δὲ καλεῖ σφυγμὸν τὸν μὴ ἔχοντα πρὸς τινα ἀναλογίαν· οὔτε γὰρ τὸν διπλάσιον οὔτε τὸν ἡμιόλιον οὔτε ἕτερόν τινα λόγον ἔχει οὗτος, ἀλλὰ ἐστὶ βραχὺς παντελῶς καὶ τῷ μεγέθει βελόνης κεντήματι ὁμοίως ἡμῖν ὑποπίπτει· διὸ καὶ πρῶτον αὐτὸν Ἡρόφιλος ἄλογον δεόντως εἶπεν. Vgl. Gal. IX 464: Ἡρόφιλος . . . ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ νεογενοῦς παιδίου τὴν τήρησιν ἐποιήσατο, πρῶτον χρόνον αἰσθητὸν ὑποθέμενος, ἐν ᾧ διαστελλομένην εὗρισκε τὴν ἀρτηρίαν, ἴσον δ' αὐτῇ καὶ τὸν τῆς συστολῆς εἶναι φησιν, οὐ πάνυ τι διοριζόμενος ὑπὲρ ἑκατέρας τῶν ἡσυχιῶν.*

philos den Puls der einzelnen Lebensalter¹⁾. Der Puls der Neugeborenen besteht nach seiner Meinung aus zwei kurzen Zeiten, entspricht also dem Pyrrhichius²⁾ und wurde von ihm σφυγμός ἄλογος genannt. Beim Puls der Jünglinge ist die Zeitdauer der Diastole das doppelte von derjenigen der Systole; es entsprechet dem Trochäus. Den Puls des Mannes nannte er σφυγμός διὰ ἴσου, weil Diastole und Systole wie beim Spondäus in gleichem Verhältniss zu einander stehen³⁾. Der Puls der Greise endlich besteht wie derjenige der Jünglinge aus drei Zeiten, aber mit dem Unterschiede, dass auf die Systole zwei Zeiten entfallen; der Puls entspricht dem Jambus. Bei diesem Puls kann unter Umständen das abnorme Verhältniss eintreten, dass die Diastole aus zwei χρόνοι πρώτοι, die Systole dagegen aus zehn Zeitabschnitten besteht⁴⁾. Der Puls der Kinder ist nach seiner Ansicht gross genug, um in ihm ein rhythmisches Verhältniss zu erkennen; welches dies gewesen, er-

1) Ruf. 224 f. Gal. IX 463 f. 278. 499.

2) Ruf 224, 12: ὁ μὲν γὰρ πρῶτος ἐπὶ τῶν ἀρτιγενῶν παίδων εὐρισκόμενος σφυγμός ρυθμὸν λήπεται τὸν τοῦ βραχυσυλλάβου· καὶ γὰρ ἐν τῇ διαστολῇ καὶ τῇ συστολῇ βραχὺς ὑπάρχει καὶ διὰ τοῦτο δίχρονος νοεῖται. Vgl. Gal. IX 464.

3) Ruf. 224, 15: Ὁ δὲ τῶν πρὸς αὕξησιν ὄντων ἀναλογεῖ τῷ τε παρὰ κεῖνοις (sc. γραμματικοῖς) ποδὶ τροχαίῳ· ἔστι δὲ οὗτος τρίχρονος, τὴν μὲν διαστολὴν ἐπὶ δύο χρόνους λαμβάνων, ἐπὶ ἓνα δὲ τὴν συστολὴν. Ὁ δὲ τῶν ἀμαζόντων ταῖς ἡλικίαις ἐν ἀμφοτέροις ἴσος ὑπάρχει ἐν τε τῇ διαστολῇ καὶ τῇ συστολῇ, συγκρινόμενος τῷ καλουμένῳ σπονδείῳ, ὅς τῶν δισυλλάβων ποδῶν μακρότατός ἐστιν· ἔστιν οὖν συγχείμενος ἐκ χρόνων τεσσάρων. Τοῦτον τὸν σφυγμὸν Ἡρόφιλος διὰ ἴσου καλεῖ. Ὁ δὲ τῶν παρακμαζόντων καὶ σχεδὸν ἤδη γερόντων καὶ αὐτὸς ἐκ τριῶν σύγκειται χρόνων, τὴν συστολὴν τῆς διαστολῆς διπλὴν παραλαμβάνων καὶ χρονιωτέραν.

4) Gal. IX 278: Ἐξῆς δ' ἐστὶν ἐπὶ γε τῇ τάξει τοῦ λόγου περὶ ρυθμῶν διελθεῖν, ὑπὲρ ὧν Ἡροφίλῳ μὲν ἐπὶ πλεον εἴρηται τήρησιν τινα καὶ ἐμπειρίαν ἱστοροῦντι μᾶλλον ἢ λογικὴν μέθοδον ἐκδιδάσκοντι. Τοὺς γὰρ καθ' ἐκάστην ἡλικίαν ὡς τὸ πολὺ φαινομένους ρυθμοὺς τῶν σφυγμῶν ἔγραψε, πρῶτον μὲν οὐδ' ἐφ' ὧν τινων φύσεων εἰτήρησεν αὐτοὺς οὐδὲν ἡμῖν εἰπών· εἰτ' ἐξ αὐτῶν ὧν διδάσκει δῆλον ὅτι συγκέχυται τε καὶ ἀδιάρθρωτός ἐστι περὶ τὴν τῆς συστολῆς τε καὶ τῶν ἡρεμιῶν διάγνωσιν. εἴπερ γὰρ ἡγεῖται ποτε δύνασθαι γενέσθαι συστολὴν ἐπὶ τῶν γεγηρακότων ἄχρι δὴ τῶν δέκα πρώτων χρόνων ἐκτεταμένην, εὐδελός ἐστι τῆς ὄντως συστολῆς ἀναισθήτως ἔχων. αὕτη γὰρ ἐνίοτε μὲν ὀλιγοχρονιωτέρα τῆς διαστολῆς ἐστίν, ἐνίοτε δ' ἰσόχρονός ἐστιν, ὅτε δὲ, ὡς κεῖνος γράφει, πολυχρονιωτέρα μὲν, οὐ μὴν, ὡς οἶεται, πενταπλασίῳ, ἀλλὰ βραχεῖ τινι μείζων. Vgl. IX 465.

fahren wir nicht¹⁾, er nannte ihn sogar *εὐμεγέθης*²⁾. Mit dieser Beobachtung steht die Ansicht des Archigenes im Widerspruch, daß der Puls der Kinder klein sei³⁾. Inwieweit seine Beobachtung, daß der Puls der Neugeborenen ganz klein, häufig und schnell⁴⁾, der der *ἀκμάζοντες* groß und derjenige der Greise klein sei⁵⁾, von älterer Tradition beeinflusst ist, läßt sich nicht ausmachen. Dagegen scheint er in seiner Behandlung des Pulses in den verschiedenen Krankheiten, Jahreszeiten und Beschäftigungen wieder unter dem Einfluß herophileischer Doctrin zu stehen⁶⁾.

λόγος ζ'. περὶ τάξεως τε καὶ ἀταξίας, ὁμαλότητος τε καὶ ἀνωμαλίας⁷⁾.

Schon Herophilos hatte in seiner Pulslehre feste Theorien über die Gleichmäßigkeit und Ordnung des Pulses aufgestellt, ohne daß sich genauer feststellen läßt, wie weit er in der Ausbildung derselben gegangen ist. Archigenes begann diesen λόγος mit einer Berufung auf Herophilos, der diese beiden Gruppen als besondere Arten den Gattungen der Größe, Schnelligkeit, Stärke und des Rhythmos gegenübergestellt hatte: Τοῦ μὲν δὴ μὴ καινοτομεῖν πρῶτος Ἀρχιγένης μάρτυς, ὡδί πως γράφων κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ περὶ τάξεως τε καὶ ἀταξίας, ὁμαλότητός τε καὶ ἀνωμαλίας γένους· „Ἡρόφιλος κατὰ γένος τὰς ἄλλας διαφορὰς τῶν σφυγμῶν ἐκθέμενος οὕτως· μέγεθος, τάχος, σφοδρότης, ῥυθμός, ἀσυζύγως κατ' εἶδος τάξεως ἐμνήσθη καὶ ἀταξίας, ὁμαλότητός τε καὶ ἀνωμαλίας⁸⁾. ἐγκαλεῖται τοίνυν ὑπὸ τῶν μικραιτίων ὡς γένεσιν εἶδη ἀντιδιαστελλόμενος“⁹⁾. Seine Definitionen der ἀνωμαλία und ἀταξία sind uns von Galen¹⁰⁾ erhalten: „Ἀνωμαλία μὲν ἀνισότης σφυγμῶν κατὰ τινὰ τῶν παρεπομένων αὐτοῖς

1) Gal. IX 453: τὸν γοῦν τοῦ παιδὸς σφυγμὸν ὁ μὲν Ἡρόφιλος ἱκανὸν τῷ μεγέθει φησὶν ὑπάρχειν, ὁ δ' Ἀρχιγένης μικρόν. Vgl. 493.

2) Gal. VIII 853: ἴσως γὰρ καὶ ὁ τοῦ παιδὸς ὑπὲρ τὸν σύμμετρόν ἐστιν. Ἡρόφιλος γοῦν ποτὲ μὲν εὐμεγέθη τὸν σφυγμὸν τοῦτον ὀνομάζει. τί δὴ ποτ' οὖν, φησί τις, ὁ Ἀρχιγένης μικρόν αὐτὸν εἶναι φησιν; Vgl. 869 ff.

3) Gal. VIII 869 f. 853. IX 453.

4) Gal. IX 18. Vgl. VIII 464. XIX 635.

5) Gal. VIII 866. 869.

6) Gal. VIII 960.

7) Gal. VIII 592. 625. 659.

8) Gal. VIII 625.

9) Gal. VIII 592. Vgl. 956.

10) Gal. VIII 626.

διαφορῶν, ἀταξία δὲ ἀσυστασία χρονικὴ κατὰ τινὰ τῶν τοῦ σφυγμοῦ διαφορῶν.“ Da in der pneumatischen Schrift ὅροι ἱατρικοί beide Definitionen wiederkehren ¹⁾, so glaube ich berechtigt zu sein, auch die beiden vom Verfasser dieser Schrift vorgetragene Definitionen von τάξις und ὁμαλότης für ihn in Anspruch zu nehmen. Sie lauten ²⁾: „Τάξις σφυγμοῦ ἐστὶν σχέσις κατὰ μέγεθος ἢ σφοδρότητα ἢ ῥυθμὸν ἢ ἄλλην τινὰ διαφορὰν. Ὅμαλότης σφυγμοῦ ἐστὶν ἰσότης κατὰ τινὰς τῶν σφυγμῶν διαφορὰς.“ Gleichmäßigkeit und Ungleichmäßigkeit des Pulses kann statt haben bei einem einzigen Pulse ³⁾ und in der Aufeinanderfolge mehrerer Pulse, Ordnung und Unordnung nur in der Aufeinanderfolge mehrerer Pulse, d. h. κατὰ περιόδους. Die Gleichmäßigkeit und Ungleichmäßigkeit in der Aufeinanderfolge mehrerer Pulse nannte er ὁμαλότητες καὶ ἀνωμαλίας συστηματικάι ⁴⁾. Wenn der Puls fortgesetzt in der Weise schlägt, daß die Eigenarten des ersten denen der folgenden in allen Stücken entsprechen, so entsteht der absolut gleichmäßige Puls (καθάπαξ ὁμαλός): „οὐδ’ εἰρήκασιν οὐδ’ ὑπὲρ τούτων, εἶγε δεῖ τὸν κατὰ πᾶσαν διαφορὰν ἴσον ὁμαλὸν λέγειν“ ⁵⁾ und „ἡ μὲν γὰρ καθάπαξ καὶ ἀπολελυμένη πασῶν τῶν διαφορῶν ἰσότης ἐστὶν ὁμαλία (ἐστὶν ἰσότης Hds.).“ Sind aber die Pulse in ihrer Aufeinanderfolge in allen Stücken einander ungleich, so wird daraus der absolut ungleichmäßige Puls (καθάπαξ ἀνώμαλος): „καὶ ἀνώμαλον μὲν σφυγμὸν τὸν καθάπαξ καὶ κατὰ μίαν διαφορὰν ἄνισον λεγόμενον“ ⁶⁾. Die Defini-

¹⁾ Ps.-Gal. XIX def. 217 p. 407, 16: Ἀταξία σφυγμοῦ ἐστὶν ἀκαταστασία τῆς κατὰ τοὺς σφυγμοὺς διαφορᾶς. def. 219 p. 408, 7: Ἀνωμαλία σφυγμοῦ ἐστὶν ἀνισότης σφυγμῶν κατὰ τινὰς τῶν παρεπομένων αὐτοῖς διαφορῶν.

²⁾ Ps.-Gal. XIX def. 216 p. 407, 11. def. 218 p. 408, 3.

³⁾ Gal. VIII 627: ἐξῆς μὲν οὖν ἐστὶ πρόγραμμα τοιοῦτον· „τίς ἢ καθ’ ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλία“. Gal. VIII 517. Die an dieser Stelle vorgetragene Theorie ist die des Archigenes.

⁴⁾ Gal. VIII 518. 556. IX 279: Διπλὸν δ’ αὐτῶν ἐστὶ τὸ γένος· ἔνιοι μὲν ἐν μιᾷ πληγῇ τὴν ἀνωμαλίαν λαμβάνοντες, ἄλλοι δ’ ἐν ἀθροίσματι. καὶ καλεῖν ἕθους ἐστὶ τοῖς νεωτέροις ἱατροῖς (sc. Archigenes und seine Schüler) συστηματικὴν τὴν τοιαύτην ἀνωμαλίαν, ὅτι, οἶμαι, καὶ τὸ ἄθροισμα σύστημα προσαγορεύουσιν.

⁵⁾ Gal. VIII 626.

⁶⁾ Gal. VIII 627. Aus demselben Zusammenhang stammen die folgenden Worte des Archigenes: „ἔσθ’ ὅτε δὲ τὰ μὲν ἄλλα διὰ τριῶν, ὡς εἶπον, ἀνα-

tionen dieser beiden Arten würden also folgendermaßen lauten¹⁾:
Αἱ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἄπασαι διαφοραὶ ταῖς ἐν τοῖς ἐξῆς ἴσαι καθ' ἕκαστον γένος ἔστωσαν, καθάπαξ ὁμαλὸς ὁ τοιοῦτος λεχθήσεται σφυγμός. ἀλλὰ πᾶσαι πάσαις ἀνισοὶ τυγχανέτωσαν οὔσαι, καθάπαξ ἀνώμαλος ὁ τοιοῦτος. Wenn die folgenden Pulse dem ersten nur hinsichtlich einer oder mehrerer *διαφοραὶ* entsprechen, so entsteht der beziehungsweise gleichmäßige oder ungleichmäßige Puls (*πρὸς τι ὁμαλὸς* oder *ἀνώμαλος*): „οἱ μὲν γὰρ τὴν ὁμαλότητα ἐπὶ τινων διαφορῶν ἤκουον μόνον, ἐγὼ δ' ἐπὶ πασῶν ἐφ' ὅσων καὶ τὴν τάξιν“²⁾. Die einzelnen Arten dieses Pulses sind der *ὁμαλὸς σφυγμός* *κατὰ μέγεθος, κατὰ τάχος, κατὰ σφοδρότητα* u. s. w. oder *ὁμαλὸς κατὰ μέγεθος καὶ τάχος, κατὰ μέγεθος καὶ σφοδρότητα* u. s. w. u. s. w. Innerhalb des ungleichmäßigen Pulses ist wieder ein Unterschied zu machen zwischen dem geordneten (*τεταγμένος*) und ungeordneten (*ἄτακτος σφυγμός*), je nachdem die Anomalien eine bestimmte Ordnung haben oder nicht. In gleicher Weise wie beim gleichmäßig-ungleichmäßigen Pulse unterschied er zwischen dem absolut und beziehungsweise geordneten und ungeordneten Pulse (*καθάπαξ τεταγμένος-ἄτακτος, πρὸς τι τεταγμένος-ἄτακτος σφυγμός*). Über diese Unterscheidung des Archigenes besitzen wir hinlänglich Zeugnisse bei Galen, welche die Vermutung zur Gewissheit zu erheben gestatten, daß die Darstellung, die Galen VIII 519f. von dieser Klasse von Pulsen giebt, auf ihn zurückgeht: „καὶ ὁ μὲν καθάπαξ τεταγμένος (καθὰ παρατεταγμένος Hds.), οὗτος καθ' ἡμᾶς ἔσται ἴσος μεγέθει, σφοδρότητι, τάχει, ῥυθμῷ καὶ εἴ τινι ἄλλῃ τοιαύτῃ διαφορᾷ σχέσιν ἔχων θεωρεῖται κατὰ πάσας· πρὸς τι δὲ ὁ κατὰ μίαν τινὰ τούτων διαφορὰν ἐν σχέσει θεωρούμενος ἢ κατὰ δύο ἢ κατὰ πλείονας“³⁾, ferner: „ἔσθ' ὅτε δὲ τὰ μὲν ἄλλα πάντα τεταγμένα ἐστὶν ἢ νῆ Δί' ὁμαλά· μία δέ τις δια-

λογεῖ. ἡ σφοδρότης δὲ ὡς ἂν ἀμφημερινός ἐστιν, ὁμαλῆς οὔσα καὶ ἴση.“
 ἐφεξῆς „ἢ ἄλλη τις τῶν λοιπῶν διαφορῶν ἢ ἄλλη.“ τούτοις δὲ συνάπτων
 τὸν ἐξῆς λόγον ἐρεῖ· „ἀναλογούντων τῶν σφυγμῶν ὁμοῦ τε πάσαις ταῖς
 διαφοραῖς καὶ τινι ἢ τισιν.“

¹⁾ Gal. VIII 519.

²⁾ Gal. VIII 626.

³⁾ Gal. VIII 626.

φορὰ, οἷον τὸ μέγεθος ἢ δύο ἢ πλείους, ἄτακτοι τελέως εἰσίν¹⁾). Folgt z. B. auf drei hinsichtlich ihrer Gröfse völlig gleiche Pulsschläge ein vierter, welcher der Gröfse der vorhergehenden nicht entspricht, so ist dieser Puls ἀνώμαλος κατὰ μέγεθος. Wenn diese Anomalie in der Aufeinanderfolge von Pulsreihen regelmäfsig an vierter Stelle wiederkehrt, so haben wir andererseits den σφυγμὸς τεταγμένος κατὰ μέγεθος. Findet bei dem ungleichmäfsigen Pulse eine gewisse Gleichmäfsigkeit der Veränderung statt, so sprach er von einer ὁμαλὴ ἀνωμαλία. Dazu rechnete er eine bestimmte Pulsart, den σφυγμὸς μύουρος oder μυουρίζων d. h. den spitz ablaufenden Puls, dessen Wesen darin besteht, dafs die einzelnen Pulsschläge sich in bestimmter Gleichmäfsigkeit verkleinern, bis schliesslich die Bewegung des Pulses ganz aufhört. Wenn die Bewegung nicht völlig aufhört, so kann eine doppelte Abstufung eintreten: entweder bleibt der Puls auf der Stufe der allmählich eingetretenen μικρότης oder er nimmt in derselben Weise, wie er vorher abgenommen hat, stetig wieder zu. Die letztere Art nannte er σφυγμὸς μύουρος παλινδρομῶν, die stetig abnehmende σφυγμὸς μύουρος ἐκλείπων²⁾). Dafs diese Pulsart nicht erst von Galen erfunden ist, folgt aus dem unter dem Namen des Rufus gehenden Tractat περὶ σφυγμῶν, in dem ausdrücklich bezeugt wird, dafs der spitz zulaufende Puls zu den ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἀναγεγραμμένων σφυγμῶν³⁾ gehöre, es folgt aber auch aus Galens eigenen Worten⁴⁾: ἔστω τοίνυν ὁ μὲν δεύτερος σφυγμὸς τοῦ πρώτου βραχὺ μικρότερος, ὁ δὲ τρίτος τοῦ δευτέρου τοσοῦτον πάλιν, ἀλλὰ καὶ ὁ τέταρτος τοῦ τρίτου τῷ ἴσῳ, καὶ τοῦτ' ἄχρι πλείονος ἐφεξῆς γενέσθω, τοὺς τοιούτους σφυγμοὺς μυουρίζοντάς τε καὶ μυούρους καλοῦσιν (sc. Archigenes) ἀπὸ τῶν εἰς ὁξὺ τελευτώντων

1) Gal. VIII 627. Aus dem Schlufs dieses λόγος sind uns die Worte erhalten: „νοεῖσθαι γὰρ δεῖ, φησὶν, ἃ ἔφην περὶ τάχους καὶ βραδύτητος ἐπὶ πάσης ἄλλης διαφορᾶς σφυγμοῦ.“

2) Gal. VIII 523 f. IX 509. Ps.-Gal. XIX def. 230 p. 411, 16 f.

3) Ruf. p. 229, 8 f.: λέγεται τις σφυγμὸς μυουρίζων, οὗ πάλιν δύο διαφοραί· ὁ μὲν γὰρ προσπесῶν μέγας τε καὶ σφοδρὸς, εἴτα τὰς ἐξῆς διαστολὰς σμικροτέρας λαμβάνων τελευταῖον πάλιν ὥσπερ καὶ πρότερον μέγας προσέπесе καὶ σφοδρὸς. ὁ δὲ σμικρὸς προσπесῶν καὶ τὰς ἐξῆς προσβολὰς μεγάλας ἀπεργασάμενος πάλιν καὶ οὗτος ὥσπερ πρότερον σμικρὸς προσέπесεν.

4) Gal. VIII 523 f.

σχημάτων τοῦνομα μεταφέροντες τινὲς δ' αὐξάνονται πάλιν, οὓς μνύρους παλινδρομοῦντας καλοῦσι. Im Gegensatz zur ὁμαλῇ ἀνωμαλία gab es auch eine ἀνώματος ἀνωμαλία, die statt hat, sobald sich eine derartige Gleichmäßigkeit der Veränderung überhaupt nicht nachweisen läßt oder nur bis zum dritten, vierten oder fünften Pulsschlage. Zu dieser Klasse rechnete er den gebrochenen Puls (σφυγμὸς παρεμπίπτων) und den aussetzenden (σφυγμὸς διαλείπων)¹⁾. Daß beide Arten dem Archigenes bekannt waren, folgt aus Galen (IX 289): Ἐναντίοι δ' εἰσὶ τοῖς εἰρημένοις σφυγμοῖς ἕτεροι δύο, τῷ μὲν ἀραιῷ πυκνός, τῷ διαλείποντι δ' ὁ παρεμπίπτων, οὓς Ἀρχιγένης ἔοικεν οἴεσθαι χαλεπωτέρους εἶναι τῶν προειρημένων. Er hatte darnach die Ansicht vertreten, daß der häufige und der gebrochene Puls gefährlicher seien als der seltene und der aussetzende Puls, weil der häufige bei der συγκοπὴ auftrete, der gebrochene bei der Peripneumonie und bisweilen bei Fiebern infolge von Verstopfung oder Quetschung der Arterien. Beim gebrochenen Puls bezieht sich die Ungleichmäßigkeit auf die πυκνότης d. h. nach einer bestimmten Anzahl von gleichen Schlägen folgt einer, dem nur eine sehr kurze Pause voraufgeht, während der aussetzende Puls ungleichmäßig ist κατὰ ἀραιότητα καὶ μικρότητα d. h. in der Aufeinanderfolge mehrerer gleicher Pulse stellt sich eine längere Ruhepause ein und die darauf folgende Ausdehnung erscheint kleiner als bei den vorhergehenden Pulsschlägen²⁾. Die Zurückführung dieser beiden Erklärungen auf Archigenes wird bis zu einem gewissen Grade gewährleistet durch die Wiederkehr der ersten Erklärung bei Rufus περὶ σφυγμῶν (230, 7): Λέγεται δὲ καὶ παρεμπίπτων σφυγμὸς, ὅταν πλείονας διαστολὰς καὶ συστολὰς ἀπεργασάμενος ἑάσῃ καὶ δευτέραν διαστολὴν πυκνοτέραν ἐπενέγκῃ³⁾.

Ein eigenes Capitel dieses λόγος handelte von der Ungleichmäßigkeit innerhalb eines einzigen Pulses. Die Überschrift lautete⁴⁾: „τίς ἢ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλία.“ Die kurzen, abgerissenen Sätze, die Galen aus diesem Capitel erhalten hat⁵⁾: „εἰσὶ δ' αὐτῆς

¹⁾ Gal. VIII 525.

²⁾ Gal. VIII 525.

³⁾ Vgl. Ps.-Gal. XIX def. 228. 229 p. 411, 7 f. Die Definitionen decken sich ebenfalls mit Archigenes.

⁴⁾ Gal. VIII 627 f.

⁵⁾ Gal. VIII 628.

πλείους διαφοραὶ, τῆς καθ' ἓνα δηλονότι σφυγμὸν ἀνωμαλίας¹. εἶθ' ἐξῆς· „τὰ πολλὰ δὲ ταύταις ταῖς διαφοραῖς καὶ ταῖς κατὰ μέγεθος συντρέχουσιν ἀνωμαλίαις“. καὶ πάλιν ἐφεξῆς· „ἄλλη δ' ἐστὶ διαφορὰ κατὰ μέγεθος ἀνωμάλου ἑνὸς σφυγμοῦ“ be- sagen soviel, daß Archigenes zu dieser Klasse verschiedene Pulsarten gerechnet hat. Bei Galen nimmt die Behandlung dieser Pulsgruppen ebenfalls ein eigenes Capitel ein¹): Ὑπόλοιπον δ' ἂν εἴη τῆς καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλίας εἰπεῖν τὰς διαφοράς. Er unterscheidet, je nachdem sich die Ungleichmässigkeit in der Bewegung der Arterie (κατὰ κίνησιν) oder in ihrer Lage (κατὰ θέσιν) zeigt, verschiedene Arten; im ersteren Falle drei: εἰσὶ δὲ τρεῖς μὲν αἱ πρώται, ποτὲ μὲν ἡσυχίας διακοπτοῦσης τὴν κίνησιν τοῦ μορίου, ποτὲ συνεχοῦς μὲν φαινομένης αὐτῆς, οὐ μὴν ἰσοταχοῦς, ποτὲ δὲ ἐπανερχομένης. Archigenes kannte diese Dreiteilung²): ἀρκεῖν μοι δοκεῖ καὶ περὶ τούτων (d. h. über die zweite Art) τὰ τοσαῦτα. ἐπὶ γὰρ τὴν ἔτι λοιπὴν καὶ τρίτην διαφορὰν τῶν καθ' ἓν μόνον ἀνωμάτων σφυγμῶν ἐπάνιμεν αὐθις, οὗς Ἀρχιγένης μὲν ὡς ἓνα γράφει καὶ καλεῖ δίκροτον τοῦτο δ' οὐχ οἷόν τε κρῖναι καλῶς, εἰ μὴ πρότερον ἀκριβῶς μάθωμεν, οἷός ἐστιν ὁ σφυγμὸς οὗτος ὁ πρὸς Ἀρχιγένους δίκροτος κεκλημένος. Kurz, alles scheint darauf hinzuweisen, daß Galen die ganze Erörterung über die Ungleichmässigkeit innerhalb eines Pulses (ἢ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλία) ihm entlehnt hat.

Das Charakteristische des δίκροτος σφυγμός, d. h. des zweimal hintereinander schlagenden Pulses, besteht nach Archigenes darin, daß unmittelbar auf eine reguläre Ausdehnung der Schlagader eine zweite von geringerem Umfange folgt, so daß der Puls in Wirklichkeit zweimal schlägt, nur das zweite Mal schwächer. Er sah in diesem Puls eine ἀνωμαλία καθ' ἓνα σφυγμόν und verglich ihn mit dem doppelten Schlage des Hammers auf den Amboss³): δίκροτος οὖν τίς ἐστὶ σφυγμὸς κλονώδης, ὃν δὴ καὶ <ἐν> μόνον ὥμην τό γε κατ' ἀρχὰς εἶναι πλήττοντα δις, ἐξαπατώμενος ὑφ' ὧν ἔλεγεν Ἀρχιγένης εἰκάζων αὐτὸν ταῖς τῆς σφύρας διπλαῖς

¹) Gal. VIII 526.

²) Gal. VII 537.

³) Gal. IX 306. Galen rühmt ihm nach, daß er richtige Beobachtungen über diesen Puls angestellt, daß er sich aber in der Erklärung geirrt habe. Trotzdem acceptierte er (VIII 540) seine Erklärung.

πρὸς τὸν ἄκμονα πληγαῖς. Die Wiederkehr dieser Vergleichung bei Gal. VIII 540: *ἔοικε γὰρ τὸ ἐπ' αὐτοῦ γιγνόμενον ταῖς τῆς σφύρας διπλαῖς πρὸς τὸν ἄκμονα πληγαῖς, τῆς μὲν προτέρας ἐκ πολλοῦ μὲν διαστήματος καταφερομένης καὶ σφοδρῶς παιούσης, τῆς δευτέρας δὲ οἷον ἀναπαλλομένης τῆς σφύρας ἀπὸ τοῦ ἄκμονος οὐκ ἐπὶ πολὺ καὶ αὖθις αὐτῷ προσπιπτούσης ἁρρώστειότερόν τε ἢ πρόσθεν καὶ ἐξ ὀλίγης διαστάσεως* beweist wieder, daß er sich im 1. Buch seiner Schrift *περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν* aufs engste an Archigenes angeschlossen hat¹⁾. Die Definition des Archigenes scheint uns von dem Verfasser der Schrift *περὶ σφυγμῶν πρὸς Ἀντώνιον* erhalten zu sein; wenigstens deckt sie sich mit dem, was wir von ihm erfahren²⁾: *ὁ δὲ δίκροτίζων δὶς ἐν τῷ αὐτῷ κρούει τὴν πληγὴν· τοῦτο δὲ γίνεται διὰ σκληρότητα τοῦ σώματος τῆς ἀρτηρίας· ἀνακρούοντος γὰρ καὶ παλινδρομοῦντος καὶ βίᾳ φερομένου τοῦ πνεύματος ἐπὶ δευτέραν ἔρχεται πληγὴν ὡς ἐπὶ ἄκμονα (ἀγκῶνα Hds.) σφῦρα (σφαῖρα Hds.)*.

In diesen λόγος gehörte noch eine Reihe von Pulsarten, die sicher auch von Archigenes behandelt sind: der ameisenartige (*σφυγμὸς μυρμηκίζων*)³⁾, der gemsenartig springende (*δορκαδίζων*)⁴⁾, der regenwurmartige (*σκωληκίζων*)⁵⁾ und der wellenartige (*κυματώδης*)⁶⁾. Genaueres erfahren wir nur von seiner Erklärung des ameisenartigen Pulses. Er betrachtete ihn als zusammengesetzt aus dem kleinen, schwachen, häufigen und schnellen Pulse: *„σύνθετος δέ μοι δοκεῖ εἶναι ἐκ μικρότητος, ἀμυδροτότητος, πυκνότητος, ἀναγκαίως δὲ καὶ ταχύτητος“*⁷⁾. Die letzten Worte seiner Erklärung enthalten offenbar eine Spitze gegen Herophilos, der die Schnelligkeit als Charakteristikum dieser Pulsart ausdrücklich ge-

¹⁾ Vermutlich stammt auch die Polemik Galens (VIII 538) gegen diejenigen, welche die Ansicht vertraten, daß der *δίκροτος* sich aus zwei Pulsen zusammensetze, aus Archigenes.

²⁾ Gal. XIX 640. Vgl. Ps.-Gal. XIX def. 226 p. 410, 18. Ruf. *περὶ σφυγμῶν* p. 230.

³⁾ Gal. VIII 827. IX 293. 453. Vgl. VIII 460. 553 f.

⁴⁾ Gal. VIII 556. IX 80. 488. Vgl. Ps.-Gal. XIX 231 p. 412, 4. Ruf. 231, 1.

⁵⁾ Gal. VIII 550.

⁶⁾ Gal. VIII 549.

⁷⁾ Gal. VIII 827.

leugnet hatte¹⁾. Seine Behauptung von der Schnelligkeit dieses Pulses hatte Archigenes mit der Thatsache zu bekräftigen gesucht, daß bei Magenleiden, denen dieser Puls eigen sei, der Puls jederzeit Schnelligkeit zeige²⁾.

Was uns weiter von Archigenes aus seiner Schrift *περὶ σφυγμῶν* erhalten ist, sind einzelne Bruchstücke, die sich nur schwer in den Rahmen des Ganzen einfügen lassen. Sie mögen hier nach der Reihenfolge der Pulsschriften des Galen ihren Platz finden:

1. Gal. VIII 469: *Σιτία πολλὰ μὲν, ὥστε βαρύναι τὴν δύναμιν, ἀνωμάλους τε καὶ ἀτάκτους τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζεται. Ἀρχιγένης δὲ φησιν ὠκνότερους πλέον καὶ πυκνότερους. Vgl. Gal. IX 150: γράφοντος γὰρ Ἀρχιγένους οὕτω περὶ τῆς βαρυνούσης τὴν δύναμιν τροφῆς· „ἢ δὲ τῷ θλίβειν ἀμυδροτέρους καὶ μικροτέρους, ταχύτερους τε πλέον ἢ πυκνότερους“, ἡμεῖς οὐχ οὕτως κτλ.*

2. Gal. VIII 479: *Ὁ δὲ τῶν μαραινομένων οὐ καθ' ἐν εἶδος τρέπεται σφυγμός. χρὴ δὲ ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται, διαφοραῖς εὐδήλοις διορίσασθαι περὶ αὐτῶν. οἱ μὲν δὴ ταῖς μὴ λυθείσαις φλεγμοναῖς κατὰ βραχὺ συναπομαρανθέντες ἀμυδροὺς καὶ θάπτονας καὶ πυκνοὺς ἄγαν καὶ μυούρους κατὰ μέγεθος ἐν μιᾷ πληγῇ τοὺς σφυγμοὺς ἴσχουσιν, οὓς Ἀρχιγένης ἐπινενευκότας τε καὶ περινενευκότας καλεῖ, σαφῶς δηλοῦν βουλόμενος τὸ κατὰ τὴν διαστολὴν βραχὺ μετὰ τῆς τῶν ἐκατέρωθεν περάτων οἶον ἐπινεύσεως· οὐ γὰρ ὡς ἀποκεκομμένων ἀθρόως, ἀλλ' ὡς ἐπικεκαμμένων τῶν ἐκατέρωθεν μερῶν εἰς βραχὺ συνέσταλται, μύουρος ὢν τῷ μεγέθει καθ' ἑκάτερα τὰ μέρη. Vgl. IX 177 f.*

3. Gal. VIII 486: *Ἀρχιγένης δὲ φησι τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον ἰδίως ἐπ' αὐτῶν (sc. τῶν κατόχων) θερμότερον εὐρίσκεισθαι, καθάπερ τοῖς σπασθησομένοις μετὰ καταφορᾶς. Vgl. IX 189.*

4. Gal. VIII 779: *Τὸ δ' ὑπὸ τοῦ Ἀρχιγένους λεγόμενον, ὅτι καὶ τῶν ἰσχνῶν ἀνθρώπων αἱ ἐν τοῖς ἀσάρκοις μέρεσιν ἀρτηρίαι φαίνονται τῇ ὄψει διαστελλόμεναι καὶ συστελλόμεναι, πρὸς μὲν αἰδήμονας ἀνθρώπους ὁρθῶς λέγεται, πρὸς δὲ τοὺς, ὅταν αὐτοῖς δόξη, μηδὲ τῶν φαινομένων πεφροντικότητας, οὐκ ὁρθῶς. Vgl. 453.*

¹⁾ Gal. IX 453.

²⁾ Gal. VIII 835.

5. Gal. IX 138: *Εἰ δ' Ἀρχιγένης μὲν πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ πληρεστάτους φησὶ φαίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς, Ἀπολλωνίδης δὲ κενωτάτους, οὗ μοι δοκεῖ μηκύνειν ἔτι δεῖν ἡμᾶς περὶ γε τῶν τοιούτων, ἱκανῶς ἀποδεδειχότας ἐν ταῖς ἔμπροσθεν πραγματείαις ὥς μάτην τοῦτο τὸ γένος τῶν σφυγμῶν οἱ μεθ' Ἡρόφιλον ἐπεισήγαγον, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλά. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν ἐν πράγματι μηδόλως διαγινωσκομένῳ τὰναντία λέγειν Ἀρχιγένην τε καὶ Ἀπολλωνίδην· οὐ γὰρ αἰσθήσεως κοινῆς τὸ πάθος, ἀλλὰ φαντασμάτων ἰδίων ἑκάτερος ἔγραψεν.*

6. Gal. IX 324: *Εὐρίσκεται μέντοι τισὶ καὶ κατὰ τὴν τῆς διαπλάσεως ιδιότητα, καθάπερ καὶ ὁ ἐπινενευκῶς τε καὶ περινενευκῶς ὀνομαζόμενός ἐστιν, ὃ γε μὲν οὖν οὕτω τῆς ἀρτηρίας κατασκευασθείσης ὥς τὸ μέσον αὐτῆς μόνον ὑπὸ τῷ δέρματι τετάχθαι ψιλῷ, τὰ δ' ἑκατέρωθεν ἀθροώτερον ἐγκαταβαίνειν τῷ βάθει. γίνεται δὲ καὶ δι' ἀρρώστειαν δυνάμεως, ἀδυνατούσης ἐπαίρειν τὰ βαρύνοντα· καὶ ὅταν γε τὸ τοιοῦτον πάθος ἰσχυρότερον αὐτῇ γένηται, καμπὴν τινα φαίνεται κατὰ τὸ ὕψος ἔχειν ὁ σφυγμός, οὐ κύκλου περιφέρειαν, ἥντινα καμπὴν οὐ κακῶς ὁ Ἀρχιγένης ὀνομάζει γωνίωσιν. Vgl. fragm. 2.*

3.

Diätetik und Therapie.

Das Hauptverdienst der pneumatischen Schule liegt auf dem Gebiet der Diätetik und Therapie. Die hohe Ausbildung dieser beiden Disciplinen ist daraus zu erklären, daß die älteren Pneumatiker mehr Wert auf die Regelung der Diät und auf mechanische Hilfsmittel legten als auf medicamentöse Stoffe. Ihr therapeutisches Verfahren war naturgemäß darauf gerichtet, die vorherrschende Qualität zu bekämpfen, die übermäßige Wärme durch kühlende Mittel, die übermäßige Kälte durch wärmende, die übermäßige Feuchtigkeit durch trocknende und die übermäßige Trockenheit durch anfeuchtende Mittel¹⁾. Bei der Bekämpfung der vorherrschenden Quantität leistete nach ihrer Meinung eine vernunftgemäße Diät wesentliche Dienste. Dazu war eine genaue Kenntnis des Qualitätengehalts der einzelnen Nahrungsmittel, der

¹⁾ Gal. I 519.

atmosphärischen Luft, der verschiedenen Gegenden u. s. w. erforderlich: auf ihr beruhten die Vorschriften, die sie über die Lebensweise der beiden Geschlechter und über die Erziehung und Pflege des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern gaben.

Athenaios hat in seiner Diätetik ausführlich über die verschiedenen Getreidearten, Weizen und Gerste und über die Brote gehandelt. Der Weizen ist deshalb am nahrhaftesten von allen Getreidearten¹⁾, weil er dem Körper die der Gesundheit dienenden Qualitäten, Wärme und Feuchtigkeit zuführt. Seine Wirkung ist aber verschieden je nach seiner Art, der Gegend, in der er wächst, der Beschaffenheit der Luft, der Jahreszeit und dem Alter. Er unterschied zwei Arten, die *πυροὶ σιτάνιοι* oder *ἀλευριται* und die *σεμιδαλιται*²⁾. Die Unterscheidungsmerkmale sind dieselben wie bei Galen³⁾: die erste Art ist leicht an Gewicht, locker und weiß; sie wird leicht verdaut, befördert die Transpiration und ist der Gesundheit förderlich, ohne dem Körper Kraft zu geben. Die zweite Art ist schwerer, fest und gelb, ferner schwer verdaulich und infolge des größeren Gehaltes an Nährstoffen verleiht sie dem Körper Kraft. Nach der Bodenbeschaffenheit unterschied er den Weizen, der auf trockenem und magerem Boden wächst, von dem, der auf fruchtbarem, fettem Boden steht. Der erstere ist leicht verdaulich, aber wenig nahrhaft, ebenso wie der Weizen, der auf ausgedörrtem Boden wächst und der weiß und locker wie der Sommerweizen wird. Der Weizen dagegen, der auf fettem Boden wächst, ist infolge der reichlichen Nahrung fest, schwer und nahrhaft; der nahrhafteste gedeiht in Gegenden, die dem Winde und der Sonne ausgesetzt sind.

Derselbe Unterschied zeigt sich beim Weizen, der in kalten

¹⁾ Orib. I 10 f.: *περὶ πυρῶν· ἐκ τῶν Ἀθηναίου ἐκ τοῦ α' λόγου*. Vgl. Gal. VI 480. Diosc. II 107 p. 233.

²⁾ Diphilos von Siphnos und Philistion geben ebenfalls den *ἄρτοι σεμιδαλιται* den Vorzug vor den *ἄρτοι ἀλευριται* (Athen. III 115 c f., aus Herakleides von Tarent). Außerdem stimmt Philistion auch darin mit Athenaios, daß er den *ἄρτοι σεμιδαλιται* eine kräftigende Wirkung zuschreibt. Diosk. a. a. O. kennt dieselben beiden Arten. Das bei Athenaios (III 115 f.) folgende Mnesitheoscitat (aus seiner Schrift *περὶ ἐδεστώων*) steht ausführlicher bei Gal. VI 513: die Vergleichung zeigt, wie Athenaios excerptiert.

³⁾ Gal. VI 481 f.

und warmen Gegenden wächst. Der Weizen in kalten Gegenden ist feinteilig und ausgewachsen, derjenige, der in warmen Gegenden wächst, nimmt reichlichere und viel festere Nahrung auf, der Weizen auf sumpfigem Boden ist wenig nahrhaft und leichter, er verschlechtert das Blut und erwärmt den Körper nur mäßig. Feuchter Boden bringt weniger nahrhaften und schwachen Weizen hervor und scheint ihn wegen des Überflusses an Feuchtigkeit in Unkraut umzuwandeln, der Weizen auf schattigem Boden endlich enthält mehr Hülsen als nützlich ist. Wechselt in den Jahreszeiten Kälte, Wärme, Feuchtigkeit und Trockenheit gleichmäßig ab, so ist der Weizen voll und nahrhaft; wechseln sie dagegen ungleichmäßig ab, so enthält er nur wenig Nährstoff und ist mager. Viel Regen bringt Mehltau an den Ähren hervor; in der Zeit, wo die Ähren auswachsen, sind übermäßige Wärme, trockene Winde sowie lang anhaltender Sonnenbrand schädlich. Nach dem Alter unterschied er jungen, alten und mittleren Weizen; der junge ist saftiger, blähend und nahrhaft, der alte dagegen saftlos, trocken und wenig nahrhaft; in der Mitte zwischen beiden steht die dritte Art.

In diesen Zusammenhang gehört der kurze Abschnitt über die Brote¹⁾. Die dünnen Brote sind saftloser und weniger nahrhaft, weil ihr Nährstoff durch das Backen verdampft wie z. B. die *ἵττια* und *λάγανα*. Ferner sind die stark und die zweimal gebackenen Brote weniger nahrhaft als die saftigen. Mit Philistion²⁾ stimmt er in der Notiz überein, daß die warmen und frischen Brote nahrhafter sind als die kalten und alten, weil die Wärme die Verdauung befördert.

Über die Gerste ist uns von ihm wenig erhalten³⁾. Die Gerste, die keine Hülse hat, hält er für saftiger und nahrhafter und stellt sie dem Weizen am nächsten, darnach die Gerste mit zwei Körnerreihen.

¹⁾ Orib. I 24.

²⁾ Athen. III 115 d: *Φιλιστίων δ' ὁ Λοκρὸς τῶν χονδριτῶν τοὺς σεμιδαλίτας πρὸς ἰσχὺν φησι μᾶλλον πεφυκέναι· μεθ' οὗς τοὺς χονδρίτας τίθουσιν, εἴτα τοὺς ἀλευρίτας . . πάντες δ' οἱ θερμοὶ ἄρτοι τῶν ἐψυγμένων εὐοικονομητότεροι πολυτροφώτεροί τε καὶ εὐχυλότεροι, ἔτι δὲ πνευματικοὶ καὶ εὐανάδοτοι. οἱ δ' ἐψυγμένοι πλήσμιτοι, δυσοικονόμητοι. οἱ δὲ τελείως παλαιοὶ καὶ κατεψυγμένοι ἀτροφώτεροι στατικοὶ τε κοιλίας καὶ κακόχυλοι.* Das Citat stammt vermutlich aus seinen *Ὀψαρτυτικά* (Ath. XII 516 c).

³⁾ Orib. I 26.

Zum Filtrieren des Wassers bediente man sich in Alexandria gewöhnlich einer porösen Steinart (*στακτοί*) oder des Filters (*ύλιστήρ*). Athenaios¹⁾ empfahl, die Brunnen am Meere oder an Seen anzulegen und das Wasser, wenn es frei von Schmutz und Blutegeln erhalten werden soll, durch die Erde zu filtrieren. Zum Schutz soll man den Brunnen mit einer Brustwehr aus Stein oder Holz umgeben und den Boden in derselben Weise auslegen. Der Vorteil des filtrierten Wassers besteht darin, daß es sehr dünn, rein und kalt ist.

Eines der wichtigsten Mittel zur Erhaltung der Gesundheit ist gute Luft. Athenaios gab genaue Vorschriften über die verschiedene Beschaffenheit derselben²⁾. Er unterschied die Luft in der Sonne von der im Schatten und die Luft am Tage von der in der Nacht. In der Sonne ist sie wärmer und dünner, im Schatten dichter, am Tage weniger kalt und dünn, bei Nacht dagegen kalt und dicht. Da die warme und dünne Luft die Transpiration befördert, die kalte und dichte entgegengesetzt wirkt, so ist die Nacht für rheumatische Leiden, Fieber und Entzündungen unerträglich. Ferner unterschied er die Luft in der Stadt von der Luft auf dem Lande. In der Stadt, wo sie durch die Häuser begrenzt wird, ist sie wärmer und dichter; erwärmt wird sie durch den Einfluß des Sonnenlichtes, verdickt infolge des Mangels an Luftströmung. Zudem schwängert sie sich leicht mit Ausdünstungsstoffen mannigfaltiger Art, wie sie in schlecht ventilierten Städten unvermeidlich sind. In der Stadt erscheint der Körper voll und aufgetrieben, da der Verdauungsproceß und die Bewegung der Säfte gehemmt sind; auf dem Lande dagegen ist die Luft dünn und rein; sie macht Appetit, befördert die Verdauung und den Umsatz der Säfte, ist nahrhaft und stärkt die Sinne.

Ebenso wie die Luft, kann die Gegend, in welcher der Mensch wohnt, je nach ihrer Beschaffenheit einen verschiedenen Einfluß auf den menschlichen Organismus ausüben³⁾. Der Aufenthalt in hohen, gebirgigen Gegenden ist gesund, mit Ausnahme im Winter, wo die Bewohner unter der Kälte zu leiden haben. Das Gesunde solcher Gegenden liegt in der gröfseren Kälte und in der gröfseren durch

¹⁾ Orib. I 357.

²⁾ Orib. II 291 = Gal. XVI 360. Vgl. Aet. III 162.

³⁾ Athenaios bei Orib. II 302 = Gal. XVI 401. Vgl. Antyll bei Orib. II 301. Sabinos bei Orib. II 310.

die starke Luftströmung bedingten Reinheit der Luft. In Thälern ist der Aufenthalt weniger gesund wegen der Wärme der Luft, besonders im Sommer und wegen des Mangels an Luftströmung, zumal wenn die Gegend von hohen Bergen eingeschlossen ist: in diesem Falle wird die Luft infolge des Zurückstrahlens der Sonne von den Bergen zu sehr erwärmt. Bewaldete Gegenden sind weniger luftig und sonnig als unbewaldete; deshalb sind sie im Winter dunkel und kalt, im Sommer ist die Luftströmung gering und die Luft stickend heifs. Die Gegenden in der Nähe von mäfsig grofsen Flüssen besitzen eine sehr milde Temperatur, besonders wenn die Luft in ihnen recht trocken ist; die Nähe gröfserer Flüsse wirkt dagegen gesundheitsschädlich auf den menschlichen Organismus, weil die Luft infolge der Wasserverdunstungen feucht und des Morgens und Abends kalt ist, so dafs in diesen Gegenden dem menschlichen Körper Feuchtigkeit und Kälte zugeführt wird. Sumpfige, seenreiche Gegenden sind aus verschiedenen Gründen ungesund; einmal erlangen die Früchte infolge der Einwirkung der Feuchtigkeit auf den umliegenden Boden nicht die erforderliche Reife, ferner ist die Luft in solchen Gegenden feucht und dick und wird durch die Ausdünstungsstoffe jeglicher Art, besonders durch die Produkte der Fäulnis verunreinigt. Auch sind sumpfige Gegenden meist walddreich, und durch den Reichtum an Bäumen wird die Luftströmung erschwert. Sodann ist die Nahrung in solchen Gegenden kalt und feucht, die Luft, besonders im Sommer, glühend heifs und die Temperatur zeigt rasche Schwankungen: des Morgens ist sie infolge der Ausdünstungen kalt, des Mittags warm und des Abends wieder kalt. Trockene Gegenden machen den Körper trocken, befördern seine Ausdünstung und führen ihm gute Säfte zu, besonders durch die Nahrung, die warm und trocken, gehörig ausgereift und leicht verdaulich ist. Die Gegenden im Binnenlande sind gesunder als die in der Nähe des Meeres und höher gelegene von günstigerem Einflufs auf den menschlichen Organismus als die niedriger gelegenen.

Von grofser Bedeutung für die Erhaltung der Gesundheit ist die Pflege des gesunden Menschen in den verschiedenen Lebensaltern. Die Pneumatiker unterschieden in hippokratischer Weise vier Lebensabschnitte: das Kindes-, Jünglings-, Mannes- und Greisenalter¹⁾.

¹⁾ Ps.-Gal. XIX def. 104 p. 374.

Jeder dieser vier Lebensabschnitte erfordert seine bestimmte erzieherische und diätetische Behandlung.

In den Vorschriften, die Athenaios für die Erziehung des Menschen gab, hat er den hohen Wert der Gymnastik, der physischen Erziehung des Menschen, ganz und voll anerkannt wie wenige Ärzte seiner Zeit; im übrigen klingen seine Grundsätze häufig an Plato an. Wie dieser betrachtete er als Endziel der Erziehung die harmonische Ausbildung des Körpers und der geistigen Fähigkeiten¹⁾. Er verlangte, daß die Kinder ohne Zwang in kindlichen Vergnügungen aufwachsen, daß ihre körperliche und geistige Ausbildung in gleicher Weise gefördert werde, indem sie an die Ruhe der Seele (*ψυχικὴ ἡσυχία*) und an körperliche Übungen gewöhnt werden. Er verbot, ihnen schwerverdauliche oder allzu reichliche Nahrung zu geben, weil dadurch die Verdauung gestört, das Wachstum verhindert und im Innern des Organismus leicht Entzündungen und Geschwüre hervorgerufen werden. Vom 6. oder 7. Lebensjahre an sollen sie den ersten Unterricht in der Elementarschule erhalten: der *γραμματιστής* soll freundlich und mild sein, und der Unterricht gewissermaßen spielend²⁾ betrieben werden ohne jeden Zwang. Durch freundliches Zureden, Ermahnen und häufiges Loben soll der Lehrer auf die Schüler einwirken, weil dadurch der Eifer der Zöglinge angestachelt, und sie mit Lust und Freude an der Arbeit erfüllt werden: durch Strenge schüchtern sie die Schüler ein und nehmen ihnen die Lust am Lernen. Vom 12. Lebensjahre an sollen sie strenger wissenschaftlich in der Grammatik und in den mathematischen Fächern unterrichtet werden, wobei die körperliche Übung nicht vernachlässigt werden darf; er verlangte, daß die Pädagogen und Schulvorsteher erfahrene Männer seien, damit sie ihren Zöglingen das richtige Maß und die rechte Zeit der Nahrung, der körperlichen Übung, der Bäder, des Schlafes u. s. w. vorschreiben können. Im 14. Lebensjahre soll der Unterricht in der Philosophie und Medizin beginnen. Die medizinische Bildung³⁾ forderte er deshalb, damit ein Jeder sein eigener Arzt sein könne, da es keine Zeit und

¹⁾ Athenaios bei Orib. III 161. Vgl. Aet. IV 29. Ps.-Soran ed. Dietz c. 92 p. 209.

²⁾ Ebenso Plato im Staat p. 536. Jeder moderne Pädagoge wird freudig die vortrefflichen erzieherischen Vorschriften des Athenaios unterschreiben.

³⁾ Ebenso Plut. de sanit. tuenda c. 24.

keine Beschäftigung gebe, wo wir dieser Kunst nicht bedürfen. Mit der geistigen Ausbildung soll die körperliche gleichen Schritt halten. Die gymnastischen Übungen soll man häufiger wiederholen, weil der Körper schon kräftiger ist und weil in diesem Alter der Geschlechtstrieb erwacht, damit durch die gleichmäßige Anstrengung des Körpers und Geistes dieser Trieb unterdrückt werde, dessen frühzeitige und allzu häufige Befriedigung in gleicher Weise der Seele wie dem Körper schade.

Im Mannesalter soll die körperliche und geistige Ausbildung zum Abschluß gebracht werden; er empfahl jede Art von körperlicher Übung, wobei thunlichste Rücksicht auf die Gewohnheiten eines Jeden zweckmäßig sei, die Nahrung soll reichlich und nahrhaft sein. Die sinnlichen Begierden soll man in seiner Gewalt haben, weil der Körper nur bis zu einem gewissen Grade widerstandsfähig sei und weil das Übermaß selbst die kräftigsten Constitutionen aufreibe. Im abnehmenden Alter (*παρὰκμάζοντες*) soll die Anstrengung des Geistes und Körpers herabgemindert und die Nahrung allmählich beschränkt werden, da auf dieser Altersstufe bereits die dem Alter charakteristische Qualität der Kälte auftrete. Das Greisenalter endlich bedarf der sorgfältigsten Diät; in ihm schwinden allmählig die physischen und psychischen Kräfte, und der Körper fange an runzlig, dürr, locker und trocken zu werden. Ein schwacher und für äußere Krankheitsursachen leicht empfänglicher Körper bedarf nur eines geringen Anstosses, um Schaden zu nehmen. Deshalb muß man schon in der Jugend auf das Alter Rücksicht nehmen. Er verlangte, daß man sich im Alter freundlich und hochherzig zeige, damit man nicht lästig falle, sondern damit man eine freundliche und sympathische Behandlung bei seinen Mitmenschen finde. Man soll nur den Verkehr von solchen Menschen suchen, die einem angenehm sind, sich in anmutigen Gegenden aufhalten, sich im übrigen möglichst viel Muße verschaffen und sich mehr um sich selbst als um andere bekümmern. Am schönsten aber sei das Alter, das imstande ist, sich in die geistigen Erzeugnisse der Vergangenheit zu vertiefen.

Ebenso vortrefflich sind die Grundsätze, die er für die Lebensweise des Weibes aufgestellt hat¹⁾. Da das Weib nach seiner

¹⁾ Athenaios bei Orib. III 97.

Theorie ein Wesen von kalter und feuchter Natur ist, so muß es eine warme und trockene Lebensweise führen, sich vor kalter und feuchter Luft, vor kalten und feuchten Gegenden hüten. Seine Nahrung soll mehr trocken als feucht sein; übrigens lehre das schon die Natur, da sie Flüssiges nur in geringer Quantität zu sich zu nehmen pflegen: Wein sollen sie wegen der Schwäche ihrer Natur nur wenig genießen. Dagegen empfahl er ihnen geistige und körperliche Übungen: die geistigen sollen in der Ausbildung der für die Wirtschaft erforderlichen Kenntnisse und in der Sorge für das Hauswesen bestehen, die körperlichen im Wollspinnen und in sonstigen häuslichen Arbeiten. Die Frauen, die selbst thätig sind, haben eine gute Gesundheit, gebären leichter als die, welche ein unthätiges, üppiges Leben führen. Ganz modern klingt es, wenn er den Frauen vorschreibt, das Backen selbst zu beaufsichtigen, selbst in der Wirtschaft Hand anzulegen, das für den Haushalt Erforderliche selbst zuzumessen und nachzusehen, ob alles an seinem Platze ist, selbst den Teig anzufeuchten und zu kneten und selbst die Betten zu machen, da körperliche Bewegung den Appetit des Weibes vermehre und ihm einen gesunden Teint verleihe.

Die Lebensweise in den einzelnen Jahreszeiten d. h. die Speisen und Getränke, welche in jeder Jahreszeit erlaubt oder verboten sind, hat er ebenfalls genau vorgeschrieben¹⁾. Im Winter werden Krankheiten durch die dieser Jahreszeit charakteristischen Qualitäten, durch Kälte und Feuchtigkeit hervorgerufen²⁾. Daher kommt es vor allem darauf an, den Körper zu erwärmen: man suche warme, vor Wind und Wetter geschützte Gegenden auf und meide kalte, der frischen Luft ausgesetzte Wohnungen. Man gebrauche wärmere Kleidungsstücke und schütze die Atmungsorgane. Die Nahrung muß geeignet sein, den Körper zu erwärmen und die durch die Kälte verdickten Säfte aufzulösen. Zum Trinken empfahl er den mäßigen Genuß von Wasser- und Weinmet, weißem, schönduftendem alten Wein, d. h. von solchen Getränken, welche die Feuchtigkeit anziehen. Die Speisen müssen trocken sein, leicht verdaulich, gut gesäuert, gut durchgekocht, rein, mit einem

¹⁾ Athenaios bei Orib. III 182.

²⁾ Man vergleiche hiermit die genauen Vorschriften, die Aretaios über die Diät der einzelnen Krankheiten giebt: sie sind echt pneumatisch.

Zusatz von Fenchel (*μάραθρον*) und Ammei (*ἄμμι*). Von Gemüse genieße man Kohl, Spargel, Lauch, gekochte Zwiebeln und gekochte Rettige. Von Fischen wähle man nur die aus, welche sich an Klippen aufhalten, als Fleisch Geflügel, Ziegen- und Schweinefleisch, ferner Suppen aus Pfeffer, Senf, Raukekohl (*εὐζωμον*), *γάρον* und Essig. Stärkere Körperbewegung, Anhalten des Atems, kräftige Abreibungen, besonders eigenhändige Abreibungen am Feuer sind empfehlenswert. Aufstehen soll man erst zu einer Zeit, wo die Luft wärmer geworden ist.

Im Frühling, in der feuchten und regnerischen Jahreszeit, suche man trockene Gegenden auf und nehme trockene Nahrung zu sich. Als Getränk empfahl er Honigwein, alten, dünnen, schön-duftenden Weißwein ohne Zusatz von Meerwasser, aber nur in geringen Quantitäten und nur wenig mit Wasser vermischt. Besonders empfehlenswert sind körperliche Übungen, wobei man sich jedoch vor Ermüdung hüte, trockene Abreibungen und Abreibungen mit Öl, endlich, um die Feuchtigkeit des Regens und der Atmosphäre zu paralysieren, Bähungen mit erhitzten und trockenen Gegenständen.

Im Sommer meide man die übermäßige Hitze; deshalb suche man luftige und kühle Wohnungen auf und feuchte und kühle Gegenden. Der Wein soll mit Wasser verdünnt und nicht allzu warm sein. Vor dem Essen trinke man süßen mytilenäischen oder pamphylischen Wein, beim Essen ungemischten, nicht ganz herben, ausgegorenen Wein. Wasser ist gleichfalls zu empfehlen. Die Nahrung, von der eine geringe Quantität genügt, darf nicht allzu nahrhaft sein. Zweckmäßig ist eine Promenade in schattiger Gegend, doch darf sie nicht zu anstrengend sein. Gymnastische Übungen wie Laufen, Ringen, Faustkampf sind zu vermeiden oder nur in geringem Umfange anzuwenden. Einreibungen mit Öl und kalte Waschungen sind zu empfehlen. Man erhebe sich früh, wenn die Luft noch kühl ist, und gehe spazieren; bei Tisch genieße man leichte Speisen, damit sie bis zur Frühpromenade verdaut sind. Zum Getränk wähle man milden Wein oder Regen- oder Quellwasser; am zweckmäßigsten ist es, Wasser zu trinken, daneben Milch, süße, wenig nahrhafte Suppen und leicht verdauliche Breiarten.

Der Herbst ist die gefährlichste Jahreszeit; man hüte sich morgens und abends barfuß zu gehen oder unbedachtsam ins kalte

Wasser zu steigen. Nachts schlafe man nicht unter freiem Himmel und nehme sich vor den Winden in Acht, die von Flüssen und Seen her wehen, weil sie den Körper nicht nur abkühlen, sondern auch durchnässen. Allzu nahrhafte, die Säfte verdickende Speisen und Getränke sind in dieser Jahreszeit zu vermeiden.

So genau wir über die diätetischen¹⁾ Mafsregeln des Athenaios unterrichtet sind, so wenig wissen wir von seiner Therapie²⁾. Einem glücklichen Zufall haben wir es zu verdanken, dafs wir diese Lücke durch die therapeutischen Berichte, die uns bei Oribasius und Aetius von seinen Nachfolgern erhalten sind, auszufüllen imstande sind.

Bei der eklektischen Richtung der meisten Pneumatiker kann es uns nicht Wunder nehmen, dafs die therapeutischen Grundsätze der älteren Ärzte, insbesondere des Asklepiades, bei ihnen volle Anerkennung und Berücksichtigung fanden. Die aktiven und passiven³⁾ Bewegungen, die Frictionen⁴⁾, verschiedenartige Bäder⁵⁾, Brechmittel⁶⁾, Purgirmittel waren ihre Mittel, um Krankheiten zu verhüten und zu beseitigen. Über den Gebrauch des Weines⁷⁾, des Bibergeils⁸⁾, des Helleboros⁹⁾, der verschiedenen Arten von Blutentziehungen¹⁰⁾, über Senfpflaster und Pechmützen¹¹⁾ haben sie ausführlich gehandelt. Insbesondere hat die therapeutische Behandlung der Fieberkranken in dieser Schule eine umfängliche Litteratur hervorgerufen¹²⁾.

1) Verweisen will ich noch auf die Vorschriften, die er über die Vorbereitung zur Zeugung gegeben hat: Orib. III 107: *παρασκευὴ πρὸς παιδοποιΐαν· ἐκ τῶν Ἀθηναίου.*

2) Zwei Recepte von ihm sind uns bei Galen erhalten: XIII 296. 847.

3) Herodot bei Orib. I 519. 4) Herodot bei Orib. I 496.

5) Herodot bei Orib. II 386 f. Archigenes bei Aet. III 167 = Antyll bei Orib. II 383. Agathinos bei Orib. II 394.

6) Archigenes bei Orib. II 202.

7) Herodot bei Orib. I 406. 8) Archigenes bei Gal. XII 337.

9) Agathinos bei Cael. Aurel. III 16. Er verfasste eine eigene Schrift über die Nieswurz und empfahl sie unter anderem bei Beginn der Wassersucht. Vgl. ausserdem Herodot und Archigenes bei Orib. II 146 ff.

10) Herodot bei Orib. II 42. 62 f.

11) Archigenes bei Aet. III 180 = Antyll bei Orib. II 469. Aet. III 181 = Antyll bei Orib. II 410.

12) Vgl. Herodot bei Orib. I 417. II 42 u. öfter.

In den Vorschriften, welche die Pneumatiker über die passive Bewegung gaben, griffen sie auf die verschiedenen Arten zurück, die als Erfindung des Asklepiades¹⁾ galten: das Tragen in einer Sänfte (*φορεῖον*), in einem Sessel (*καθέδρα*), das Fahren in einem Handwagen (*χειρόμαξα*), die Bewegung in schwebenden Betten (*διὰ τοῦ κρεμαστοῦ κλινιδίου*)²⁾, das Fahren in einem Wagen (*ἐν ζευκτοῖς*), das Reiten (*ἵππασία*) und endlich das Fahren zu Schiff (*διὰ πλοίων αἰώρα*) und bestimmten genau das Maß derselben für die Fieberkranken³⁾. In ihrer Hochschätzung der Frictionen⁴⁾ zeigt sich ebenfalls ihre Abhängigkeit von Asklepiades, der bekanntlich zuerst im Zusammenhang über den Gebrauch der Frictionen gehandelt hatte⁵⁾. Herodot bediente sich der Frictionen des Körpers als Mittel gegen die Fieber zur Zeit der *ἀκμῇ*, kurz vor der *παρ-ἀκμῇ* und bei einem Fieberanfall zu Beginn der *παρὰκμῇ*. Er vermied sie, wenn die Centralorgane entzündet sind, da es in diesem Falle unmöglich sei, das Fieber zu beseitigen, ferner wenn der Kranke an Atemnot leidet oder wenn am ganzen Körper oder an der Stirn oder am Hals Schweißausbrüche stattfinden. Er empfahl bei jungen Leuten von kleiner Statur die Frictionen von vier, bei Erwachsenen von sechs Leuten in der Weise vornehmen zu lassen, daß je zwei die Arme einreiben bis zu den Fingern, je zwei die Brust bis zu den Schamteilen und die letzten zwei endlich die Beine bis zu den Zehen. Zuerst soll das Reiben gelinder und mäßig schnell sein, darnach schneller und stärker, zum Schluß wieder milder. Bei jungen Leuten ist hundertmaliges Reiben hinreichend, bei Erwachsenen zweihundertmaliges, bei starken Leuten kann man die Zahl verdoppeln⁶⁾. Verschafft das Reiben Erleichterung, hört das Fieber auf, stellt sich leichte Atmung und gute Gesichtsfarbe ein, läßt die Größe des Pulsschlages nicht nach und wird er nicht beschleunigt, schwillt das Fleisch an und rötet sich, so kann man die Zahl der Frictionen vermehren. Stellt

¹⁾ Vgl. Cels. II 15, 60. Asklepiades handelt darüber in seinen *communia auxilia*: Cels. II 14, 58.

²⁾ Vgl. Plin. XXVI 8, 3. Antyll a. a. O. 513. Vgl. Daremberg zu Orib. I 661.

³⁾ Herodot bei Orib. I 496. Antyll bei Orib. I 513.

⁴⁾ Herodot bei Orib. I 496.

⁵⁾ Cels. II 14, 58 ff.

⁶⁾ Cels. a. a. O.

sich infolge der Einreibungen Schweisssecretion ein, so haben sie ihren Zweck erfüllt und man muß sie wiederholen. Macht sich bei der ersten Friction keine Besserung bemerkbar, so fahre man trotzdem mit der Behandlung fort, die man als zweckmäfsig erkannt hat. Nach der Friction reiche man dem Kranken warmes Wasser und zur Zeit des Fiebernachlasses Nahrung, die zugleich warm und feucht sein soll. Im Winter nehme man die Friction in einem erwärmten Raume vor und mische dem Öl kohlensaures Natron (*ἀφρόνιτρον*) und Wein bei. Wenn die wiederholte Anwendung der Friction keine Besserung hervorbringt, so lasse man den Kranken ein Sitzbad nehmen und übergieße ihn mit Öl, wodurch eine Art von Metasynkrise herbeigeführt wird. Die Frictionen sind einzustellen, wenn der Kranke die Berührung mit den Händen nicht vertragen kann oder wenn sich bei ihm während der Reibung eine stärkere innere Hitze einstellt. Wenn die Friction bei intermittierenden Fiebern ein heftiges continuierendes Fieber im Gefolge hat, so darf man sich dadurch nicht beunruhigen lassen, da es bald wieder verschwindet. Hat man die Friction zur Unzeit angewandt oder bedurfte der Kranke derselben nicht, so stellt sich ein starkes Fieber ein, das nicht weichen will, oder die Kranken werden träge und schläfrig, der Körper matt, die Respiration beschleunigt, der Puls klein, schwach und häufig, auch Krämpfe und Zittern treten auf.

Einen wichtigen Platz in der Therapie der Pneumatiker behaupten die Bäder, die sie in verschiedenen Formen empfahlen. Sand-¹⁾ und Sonnenbäder²⁾ waren ihnen nicht unbekannt. Es war eine häufig ventilirte Streitfrage dieser Zeit, ob Warm- oder Kaltbäder zur Erhaltung der Gesundheit förderlicher seien³⁾. Die pneumatische Schule entschied sich im Sinne des Asklepiades, der die kalten Bäder wieder zu Ehren gebracht hatte⁴⁾, und dem in der Wertschätzung derselben sein Schüler Antonius Musa, der Leibarzt

¹⁾ Herodot bei Orib. II 403.

²⁾ Herodot bei Orib. II 407.

³⁾ Vgl. Daremberg zu Orib. II 880 f.

⁴⁾ Cael. Aur. A. M. I 14: *laudat etiam in salutaribus praeceptis vitae varietatem atque vehementer utile dicit aquam bibere et frigida lavari, quam ψυχρολουσίαν appellant, et frigidam bibere.*

des Augustus¹⁾ und in der neronischen Zeit der Arzt Charmis aus Massilia gefolgt waren²⁾. Agathinos³⁾ und Herodot⁴⁾, von denen uns Vorschriften über die Bäder erhalten sind, verwarfen zwar die warmen Bäder nicht ganz, stellten aber den Nutzen der kalten Bäder ungleich höher⁵⁾. Die warmen Bäder wandten sie nur bei Entkräftung und Trägheit infolge von schlechter Verdauung an und bei solchen Kranken, die sich vor kalten Bädern fürchteten oder eine Abneigung gegen Salbungen hatten⁶⁾. Der Vorteil der kalten Bäder besteht nach der Ansicht des Agathinos darin, daß der Leib fest wird, die Gesichtsfarbe blühend, die Erscheinung männlicher und stärker, daß reger Appetit, schnelle Verdauung, normale Thätigkeit der Sinneswerkzeuge sich einstellt, während diejenigen, welche warme Bäder gebrauchen, schwammiges Fleisch haben, blasse Gesichtsfarbe, schlechten Appetit und einen schlaffen Leib. Selbst bei Kindern hielt er den Gebrauch von kalten Bädern für vorteilhafter, wenn sie mit der nötigen Vorsicht angewendet werden; den Ammen machte er den Vorwurf, daß sie die kleinen Kinder durch fortgesetzte Warmbäder fast kochen. Man kann nach seiner Meinung zu jeder Jahreszeit ohne Gefährdung der Gesundheit mit kalten Bädern beginnen; soll aber ein Unterschied gemacht werden, so

¹⁾ Er hatte bekanntlich den Augustus bei einer gefährlichen Krankheit durch eine Kaltwasserkur geheilt: Plin. XIX 128. XXIX 6. Suet. Oct. 81 u. öfter.

²⁾ Plin. N. h. XXIX 10: *Hi regebant fata, cum repente civitatem Charmis ex eadem Massilia invasit damnatis non solum prioribus medicis, verum et balneis, frigidaque etiam hibernis algoribus lavari persuasit. mersit aegros in lacus . . .*

³⁾ Orib. II 394: *περὶ θερμολουσίας καὶ ψυχρολουσίας· ἐκ τῶν Ἀγαθίνου* Vgl. Plut. de sanit. tuenda c. 17.

⁴⁾ Orib. II 386 ff.

⁵⁾ Archigenes verwarf die warmen Bäder beim Schwindel (σκότωμα) gänzlich, weil sie grade die Eigenschaften besäßen, welche die Krankheit hervorrufen (Aret. cur. m. ch. I 3, 307).

⁶⁾ Orib. II 394 ff. Vgl. Herodot bei Orib. II 389, 10: *Ἐπεὶ δὲ πολλοὶ τῶν ιδιωτῶν οἴονται τὰ θερμὰ τῶν ὑδάτων συμβάλλεσθαι πρὸς συντήρησιν ὑγείας, καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῖς ἀναιδῶς καὶ ἀνεπιστάτως χρῶνται, ὥς εἰκὸς, ἐπὶ βλάβῃ, ἄξιον τῆς ψευδοῦς δόξης αὐτοῦς ἀποσιῆσαι· χρήσθωσαν δὲ, εἰ παρεῖεν, τοῖς ὕδασιν ἀντὶ βαλανείων κοινῶν.*

empfahl er im Frühling¹⁾ den Anfang zu machen. Vor dem Bade soll man sich Bewegung verschaffen, aber nicht in übertriebener Weise; der Körper soll leicht und die Verdauung geregelt sein. Die geeignetste Zeit zum Baden ist die Zeit des Frühstücks²⁾. Entkleiden soll man sich, wenn die Jahreszeit es gestattet, in der Sonne oder an einem geschützten Ort. Zeigt sich das Individuum beim Entkleiden gegen die Kälte empfindlich, so muß es sich wieder ankleiden und sich erst Bewegung verschaffen, darnach die Haut mit rauher Leinwand reiben, sich salben und dann erst ins Wasser gehen. Das Wasser darf weder zu kalt noch zu warm sein; am meisten zu empfehlen ist das Seewasser, da es hinreichend kalt ist und infolge seines Salzgehaltes den Körper erwärmt³⁾. Auf jeden Fall muß es rein und durchsichtig sein, es darf weder Sumpfwasser noch stehendes Gewässer sein. Nach dem Essen sollen kalte Bäder nur dann genommen werden, wenn man infolge der Hitze oder infolge von aktiver Bewegung ein unwiderstehliches Verlangen nach ihnen hat. Das einzige, worauf man bei den kalten Bädern zu achten hat, ist, daß kein Wasser in die Ohren kommt, weil es schädlich auf die Gehörgänge wirkt. Was die Zeitdauer der Bäder anlangt, so empfahlen⁴⁾ sie dieselben anfangs einzuschränken und erst allmählich länger auszudehnen.

Auch Ölbäder⁵⁾ und Bäder aus einer Mischung von Wasser und Öl (*ὕδρῳ ἐλαίῳ*)⁶⁾ wurden von ihnen angewandt. Die Ölbäder empfahlen sie bei chronischen, mit Frostanfällen verbundenen Fiebern, bei Entkräftung und bei den im Fieber auftretenden Sehnenschmerzen, zu jeder Zeit der Krankheit und in jedem Alter, insbesondere in vorgerücktem Alter. Beim Fieber ließen sie dieselben zur Zeit der Abnahme, bei den Quartanfebern zur Zeit des Anfalles nehmen. Den fünften Teil des Öls soll man mit Feuer erwärmen,

¹⁾ Vgl. Herodot bei Orib. II 389: *τῶν δὲ πλείστων ὑδάτων ἐν τόποις ἐλώδεσι καὶ περικαέσιν ὄντων καὶ διὰ τοῦτο ἐπινόσοις, καιρὸς ἐπιτήδειος ὁ περὶ τὸ ἔα καὶ τὸ φθινόπωρον . . .*

²⁾ Vgl. Herod. bei Orib. II 389.

³⁾ Ausführlicher hat Herodot über den Nutzen und die Verwendung des Seewassers gehandelt bei Orib. II 466.

⁴⁾ Herodot bei Orib. II 387.

⁵⁾ Herodot bei Orib. II 466. Aet. III 169.

⁶⁾ Herodot bei Orib. II 466.

nicht die ganze Masse, weil sie dadurch zu weiterem Gebrauch nicht mehr verwendbar wird. Die Wanne muß der Gröfse des Kranken entsprechen und in einem zuglosen Raume aufgestellt, ihr Boden mit Schwämmen ausgelegt sein. Der Kranke soll zuerst eine Zeit lang ruhig in der Wanne daliegen, darnach mit den Händen das Öl hin und her bewegen, weil durch die Bewegung die Wärme gesteigert werde. Ist das Bad nicht warm genug, so giefse man wärmeres Öl hinzu; währenddessen muß der Kranke den Kopf im Öl halten, sich aber einen weichen Schwamm vor die Ohren drücken. Die Zeitdauer dieser Bäder richtet sich nach der jedesmaligen Krankheit: beim Starrfrost, Fieber, Asthma oder bei schlechter Verdauung lasse man den Kranken solange im Ölbade, bis sich Feuchtigkeit an der Stirn zeigt. Bei denen, die wegen heftiger Schmerzen, Krämpfe und Harnverhaltung ein Ölbad nehmen, richte man sich aufer nach dem Kräftezustand nach der Zu- und Abnahme der Krankheitssymptome. Nach dem Bade reibe man den Kranken zuerst mit Schwämmen, die in warmem Wasser ausgedrückt sind, darnach mit leinenen Tüchern, das Gesicht mit milchlauem Wasser oder, wenn der Kranke erschöpft ist, mit kaltem. Dann bringe man den Kranken so schnell wie möglich in einen Raum mit reiner und gut temporierter Luft.

Die Mineralquellen teilten sie nach ihren Bestandteilen in verschiedene Arten ein, in natron-, salz-, alaun-, erdharz-, schwefel-, eisen- und kupfervitriolhaltige¹⁾. Die gemeinsame Wirkung derselben besteht nach ihrer Ansicht in der Austrocknung, einige von ihnen haben auch erhitzende und die alaunhaltigen, die salzigen und die Kupfervitriolwasser auch noch astringierende Kraft. Die Mineralwasser wurden von ihnen gegen chronische Krankheiten empfohlen, insbesondere gegen solche, die auf Kälte und Feuchtigkeit beruhen. Die vorteilhafte Wirkung der einzelnen Arten wurde von ihnen bis ins einzelnste angegeben.

Die eminente Kraft, welche in dem Wein schlummert, ist von ihnen voll und ganz erkannt worden. Klar und scharf gaben sie die Indicationen für seine Verwendung an. Bei denen, die infolge von Phrenitis in Synkope verfallen, sah Archigenes in dem Wein

¹⁾ Archigenes bei Aet. III 167 = Antyll bei Orib. II 383. Vgl. S. 110f. Herodot bei Orib. II 386 f.

die einzige Rettung¹⁾. Er nährt schnell, verbreitet sich überall hin bis in die äußersten Teile des Körpers, fügt dem *τόνος* neuen *τόνος* zu, erweckt das *πνεῦμα* aus seinem Torpor, mäfsigt durch Erwärmung die Kälte, verdichtet die Feuchtigkeit und hindert das Hervorbrechen und Herausfließen der Säfte. Dazu kommt, daß er lieblich und angenehm riecht und viel zur Wiederherstellung der Kräfte beiträgt. Herodot verwandte den Wein in zwei Fällen²⁾: zur Beseitigung des Fiebers, also in acuten Krankheiten und um die Synkrise der Grundkörper zu verhüten. Im ersteren Falle liefs er dem Arzte freie Wahl, im letzteren Falle hielt er zur Kräftigung des Kranken den Gebrauch desselben für notwendig. Das geeignetste Alter ist das Mannesalter; Frauen ist der Wein nicht in gleicher Weise zu empfehlen³⁾.

Von den Jahreszeiten sind der Frühling und der Sommer die geeignetsten. Die Constitution des Kranken mufs feucht sein und nicht zu warm, die Fieber kurz, nicht von andern Krankheitserscheinungen begleitet, beim Abnehmen des Fiebers ist er wirksamer als zu Beginn der Abnahme. Dagegen ist die *οἰνοδοσία* unzulässig bei Verhärtung und Entzündung⁴⁾ der mittleren Organe, bei trockenen Constitutionen und bei solchen Kranken, bei denen die Perspiration erschwert ist, bei continuierenden Fiebern und bei Nervenkranken.

Man gebe den Wein auf nüchternen Magen, indem man fünf Teile warmen Wassers zusetzt; ist er stark, so setze man vier Teile zu. Seine Wirkung wird geschwächt, wenn man ihn filtriert. Das erste Mal reiche man dem Kranken eine schwache Mischung, im übrigen richte man sich nach der Gewohnheit des Patienten und nach der Wirkung der Mischung. Denen, die ihn vor dem Essen trinken und viel vertragen können, gebe man sechs Kotylen; diejenigen, welche an das Vomieren vor dem Essen gewöhnt sind und eine starke Constitution haben, können die doppelte Quantität trinken und darnach vomieren, wodurch die scharfe und schleimige

¹⁾ Aret. cur. ac. m. I 1 p. 199.

²⁾ Orib. I 406 ff.

³⁾ Vgl. Athenaios bei Orib. III, 97.

⁴⁾ Aret. cur. ac. m. II 3 p. 259 hält ebenfalls den Genuß von Wein bei Entzündungen für gefährlich, weil er in solchen Fällen die Schmerzen vermehrt, während er bei fehlender Entzündung die Natur kräftigt.

Feuchtigkeit aus dem Magen entfernt wird. Man kann ihn auch während und nach der Mahlzeit trinken, aber nicht ~~später als zwei Stunden nach Beendigung des Mahles~~; stellt sich dann Durst ein, so trinke man Wasser. Schwachen Constitutionen und solchen Kranken, die nicht daran gewöhnt sind, Wein auf nüchternem Magen zu trinken, reiche man denselben in Verbindung mit Speise¹⁾, indem man Brotstücke in Wein, der mit warmem Wasser verdünnt ist, erweicht: in derselben Weise reiche man ihn Greisen, Kindern und Frauen. Denjenigen, die ans Weintrinken nicht gewöhnt sind, gebe man wenig Wein während der Mahlzeit; vorher und nachher lasse man Wasser trinken. Der Kranke soll nicht mehr als drei Kotylen und nicht weniger als eine Kotyle tagsüber trinken. Bei allen Kranken, die mit Wein behandelt werden, soll man am zweiten Tage Wasser geben oder, wenn sie auf Wein bestehen, nur eine geringe Quantität; auch soll man die Nahrungsquantität vermindern.

Die Erscheinungen, welche der richtige Gebrauch des Weins im Gefolge hat, sind nach Herodot²⁾ folgende: Röte des Gesichts, gute Farbe, warme Schweisssecretionen am ganzen Körper, Unbenommenheit des Kopfes, Beweglichkeit der Gliedmaßen, Heiterkeit, Feuchtigkeit der Augen, nach dem Genuß guter Appetit und Aufstoßen und nach der Mahlzeit mäfsiger Durst, kurz anhaltende Schweisssecretionen, Urinabsonderungen und blühendes Aussehen des Körpers. Schlechte Zeichen dagegen sind schlechte Gesichtsfarbe, Trockenheit des ganzen Körpers oder der meisten Körperteile, kalte Schweissabsonderungen verbunden mit einer gewissen Schwere im Kopf, mißmutige Stimmung, Gleichgültigkeit gegen die Nahrung, unlöschbarer Durst, Brennen in den Eingeweiden, Urinverhaltung und Frequenz des Pulses. Stellt sich in diesem Falle Erbrechen ein, so verordnete er unverzüglich zu vomieren: ist das Vomieren mit Beschwerden verbunden, so empfahl er Wasser und Ruhe. Wenn sich infolge dieser Behandlung Fieber mit Erbrechen einstellt, so kommt es darauf an, ob der Anfall von langer oder von kurzer Dauer ist: im ersteren Falle verordnete er nach dem Anfall ein wenig Nahrung zu nehmen, im letzteren Falle dasselbe aber erst nach dem Schlaf, der sich nach dem zweiten Anfall eingestellt hat. Fehlt das Erbrechen, so muß man den dritten Tag

¹⁾ Aret. cur. ac. m. II 3 p. 262.

²⁾ Orib. I 411.

abwarten und in der Zwischenzeit reichlich Wasser zu trinken geben.

Man hüte sich, den Wein gierig und im Übermafs zu trinken, weil die Kranken dadurch den Appetit verlieren und unfähig werden, etwas zu essen und zu trinken¹⁾. Den Herzkranken empfahl Archigenes²⁾ von griechischen Weinen besonders den von Chios, Lesbos und die andern dünnen Inselweine; unter den italienischen denjenigen von Surrent oder Fundi oder Falerii oder Signia; sehr alten oder noch ganz jungen Wein riet er in diesem Falle zu vermeiden. Bei denjenigen Herzkranken, welche bereits kalt zu werden anfangen, ist der Wein die letzte Rettung: man reiche ihn in Verbindung mit Speise, aber in Absätzen, damit der Kranke sich von der durch das Essen hervorgebrachten Ermattung erholen kann.

Ebenso ausführlich wie die verschiedenen Arten von Getränken behandelte Herodot die für Fieberkranke wichtige Frage, zu welcher Zeit des Anfalls man ihnen zu trinken geben soll³⁾. Ist das Fieber eine Folge von Unmäßigkeit oder ist es durch den Genufs verdorbener Nahrung hervorgerufen oder dadurch, dafs man zu Beginn des Fieberanfalles Nahrung zu sich genommen hat, so liefs er vomieren, empfahl aber vorher warmes Wasser zu trinken, sogar zweimal, wenn es gilt, den verdorbenen Stoff gänzlich zu beseitigen oder ihn mit dem neuen zu vermischen⁴⁾. Kleinen Kindern ist das Trinken von warmem Wasser bei Beginn des Fieberanfalles zu empfehlen, besonders wenn sie Verlangen darnach haben. In solchen Fällen, wo der Kranke anfangs jeden Trank verabscheut, was gewöhnlich bei gefährlichen Anfällen eintritt, darf man ihm den Trunk nicht vorenthalten, sobald sich das Verlangen einstellt. Während der Zunahme des Fiebers gebe man zu trinken, wenn der Kranke vom unerträglichsten Durst gequält wird infolge einer besonderen Eigentümlichkeit seiner Krankheit, was man daran erkennt, dafs der Durst in keinem Verhältnis zu der Gröfse des Fiebers steht; ferner wenn bestimmte Symptome periodenweise regelmäfsig wiederkehren: wenn sich im Magen eine Menge von Galle ansammelt hat, und der Kranke sie unter Schmerzen von sich giebt,

¹⁾ Aret. cur. ac. m. II 3 p. 261.

²⁾ Aret. a. a. O. p. 262.

³⁾ Herodot bei Orib. I 417

⁴⁾ Vgl. Cels. III 6.

ohne daß ihm diese Entleerung Erleichterung verschafft, wenn die Extremitäten sich kalt anfühlen, und der Kranke blaß und ängstlich ist, endlich wenn er das Liegen nicht vertragen kann und von brennendem Durst geplagt wird. Ist die Zunahme des Fiebers von langer Dauer, während die ἀκμή nur kurze Zeit währt, so ist die Zeit der ἐπίδοσις am geeignetsten zum Trinken. Schwache Leute soll man durch Speise und Trank gegen die Anfälle schützen. Stellen sich Schlingbeschwerden ein infolge von übermäßiger Trockenheit des Ösophagus, so muß man beständig zu trinken geben. Bei Erstickungsanfällen reiche man warmes Wasser auch vor der ἀκμή. Bei Mangel an Appetit gebe man, besonders wenn der Mund ausgetrocknet ist, beständig Wasser, ferner reiche man denen schnell Wasser, bei welchen Heißhunger in Verbindung mit Entkräftung auftritt.

Kaltes Wasser reiche man zu Beginn des Anfalles solchen Kranken, die an Blutfluß leiden; bei der Zunahme des Fiebers da, wo man aus irgend einem Anlaß kein warmes Wasser geben darf. Beim Brennfieber empfahlen sie den reichlichen Genuß von kaltem Wasser oder geschmolzenem Eiswasser oder von solchem Wasser, das die natürliche Temperatur der Milch hat, und zwar zur Zeit der ἀκμή des Fiebers¹⁾.

Die Anwendung von Brechmitteln, die seit den Zeiten des Hippokrates²⁾ von den Ärzten zu diätetischen und therapeutischen Zwecken empfohlen worden waren, hatte in der Kaiserzeit derart überhand genommen, daß sie vielfach der Schlemmerei dienten, um den Magen zu möglichst starkem Essen zu befähigen³⁾: man betrachtete sogar diejenigen Mahlzeiten, welche den Zweck hatten, das Vomieren zu befördern, als Fest⁴⁾. Es ist deshalb begreiflich, daß ein so radikaler Arzt wie Asklepiades den diätetischen Gebrauch der Brechmittel gänzlich verwerfen konnte⁵⁾, während Celsus⁶⁾ und die Quelle des Plutarch ihre Verwendung auf bestimmte Fälle beschränkten, aber immer unter der Voraussetzung, daß sie mit Maß

¹⁾ Herodot bei Orib. I 417. ²⁾ Vgl. Daremberg Orib. II 830.

³⁾ Cels. I 3, 18. Seneca ad. Helv. 10, 3. Plut. de sanit. tuenda c. 22.

⁴⁾ Archigenes bei Orib. II 147.

⁵⁾ In seiner Schrift de tuenda sanitate. Cels. I 3, 18. Plin. XXVI 17.

⁶⁾ Cels. a. a. O.

und nicht ohne Not angewandt werden. So erachtete Celsus das Vomieren für notwendig bei allen gallenreichen Constitutionen, bei denjenigen Krankheiten, welche durch die Galle hervorgerufen werden und bei allen chronischen Krankheiten, insbesondere bei der Epilepsie und beim Wahnsinn¹⁾. Dieselbe vermittelnde Stellung wie Celsus nahmen die Pneumatiker in dieser Frage ein. So sehr sie²⁾ gegen das gewohnheitsmäßige Vomieren eiferten, so entschieden vertraten sie die Anschauung, daß der zwei- bis dreimalige Gebrauch von Brechmitteln im Laufe eines Monats durchaus gesundheitsförderlich sei. Die Schädlichkeit des gewohnheitsmäßigen Vomierens schlossen sie aus den Folgeerscheinungen, die Archigenes³⁾ genau angegeben hat: Abmagerung und Erschlaffung des Körpers, melancholische Stimmung, Atembeschwerden, schlechte Verdauung, übermäßiger Appetit, derartige Schwächung des Magens, daß er die zugeführte Nahrung sogleich wieder von sich giebt oder daß man sie mit Hilfe einer Sonde aus dem Magen entfernen muß, Fäulnis der geringen Speisereste, die im Magen verbleiben, unregelmäßiger, mit Beschwerden verbundener Stuhlgang. Je nach der erforderlichen Stärke des Vomierens unterschieden sie verschiedene Arten: das Brechen auf nüchternem Magen, nach dem Genuß von Speisen (*ἔμετος ἀπὸ δείπνου* oder *ἀπὸ σιτίων*)⁴⁾, von Rettigen (*ἔμετος ἀπὸ ῥαφανίδων*)⁵⁾ und nach dem Genuß von Nieswurz⁶⁾. Das Vomieren hat den Zweck, den Krankheitsstoff (die unverdauten Speisen oder die sich im Magen ansammelnden Säfte) aus dem Magen zu entfernen, die dicken Magensäfte zu verdünnen, den Magen auf kräftigere Vomitive vorzubereiten oder auf ihn metasynkritisch einzuwirken. So verordnete Archigenes die Anwendung von Brechmitteln bei den vom Magen ausgehenden epileptischen Anfällen⁷⁾, bei der Darmverschlingung⁸⁾ und beim morbus coeliacus⁹⁾ zur

¹⁾ Cels. II 13, 58.

²⁾ Orib. II 202. Archigenes erklärte sogar ein solches Verfahren (Orib. II 203) eines anständigen, nüchternen Mannes für unwürdig.

³⁾ Orib. a. a. O. Vgl. Cels. I 3, 18.

⁴⁾ Orib. II 146. 202.

⁵⁾ Orib. II 152.

⁶⁾ *Ἐλλεβορισμός* Aret. cur. chr. m. II 13, 346.

⁷⁾ Aret. cur. ac. m I 5, 217. Aet. VI 13.

⁸⁾ Aret. cur. ac. II 5, 272. Aet. IX 28.

⁹⁾ Aret. cur. chr. m. II 7, 337.

Beseitigung der verdorbenen Speisen, beim Schwindel zur Verdünnung oder Entfernung des Schleimes und zur Vorbereitung auf den Helleboros¹⁾, bei der Elephantiasis²⁾ lediglich, um den Magen anzuregen. Das Brechen suchten sie im allgemeinen entweder durch äufsere Reizmittel, so durch Kitzeln des Gaumens mit Federn, die mit Irissalbe bestrichen waren³⁾, durch Bestreichen der Mandeln mit Irissalbe⁴⁾ oder durch gelinde Brechmittel wie Wasser⁵⁾, Honigwasser⁶⁾ und Öl⁷⁾ hervorzurufen und liefsen den Kranken dabei seinen Körper vornübergeneigt halten⁸⁾. Bis ins einzelnte wurden von Archigenes⁹⁾ die Speisen vorgeschrieben, welche das Vomieren befördern¹⁰⁾. Im allgemeinen sollen diejenigen, welche sich auf den Genufs des Helleboros vorbereiten, mehr Nahrung zu sich nehmen als gewöhnlich, dabei aber eine übermäfsige Spannung des Magens zu vermeiden suchen, weil sonst leicht eine Schwäche im Magen zurückbleibt. Die Nahrungsmittel dürfen weder allzu leicht verdaulich noch blähend sein, damit der untere Teil des Darmes möglichst leer bleibt, und der obere Teil sie ohne grofse Mühe auszusondern imstande ist. Man vermeide zunächst alle scharfen, süfsen und fetten Stoffe: die erste Nahrung sei weich wie Brot und Obstbrei, das Fleisch darf nicht schwer verdaulich sein, sondern mäfsig fett und saftig, von den Hülsenfrüchten wähle man die scharfen aus wie Zwiebeln, Rettige, Lauch, von den Speisen mäfsig astringierende und geröstete wie Honigzwieback und als Dessert Feigen, Rosinen, Nüsse, Granatäpfel. Dazwischen trinke man zu wiederholten Malen leichten, milden Wein, bisweilen auch süfsen und Honigwein. Dagegen vermeide man den Genufs von Oliven, besonders von den in Salzlauge eingemachten¹¹⁾ und von Linsen. Wenn Jemand leicht vomiert, so genügt ein Gemisch aus Gerstenschleim und süfsem

¹⁾ Aret. cur. chr. m. I 3, 303.

²⁾ Aret. cur. chr. m. II 13, 342.

³⁾ Aret. cur. ac. m. I 5, 217. Aet. VI 13. Orib. II 151.

⁴⁾ Aret. a. a. O.

⁵⁾ Aret. cur. chr. II 7, 337.

⁶⁾ Aret. a. a. O.

⁷⁾ Aret. cur. ac. II 5, 272.

⁸⁾ Archigenes bei Orib. II 151. Aret. cur. ac. I 5, 217.

⁹⁾ Orib. II 147.

¹⁰⁾ Diese Vorschriften tragen denselben Charakter wie die Diätvorschriften des Aretaios.

¹¹⁾ Über die Bedeutung von *κολυμβάδες* vgl. Dar. zu Orib. I 609. Vgl. Cels. II 24: *oleae aceto intinctae*. Puschmann zu Alex. v. Tr. II 464 A. 1.

Wein oder Honigwein während der Mahlzeit. Sind kräftige Brechmittel erforderlich, so verordne man Sesam und Narzissenzwiebeln¹⁾ in Gerstenschleim, eingesalzenes Fleisch mit Essig und Öl und mit rohem oder gekochtem Gemüse.

Wirksamer ist das Brechen mit Hilfe von Rettigen²⁾. Man esse etwas mehr als ein Pfund, aber nicht mehr als $1\frac{1}{2}$ Pfund. Die Rettige müssen scharf und weich sein. Sind sie süßlich, so verwende man außer ihrem Fleisch auch die Schale und die weichsten Teile der Blätter. Man lege sich im Essen Beschränkung auf, dagegen trinke man vorher Wasser, eröffne einen Tag vor dem Vomieren den Magen durch die gewöhnlichen Mittel, selbst mit Hilfe eines Klysters und gehe in der Sonne spazieren, im Sommer in luftiger Gegend zur Mittagszeit. Die Rettige vermische man mit Honig und setze dieser Mischung Salz hinzu und Essigmeth. Den Essigmeth kann man auch rein trinken bis zu $1\frac{1}{2}$ Cotylen. Von den Essigarten verwende man den Meerzwiebeleessig, von den Honigarten den, der nach Thymian schmeckt. Nach dem Genuß des Essigmeths soll der Kranke kurze Zeit ruhen, sich die Füße einreiben, einen kurzen Spaziergang auf gewundenem Pfade machen, darnach sich niedersetzen und vomieren. Nach diesem Akt spüle man sich den Mund, gurgle mit Honigwasser und einfachem Wasser, schlafe ein wenig, gehe spazieren, bade sich und nehme Nahrung zu sich.

Das wirksamste Brechmittel ist die Nieswurz, deren Verwendung in der Therapie der Pneumatiker eine hervorragende Rolle spielt³⁾. Beide Arten wurden in gleicher Weise von ihnen als Vomitiv verwandt. Die weiße wirkt nach ihrer Meinung mehr auf den oberen, die schwarze mehr auf den unteren Teil des Darmes; ohne den Körper allzu sehr anzugreifen, galt ihnen die weiße Nieswurz als das letzte Heilmittel bei allen chronischen Krankheiten⁴⁾: sie besitzt die Kraft, die Atemnot zu beseitigen, dem Kranken eine gesunde Farbe und einen vollen Körper zu verschaffen⁵⁾. Wegen

¹⁾ Aret. cur. ac. I 5, 218.

²⁾ Archigenes bei Orib. II 152 f.

³⁾ Daremberg zu Orib. II 800. Vgl. S. 62.

⁴⁾ Cels. II 13: *At ubi longi valentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis, ut insania, veratro quoque albo utendum est.*

⁵⁾ Aret. cur. chr. II 13, 346. Aet. VI 50.

ihrer heftigen Wirkung empfahlen sie den Kranken allmählich auf den Genuß dieses Mittels durch den ἔμετος ἀπὸ σιτίων und ἀποδαφανίδων vorzubereiten, um den Magen an das Brechen zu gewöhnen und den in ihm befindlichen Schleim zu verdünnen¹⁾. Die beste Helleborosart ist nach Herodot²⁾ die von Anticyra, nach Archigenes³⁾ die vom Oeta, die galatische und sicilische stehen ihr an Wirksamkeit nach. Über die Unterscheidungsmerkmale dieser drei Arten hat Archigenes ausführlich gehandelt⁴⁾: die Zweige der sicilischen Nieswurz sind gerade, hart, holzig, dünner und weniger locker als die der andern beiden Arten. Die galatische ist dicker, leicht gerunzelt, porös, weiß und von dem Aussehen des νάρθηξ. Die Nieswurz vom Oeta ist weniger weiß als die galatische, ihre Zweige sind weniger gerade und dünn, aber sehr porös. Ihr Fleisch ist weiß und hat den süßesten Geschmack; es reizt die Zunge nicht sogleich, sondern erst allmählich und veranlaßt einen anhaltenden Speichelfluß. Man muß sie anfeuchten, bevor man das Fleisch von der Rinde loslöst; beim Gebrauch muß sie äußerlich rein und im Innern ganz weiß sein. Die galatische Art reizt die Zunge sofort und führt einen reichlichen Speichelfluß herbei, der aber sogleich wieder nachläßt. Die sicilische veranlaßt nur einen geringen Speichelfluß, der unmerklich schwindet: man verwende sie in trockenem Zustande. Die Zweige zerschneide man nicht mit der Scheere, sondern mit einem Messer zwei- oder dreimal der Länge nach, je nach der Dicke derselben, und ebenso der Breite nach, so daß die einzelnen Stücke die Größe von Gerstengraupen erhalten⁵⁾. Man schneide sie nicht zu klein, da die feingeschnittenen eine stärkere Wirkung haben. Die größte Dosis soll zwei Drachmen⁶⁾ betragen, die kleinste 8 Obolen, die mittlere 10 Obolen. Eine geringere Dosis verursacht größere Beschwerden beim Brechen, eine größere geringere Beschwerden, aber ein stärkeres Vomieren. Man

¹⁾ Aret. cur. chr. I 3, 303. Archigenes bei Orib. II 146 f.

²⁾ Orib. II 165.

³⁾ Orib. II 155. Vgl. Plin. XXV 49 f. Diosk. IV 149.

⁴⁾ Orib. a. a. O.

⁵⁾ Vgl. Rufus bei Orib. II 144. Aret. cur. chr. I 3, 304.

⁶⁾ Ebenso Themison nach Plin. XXV 58: *Themison binas non amplius drachmas datavit, sequentes et quaternas dedere claro Herophili praeconio, qui helleborum fortissimi ducis similitudini aequabat.*

vergesse nicht den Helleboros vor dem Gebrauch zu trocknen, weil der frische zu leicht Erstickungsanfälle hervorruft. Den Geisteskranken¹⁾ soll man den Helleboros, weil sie einen unbegründeten Argwohn gegen ihn haben, heimlich beibringen, indem man ihn in einem Mehlbrei oder in einem Kuchen, auch wohl in einer Zwiebel, die man einer Suppe oder einem Mehlbrei oder einem Linsendecoct zusetzt, dem Kranken reicht. In diesem Falle soll die Dosis vier Drachmen betragen, weil die Wirkung des Helleboros schwächer ist. Man kann den Helleboros auch in Pillenform oder als *ἐκλείγμα* reichen²⁾. Die Zubereitung desselben geschieht in der Weise³⁾, dafs man ein Pfund Helleboros mit sechs Cotylen Wasser vermischt und drei Tage lang auf einem mäßigen Feuer kochen läfst, bis der dritte Teil des Wassers verdunstet ist, darnach den Helleboros ausdrückt, dieser Abkochung zwei Cotylen Honig zusetzt und die Mischung so lange

1) Herodot bei Orib. II 164: *Ἐπὶ δὲ τῶν μαινομένων καὶ μηδενὶ τρόπῳ ληψομένων αὐτὸν τῷ πρὸς πᾶσαν τροφήν ὑπόπτως ἔχειν ἢ διὰ τούτου δόσις ἀρίστη· καὶ γὰρ εἴ μὴ διακόψειε τελέως τὴν νόσον, ἐμείωσε μέντοι, ὥστε πολλάκις καὶ βουλομένοις ἐκ δευτέρου δοθῆναι. Προσφερέσθω δὲ διὰ ὕδρο-μέλιτος διεθὲν μετὰ πολλοῦ τοῦ χόνδρου· δυνατὸν δὲ καὶ σὺν φακῷ καὶ σὺν πέμμασι διδόναι. Vgl. Archigenes bei Orib. II 159 f., der dieselben Vorschriften, nur ausführlicher giebt. Man merkt bei beiden den Einfluß ihres Lehrers Agathinos, der über den Helleboros gehandelt hatte (Orib. II 158).*

2) Archigenes bei Orib. II 159. 163.

3) Archigenes (Orib. II 161) und Herodot (Orib. II 163) stimmen wieder im Wesentlichen:

Archigenes:

*Εἴ δὲ μὴ, ἐκλείγματι αὐτῷ χρη-
στέον· σκευάζεται δὲ οὕτως· ἑλλεβόρου
λίτραν δεῦ λαβεῖν ἑξελεγμένου, καὶ
βρέξαι εἰς ὕδατος ξέστας ἑξ ἐπὶ ἡμέρας
τρεις, εἴτα ἐψηῆσαι, μέχρις ἂν ἀπο-
λειφθεῖεν ξέσται τρεις· μετὰ δὲ ταῦτα
ἐκθλίψαντα σπουδαίως τὰ ῥαβδία
ἐκβάλλειν, τρεις δὲ λίτρας μίξαντα
μέλιτος τῷ λοιπῷ ὕδατι ἔψειν, μέχρι
σύστασις ἐκλεικτοῦ γένηται καὶ ἀπο-
θέμενον ἐν ὑέλῳ ἢ ἀργύρῳ τηρεῖν
σπουδαίως, ὅπως μὴ διαπνευσθῇ.
Διδόναι δὲ ἑξ αὐτοῦ τῷ παρεσκευα-
σμένῳ μύστρου συμμετρου πλήθος.*

Herodot:

*Ἔστι δὲ ἀκινδυνότατη χρῆσις παρὰ
ἡμῖν ἢ διὰ τοῦ ἐψηθέντος ἑλλεβόρου·
τὸν δὲ τρόπον τῆς σκευασίας ἔχει
τοιόνδε· ἑλλεβόρου λίτραν ἀποβρεχο-
μένην ὕδατος κοτύλαις ἑξ ἐπὶ τρεις
ἡμέρας μεταφέρομεν ἐπὶ πυρὸς μα-
λακοῦ μέχρι τοῦ ἀναλωθῆναι τοῦ
ὕδατος τὸ τρίτον, εἴτα τὸν ἑλλέβορον
ἀποθλίψαντες εἰς τὸ ἀφέψημα κοτύλας
δύο μέλιτος βαλόντες πάλιν ἔψομεν
μέχρι τοῦ ἀμόλυτον γενέσθαι. Δί-
δομεν δὲ τοῖς μὲν μὴ πολλῆς δεο-
μένοις καθάρσεως κοχλιάρια δύο,
τοῖς δὲ εὐτόνοις μύστρου πλήθος.*

kochen läßt, bis sie keinen Schmutz mehr absetzt. Sie verordneten von dieser Mischung gewöhnlich zwei Löffel. Herodot¹⁾ empfahl diese Art der Zubereitung, wenn es gilt, leichte Erkrankungen, die durch andre Mittel langsamer beseitigt werden, schnell zu bekämpfen. Archigenes verwandte dies *ἐκλείγμα* auch als Klystier²⁾. Am wirksamsten ist der Helleboros, wenn man ihn rein giebt³⁾; weder der Sommer noch der Winter ist zu seiner Anwendung die günstigste Zeit, am besten giebt man ihn im Frühling und im Herbst⁴⁾. Archigenes empfahl die Anwendung der Nieswurz beim chronischen Schwindel⁵⁾, bei der Melancholie⁶⁾, bei der Epilepsie⁷⁾, Cephalalaia⁸⁾, Gicht⁹⁾ und Elephantiasis¹⁰⁾.

Gefährlich bei der Anwendung dieses Vomitivs sind die Erstickungsanfälle, die dadurch hervorgerufen werden, daß sich der Schleim im Munde festsetzt¹¹⁾. Die Symptome sind geringer Speichelfluß, heftiger Brechreiz, ohne daß etwas erbrochen wird, Anschwellung des Gesichts, Hervortreten der Augen und Atemnot; bei einigen ist die Zunge hervorgestreckt, die Zähne sind aufeinander geprefst, Schweißsecretionen treten auf und schließlich beginnt der Kranke zu delirieren. In diesem Falle riet Herodot, ohne Verzug den Kranken durch Einführung einer mit Myrrhenöl bestrichenen Feder zum Vomieren zu zwingen. Er berichtet, daß er in einem Falle mit einem keilförmigen Instrument den Mund des von einem Erstickungsanfall heimgesuchten geöffnet und mit der Hand die Schleimmasse aus dem Munde entfernt habe.

¹⁾ Orib. II 164.

²⁾ Orib. II 162. Schon Pleistonikos bereitete aus dem Helleboros eine Art Seifenzäpfchen, das er, um Erbrechen zu erregen, in den Mastdarm steckte (Orib. II 143 = Diosk. IV 148, 629), während Phylotimos ihn in Rettigen gab, um seine Wirkung zu mildern (Orib. II 144 = Plin. XXV 59. Aret. cur. chr. II 7, 338. Aet. III 120), Dieuches als Cataplasma verwandte.

³⁾ Orib. II 164.

⁴⁾ Aret. cur. chr. II 13, 342. Cels. II 13. Plin. XXV 59. Aet. III 125.

⁵⁾ Aret. cur. chr. I 3, 303. Vgl. Plin. XXV 60.

⁶⁾ Aret. cur. chr. I 5, 320. Cels. III 18.

⁷⁾ Aet. VI 50. Vgl. Cels. III 23.

⁸⁾ Aet. VI 50. Aret. cur. chr. I 2, 302.

⁹⁾ Aret. cur. chr. II 12, 339.

¹⁰⁾ Aret. cur. chr. II 13, 346.

¹¹⁾ Herodot bei Orib. II 181.

Da das Blut dem menschlichen Körper zugleich Pneuma und Wärme zuführt, so hängt nicht zum mindesten von seiner Beschaffenheit das Wohlbefinden des Menschen ab. Demnach ergab sich den Pneumatikern als wichtiger therapeutischer Grundsatz, dem Überflufs und der Verderbnis desselben durch Blutentziehungen zu steuern¹⁾. Dazu bedienten sie sich der gebräuchlichen Mittel der Venaesektion, der Schröpfköpfe, der Scarification, der Blutegel und der Arteriotomie²⁾.

In der Wertschätzung der Venaesektion waren sich die Anhänger dieser Schule nicht einig. Während Herodot und Archigenes ihr grofsen Nutzen zuschrieben, warnte Apollonios³⁾ vor wiederholten Blutentziehungen im Laufe eines Jahres, weil zugleich mit dem Blut dem Körper zuviel Pneuma entzogen werde und das Allgemeinbefinden darunter leide. Er beschränkte daher die Venaesektion auf die schwersten und gefährlichsten Krankheiten, bei denen eine reichliche Blutentziehung erforderlich sei. Die Venaesektion hat nach ihrer Theorie den Zweck, Entzündungen zu bekämpfen und zu mäßigen⁴⁾ und die dadurch herbeigeführte Erstickungsgefahr zu beseitigen⁵⁾. Sie wurde von ihnen an verschiedenen Venen vorgenommen, an denjenigen der Ellenbeuge⁶⁾, der Arme⁷⁾, der Knöchel⁸⁾, der geraden Stirnvene⁹⁾, der Vene zwischen dem kleinen und dem Ringfinger der linken Hand¹⁰⁾, der Zunge¹¹⁾ und an den zu beiden Seiten der Nase am Augenwinkel liegenden Venen¹²⁾. In fast allen Krankheiten, acuten wie chronischen, wurde sie vor-

¹⁾ Herodot bei Orib. II 64.

²⁾ Ps.-Gal. *ōpōt* XIX def. 463 p. 458, 5. Vgl. Aret. cur. chr. I 2, 295. Archigenes empfahl die Arteriotomie bei allen Kopfkrankheiten.

³⁾ Orib. II 64. Vgl. Gal. XI 322.

⁴⁾ Aret. cur. ac. I 7, 224. I 10, 232. II 5, 271.

⁵⁾ Aret. cur. ac. I 8, 229.

⁶⁾ Aret. cur. ac. I 1, 188. 209 und öfter. Bisweilen soll man die Venaesektion an der der Krankheit entgegengesetzten Seite vornehmen: Aet. VIII 68. Aret. cur. ac. I 10, 232.

⁷⁾ Aret. cur. ac. II 1, 243.

⁸⁾ Aret. cur. ac. II 10, 286.

⁹⁾ Aret. cur. chr. I 1, 294. I 3, 303.

¹⁰⁾ Aret. cur. ac. II 2, 248. Aet. VIII 62, wo Archigenes beim Blutauswurf diese Art der Blutentziehung für den Fall empfahl, daß die Blutung aus der Milz entsteht. Vgl. Aret. a. a. O.

¹¹⁾ Aret. cur. ac. I 7, 225.

¹²⁾ Aret. cur. chr. I 3, 303.

genommen, insbesondere aber in denjenigen, welche in der schlechten Beschaffenheit oder dem Überflufs an Blut ihre Ursache haben.

Das Alter¹⁾ und der Kräftezustand des Kranken gab ihrer Meinung nach den Mafsstab für seine Anwendung ab²⁾. Den Kräftezustand beurteilten sie nicht so sehr nach dem äufseren Aussehen als nach der Beschaffenheit der Blutgefäfsse: polyämische Individuen ertragen die Blutentziehung im allgemeinen leichter als blutarme³⁾. So beschränkte Archigenes beim Blutauswurf die Venaesection auf vollblütige Leute⁴⁾, während er sie in der Melancholie sogar bei blutarmen Individuen für zweckmäfsig erachtete, weil diese Krankheit in der schlechten Mischung der Säfte ihren Grund hat⁵⁾. Mit grofser Vorsicht bestimmten sie in jeder Krankheit die Quantität des zu entleerenden Blutes⁶⁾, wobei sie auf die grofse Gefahr aufmerksam machten, welche mit einer übermäfsigen Blutentziehung verbunden ist, da ja das Blut nach ihrer Auffassung der eingepflanzten Wärme zur Nahrung dient⁷⁾. Bei einer Reihe von Krankheiten, insbesondere bei den chronischen, warnten sie davor, mit einem Male eine gröfsere Blutmenge zu entziehen, um die Kräfte des Patienten nicht allzusehr zu schwächen⁸⁾ und empfahlen, lieber den Aderlafß zu wiederholen⁹⁾, damit sich in der Zwischenzeit die Kräfte wieder ersetzen können¹⁰⁾. So vorsichtig sie demnach im Allgemeinen die Venaesection behandelten, so energisch traten sie in solchen Fällen, wo eine gefährliche Entzündung oder Erstickung droht, für eine möglichst reichliche Blutentziehung ein, die sie sogar bis zur Ohnmacht fortsetzten¹¹⁾. Von Herodot sind uns genauere Vorschriften über die Anwendung des Aderlasses im Fieber erhalten¹²⁾. Im Allgemeinen befolgten die Pneumatiker den Grundsatz, bei vollsäftigen Constitutionen im Fieber den Aderlafß anzuwenden, bei Individuen mit schlechten Säften dagegen ein Abführmittel¹³⁾. Bei Fiebern von gutartigem Charakter zogen sie

¹⁾ Aret. cur. ac. II 8, 281.

²⁾ Aret. cur. ac. II 3, 258.

³⁾ Aret. cur. ac. I 1, 188. II 2, 201.

⁴⁾ Aret. cur. ac. II 2, 247.

⁵⁾ Aret. cur. chr. I 5, 316.

⁶⁾ Aret. cur. ac. I 1, 209.

⁷⁾ Aet. XIII 121.

⁸⁾ Aret. cur. chr. I 1, 294.

⁹⁾ Aret. cur. ac. I 10, 232.

¹⁰⁾ Aret. cur. ac. II 7, 278.

¹¹⁾ Aret. cur. ac. I 7, 224. II 5, 271. II 11, 289.

¹²⁾ Orib II 42. Vgl. Cels. II 10.

¹³⁾ Archigenes bei Aet. VI 50.

den Aderlaß vor, wenn keine der Qualitäten im Übermaß vorhanden war oder wenn die Wärme überwog, die Abführmittel, wenn die Feuchtigkeit vorherrschte¹⁾. Herodot verwarf den Aderlaß im ersten Stadium des Fiebers, außer wenn mit dem Fieber Krankheitserscheinungen verbunden waren, die einen sofortigen Eingriff des Arztes erfordern, wie Atemnot, Krampf oder große Schmerzen. Er empfahl vielmehr den Zeitpunkt abzuwarten, wo das Fieber nachgelassen hat, weil die Blutentziehung Kraft erfordert und zur Zeit des Fieberanfalles die Kräfte des Kranken geschwächt sind. Sind die Pausen zwischen den Fieberanfällen lang, so warte man den Zeitpunkt ab, wo das Fieber völlig nachgelassen hat; sind sie kurz, so lasse man zu Beginn des Nachlasses zur Ader und reiche nach dem Aderlaß dem Kranken Nahrung. Es wäre aber unrichtig, wenn man den Zeitpunkt, wo man dem Fieberkranken Nahrung reichen kann, mit dem des Aderlasses identifizieren wollte, da man den Aderlaß bisweilen während des Fiebers mit Nutzen anwenden kann, dagegen niemals während des Fiebers Nahrung reichen darf. Bei den continuierenden Fiebern hat man zu unterscheiden, ob sie ununterbrochen mit derselben Stärke auftreten (*πυρετοὶ σύνοχοι*) oder ob bei ihnen Abnahme und Zunahme zu merken ist (*πυρετοὶ συνεχεῖς*). Im ersteren Falle lasse man zur Ader zu der Zeit, wo man dem Kranken Nahrung reicht und zwar kurz vorher, im letzteren Falle nehme man den Aderlaß nicht zu der Zeit des Anfalls vor, sondern zu der Zeit, wo das Fieber sich gleich ist.

Als weiteres Blutentziehungsmittel wandten sie die Schröpfköpfe an. Apollonios ging in ihrer Wertschätzung soweit, daß er die Scarification der Venaesection vorzog²⁾, weil durch sie dem Körper weniger Blut entzogen werde. Ihre Wirkung besteht nach Herodot⁴⁾ darin, daß sie die verdorbenen Säfte vermindern³⁾, Schmerzen lindern⁵⁾, Entzündungen verringern⁶⁾, die Ansammlung von Gasen verhüten, Appetit erzeugen, den Magen kräftigen, den Krankheitsstoff an die Oberfläche bringen, den Blutfluß hemmen, Fluxionen trocknen⁷⁾, die Stockung der Menstruation⁸⁾ sowie den

¹⁾ Archigenes bei Orib. II 270.

²⁾ Apollonios bei Orib. II 66.

³⁾ Orib. II 62.

⁴⁾ Vgl. Apollonios bei Orib. II 68.

⁵⁾ Vgl. Apollonios a. a. O.

⁶⁾ Vgl. Aret. cur. ac. I 1, 196.

⁷⁾ Vgl. Apollonios bei Orib. II 67.

⁸⁾ Vgl. Apollonios bei Orib. II 66.

Schüttelfrost und die periodisch wiederkehrenden Erkrankungen beseitigen, endlich Schlaf erzeugen. Sie unterschieden, wie noch heutzutage geschieht, zwei Arten von Schröpfköpfen: trockene und blutige¹⁾ und verwandten sie in den meisten Krankheiten²⁾. Sie wurden auf die verschiedensten Körperteile appliciert: auf den Scheitel³⁾, in das Genick⁴⁾, zwischen die Schulterblätter⁵⁾, auf die Brust⁶⁾, auf den Rücken und die Präcordien⁷⁾, je nach dem Sitz der Entzündung oder der Säfteanomalie. Wie bei der Venaesection bestimmten sie die Quantität des zu entleerenden Blutes nach dem Kräftezustand und unter Umständen nach der Heftigkeit der Entzündung⁸⁾. Sie zogen die scarificierten Schröpfköpfe dem Aderlaß vor, wenn der Zustand der Kräfte die Vornahme eines solchen nicht gestattet⁹⁾, andererseits aber eine Blutentziehung durchaus notwendig ist¹⁰⁾, oder wenn die Krankheit in einem einzelnen Körperteil ihren Sitz hat¹¹⁾. Bisweilen legten sie einen oder zwei Tage vor der Application der Schröpfköpfe Cataplasmen auf den leidenden Teil, um ihn dadurch zu erschaffen und einen reichlicheren Blutfluß zu bewirken¹²⁾ oder applicierten vor dem blutigen einen trockenen Schröpfkopf¹³⁾. Sie warnten davor, die Schröpfköpfe längere Zeit an einer Stelle zu belassen, weil dadurch Schmerzen hervorgerufen werden und die Gefahr entsteht, daß sich Blasen bilden¹⁴⁾. Bei denjenigen Krankheiten, welche auf der Ansammlung schädlicher Stoffe beruhen, wandten sie, um den Körper von denselben zu befreien, Cataplasmata, Einreibungen des Gesäßes, Stuhlzäpfchen, Klystiere und Abführmittel an. Die Cataplasmata legten sie gewöhnlich auf den Unterleib bis zum Bauchnabel, bisweilen auf den ganzen Bauch¹⁵⁾. Archigenes empfahl als Cataplasma bei gutartigen Fiebern eine Abkochung von $\frac{3}{4}$ Trespenmehl (*αἶρινον ἄλευρον*) und $\frac{1}{4}$ Daphne Gnidium (*κνέωρον*). Für die Einreibungen verwandte

¹⁾ Aret. cur. ac. I 1, 196 f.

²⁾ Vgl. Apollonios bei Orib. II 66 f.

³⁾ Aret. cur. ac. I 2, 214. chr. I 1, 294.

⁴⁾ Aret. cur. ac. I 4, 214.

⁵⁾ Aret. cur. ac. I 4, 214.

⁶⁾ Aret. cur. ac. I 8, 229.

⁷⁾ Aret. cur. ac. I 1, 244.

⁸⁾ Aret. cur. ac. I 1, 196. Apollonios bei Orib. II 65.

⁹⁾ Aret. cur. ac. II 3, 259.

¹⁰⁾ Aret. cur. ac. II 3, 259.

¹¹⁾ Aret. cur. ac. II 8, 281.

¹²⁾ Aret. cur. ac. II 3, 259.

¹³⁾ Aret. cur. ac. I 4, 204.

¹⁴⁾ Aret. cur. ac. II 4, 269.

¹⁵⁾ Archigenes bei Orib. II 270.

er eine Mischung von Wolfsmilchsaft (*τιθυμάλλον ὀπός*)¹⁾ mit dem Saft von Erdscheibe (*κνκλάμινος*), Elaterum und Honig oder Tausendgüldenkraut (*κενταύριον*) mit Honig und Natron²⁾ oder Raute mit Opoponax und Terpentinharz³⁾. Als Mischung für die Stuhlzäpfchen kehren verschiedene Recepte wieder wie Samen von Raute, Natron, Kümmel und Honig⁴⁾ oder Erdscheibe mit Salzwasser angefeuchtet⁵⁾. In der Phrenitis wandte Archigenes Stuhlzäpfchen an, um dadurch den Krankheitsstoff vom Kopfe abzuleiten und die in der Brust und dem Bauche angehäuften Gase zu entfernen⁶⁾, ein Klystier dagegen erst dann, wenn seit mehreren Tagen kein Stuhlgang erfolgt ist. Bei den Klystieren machte er einen Unterschied zwischen *κλυστήρες ἀπαλοί* und *δρομεῖς*⁷⁾, je nachdem sie schwachwirkende oder scharfe Substanzen enthalten. Ist ein gelindes Klystier am Platz, so empfahl er Leinöl, eine Abkochung von Bockshornklee (*τῆλιν*) und von Malvenwurzel⁸⁾. Schärfere Klystiere bestehen aus Natron, Euphorbiumharz, dem Coloquinthenfleisch, einer Abkochung der Blätter von Centaurium in Öl oder Wasser⁹⁾ oder Honig, Raute, Terpentinharz, Salz und einer Abkochung von Ysop¹⁰⁾ oder, wenn es gilt, auch die entfernter liegenden Stoffe zu beseitigen, aus *λινόζωστις* und einer Abkochung von Coloquinthen¹¹⁾. Von allen Purgirmitteln sind die wirksamsten die beiden Arten des Helleboros¹²⁾, von denen der weiße mehr auf den oberen, der schwarze mehr auf den unteren Teil des Darmes wirkt. Durch den schwarzen Helleboros wird schwarze Galle abgeführt, wenn man von ihm zwei Drachmen in Honigmeth oder eine Mischung mit Thymianblättern dem Kranken reicht¹³⁾; daher ist er das beste Mittel gegen Melancholie. Zur Abführung der dünn- und dickflüssigen Galle empfahl Archigenes die Coloquinthenpille¹⁴⁾. Er verordnete für gewöhnlich eine Dosis von 24 haselnußgroßen Pillen, bei wiederholter Anwendung von 18 Pillen. Der Schleim wird am

1) Vgl. Puschmann, Alex. v. Tr. II 143.

2) Aet. IX 28.

3) Aet. VI 38.

4) Aet. IX 28.

5) Orib. II 270.

6) Aret. cur. ac. I 1, 196.

7) Archigenes bei Orib. II 204.

8) Aret. cur. ac. II 7, 278.

9) Aret. cur. ac. I 4, 211.

10) Aret. cur. ac. m. I 4, 214.

11) Archigenes bei Orib. II 271.

12) Aret. cur. chr. m. II 13, 346.

13) Aret. cur. chr. m. I 5, 317.

14) Archigenes bei Orib. II 272.

besten durch Blätter oder Samen von *Daphne Gnidium* entfernt ¹⁾, Schleim und Galle zugleich durch die *Hiera*, von der es eine eigene Zubereitung des Archigenes ²⁾ gab und die er in den meisten Krankheiten verordnete, weil sie nicht nur den Kot entleert, sondern auch am besten die Krankheitsstoffe vom Kopf ableitet ³⁾ und erwärmend auf Eingeweide und Unterleib wirkt ⁴⁾. Endlich will ich noch erwähnen, daß das Bibergeil, das zu den Lieblingsmitteln dieses Arztes gehörte ⁵⁾, ebenfalls in Klystierform von ihm appliciert wurde.

¹⁾ Aret. cur. chr. I 4, 311.

²⁾ Vgl. S. 36.

³⁾ Aret. cur. chr. I 1, 294.

⁴⁾ Aret. cur. ac. I 6, 224.

⁵⁾ Archigenes schrieb ein ganzes Buch über das Bibergeil: Gal. XII 337.

I. Sachregister.

Aetius benützt den Philumenos 35f. 92f. Quelle von B. XVI s. Compilation 126 ff.

Agathinos: Lebenszeit 9. Schriftstellerei 12. Schrift *περὶ σφυγμῶν* von Galen benützt 12 A. 8; Ansicht über das halbdreitägige Fieber 167; Pulslehre 171. 172 A. 8. 180 A. 2. 183. 186; Ansicht über den Wert der Bäder 213; von Archigenes und Herodot benützt 224 A. 1. 3.

ἀγκύλη 79.

αἴτιον s. Ursache; Definition des Athenaios 155 A. 3.

ἀκροχορδών 79.

Alexander aus Aphrodisias, Schrift *περὶ πυρετῶν* 86 ff.; Quelle 90.

ἀλλοίωσις 134 A. 136.

Amyntianos *περὶ ἐλεφάντων*, von Aretaios benützt 64.

ἀνέυρυσμα 79.

angina 55 A. 2.

Antyll: Lebenszeit und Schriftstellerei 109f. 114; benützt Archigenes und Athenaios 110 f.; Heliodor und Leonidas 115 A. 1. 121.

ἀπήχημα 77.

Apollonios von Philoxenos benützt 124.

Apollonios aus Pergamon, Pneumatiker 17; Ansicht über den Wert der Venaesektion 226; der Scarification 228.

ἀποσκεπαρισμός 76.

Archiatric 1f.

Archigenes: Lebenszeit 8. Schriftstellerei 19 f. Pathologie und Therapie Quelle des Aretaios 23f.; des Soran 43. 53; des Philumenos 35f. 92f. 126. Schrift *περὶ πυρετῶν* Quelle des Galen 84f.; des Aretaios 91. Schrift *περὶ πεπονθότων τόπων* von Galen benützt 91f.; Quelle des Antyll 110f. S. Lehre vom Pneuma 137 A. 3; von der Pulsation 140; Sitz des *ἡγεμονικόν* 141 A. 1. S. Pathologie 157f.; Fieberlehre 163f.; Lehre von den kritischen Tagen 168. Pulslehre 171; Reconstruction s. Schrift *περὶ σφυγμῶν* 170f.; von Herophilos abhängig 172. 188f. 193; polemisiert gegen Magnus 179. 187. S. Therapie 215f.; benützt Agathinos 224 A. 1. 3.

Aretaios: Lebenszeit 63; benützt Archigenes 23 ff. 91 f. Quelle des Alexander von Aphrodisias 90; von dem Verfasser der pseudo-gal. *ἔργοι* benützt 66; benützt Amyntianos 64.

Aristoteles, Quelle der Entwicklungstheorie des Athenaios 101. 148f.

Aristoxenos von Tarent: s. Einfluß auf die herophileische Pulslehre 188f.

Asklepiades benützt Herodikos und Euryphon 59 A. Quelle des Celsus

- 55 A. 2. Einfluß auf die Therapie der Pneumatiker 211 f.
- Athenaios: Lebenszeit 8. Citatenfülle 9 f. S. Schrift *περὶ βοηθημάτων* 10 f. Quelle von Galen *περὶ σπέρματος* 100 f. S. Physiologie 131 f. von der Stoa abhängig 132 f.; Elementenlehre 133 f.; Lehre vom Pneuma 137 f.; Lehre von der Mischung 143 f.; Entwicklungslehre s. Aristoteles; pathologische Theorien 153 f.; Ätiologie 155; Fieberlehre 163; Pulsdefinitionen 68 A. 2. 171. Diätetik 202.
- ἀσέρωμα* 72. 121.
- Atmung 138.
- Augenkrankheiten 116 ff.
- Bäder 212 ff.
- Blut 139 f.
- Brechmittel, therapeutische Verwendung 219 f.
- Brote, ihr diätetischer Wert 203.
- Cardinalsäfte, Qualitätenmischung derselben 148. Verwendung zur Erklärung der Fieber 166.
- Celsus benützt dieselbe Quelle wie Plinius (Varro) 25 A. 3; benützt Asklepiades 55 A. 2; s. Chirurgie von Philoxenos abhängig 116 ff.
- χαλάζιον* 117.
- Chirurgie der Pneumatiker 72 f. 115; von Philoxenos abhängig 123.
- Chrysipp, Quelle der Physiologie des Athenaios 68. 132 ff.
- Cornutus, Freund des Agathinos 9.
- Darmbrucharten 73 f.
- Darmverschlingung 38 f. 161.
- Diätetik, pneumatische 201 f.
- διονυσίσκοι* 80.
- Dyskrasie, Begriff derselben 145; Arten 145 ff.; Bedeutung für die pneumatische Pathologie 157 ff.
- ἐγγείσωμα* 77.
- ἐγκοπή* 76.
- Elemente, Athenaios Lehre von ihnen 133 f.; von Chrysipp abhängig 135 A. 2.
- Elephantiasis 24 f.
- ἐμβρουλκία* 118 f.
- ἐμφυτον θερμόν* 137.
- ἐμπίεσμα* 77.
- Entwicklungslehre, des Athenaios 148 f.; von Aristoteles beeinflusst 148; des Galen von Athenaios abhängig 100 f.
- Epilepsie 54 f. 160.
- Eukrasie, Lehre von der 143 f.
- Fieberlehre, pneumatische 85. 163 ff.
- Frictionen 211 f.
- γαγγλίον* 78.
- Galen: mißversteht Athenaios Elementenlehre 133 A. 6; s. Schrift *περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων* 134 A.; Quelle s. Schriften: *περὶ διαφορᾶς πυρετῶν* 84 f.; *περὶ πεπονθότων τόπων* 91 f.; *περὶ σπέρματος* B. II: 100; Quelle seines Commentars zu Hipp. *περὶ χυμῶν*, s. Schrift *περὶ βδελλῶν κτλ.* 104 f.; seiner Pulslehre 170 ff.; benützt Agathinos Schrift *περὶ σφυγμῶν* 12 A. 8; Ps.-Galens *ὅροι ἱατρικοί*, Abfassungszeit 65 ff.; Quellen 67 ff.
- Gegenden, diätetische Bedeutung derselben 204.
- Gerste s. Getreidearten.
- Getreidearten, diätetischer Wert ders. nach Athenaios 202 f.
- ἡγεμονικόν* 67 A. 3. 140; Sitz derselben 141.
- Heliodor, Pneumatiker 18. S. Chirurgie 18 A. 3; benützt Leonidas 78; von Antyll benützt s. Antyll.
- Helleboros 62. 222 f.

ἥλος 78.

Herodot: Lebenszeit 14. Schriften 15 f. Vorschriften über Frictionen 211; über Bäder 213 f.; über den Wein 217; über Helleboros 223; benützt den Agathinos 224 A. 1. 3.

Herophilos: von Archigenes benützt 172. 188 f. 193. Pulslehre 172 f.; in s. Theorie vom Rhythmos des Pulses von Aristoxenos abhängig 188 f.

ἕξις 69. 140.

Hiera 36 A. 1.

ὕδατις 116 f.

hysterischer Erstickungsanfall 83. 92 f.

Jahreszeiten, Qualitätenmischung 147: Vorschriften über die Lebensweise in den einzelnen 208 ff.

καμάρωσις 77.

Klystiere 229 f.

κολόβωμα 80.

Kopfschmerz 46 f.

kritische Tage, Lehre von dens. 168.

Kriton, Leibarzt des Trajan 14 A. 7.

λαγώφθαλμος 117.

Lebensalter, Qualitätenmischung 146; Vorschriften über die Lebensweise 206.

Leber 70. 139.

Leonidas: Lebenszeit 16; seine Theorie von den Schädelbrüchen 78; Quelle des Heliodor 78; benützt den Philoxenos 123.

Lethargie 57 A. 157.

Luft, Bedeutung ders. für die Diätetik 204.

Lungenentzündung 51 f. 83. 159.

Magnus: Lebenszeit 13. Pulsdefinition 171 A. 8; von Archigenes benützt 179. 187.

marasmische Fieber 165.

Magen 139.

μελικηρίς 73. 121.

Menemachos aus Aphrodisias, Schüler des Themison 7 A. 1.

Milz 139.

Mnaseas, methodischer Arzt 7 A. 1.

μυρμηκία 79.

Nieswurz s. Helleboros.

νόσος 161.

Oribasius: benützt die Compilation des Antyll 104 ff.; den Philumenos 37. 126 f.

passive Bewegung 211.

Pathologie, pneumatische, insbesondere des Archigenes 153 ff.

πάθος, Bedeutung 161.

Paulus Aegineta: seine Chirurgie (VI) 116 ff. Erklärung der Übereinstimmung mit Celsus 116 f.; benützt Philumenos 78. 118.

περιφίμωσις 81.

Perspiration 138.

Petronius Aristocrates 11.

Philagrios 63.

Philippi medici 19 A. 2; Ph. über das marasmische Fieber 165.

Philistion 203.

Philoxenos: Quelle des Celsus und Leonidas 116 f.

Philumenos. Lebenszeit 129 f. γυναικεῖα 130; Quelle des Oribasius 37. 126 f.; des Aetius 35. 92. 126 f.; des Paulus Aegineta 78. 118; benützt Archigenes 35 f. 92 f.; Sorau 118. 127 f.; Herodot 130 A. 1.

Phrenitis 57 A.; nach Archigenes 158.

Physiologie der Pneumatiker 131 f.; von der Stoa abhängig 132 ff.

φύσις 69. 140.

Pleuritis 42 f. 159.

Plutarch: benützt stoische Vorlage in s. Schrift de sanitate tuenda 143 A. 2.

Pneuma, Lehre vom 137 ff.; verschiedene Abstufungen desselben 140; vgl. 69.

Proculus, Proklos: Methodiker 7 A. 1. *προηγούμενα αἷτια* 155.

ψυχή 140.

πτερύγιον 117.

Pulsation 140.

Pulslehre, pneumatische 12 A. 8. 70 f. 169. Reconstruction der P. des Archigenes 171 f.; des Herophilos 188 f.

πυρετοὶ σύνοχοι, συνεχεῖς 167. 168. 228.

πῶρος 78.

Qualitätenlehre der pneumatischen Schule 133 ff.

ῥύσις 134 A. 136.

ῥωγμή 76.

Schädelbrüche 75 f.

Scholiast zu Oribasius, Zeit 65 A. 5.

Schröpfköpfe 228 f.

Sinne und sinnliche Wahrnehmung, Ansicht der Pneumatiker über dieselbe 142.

Soran: benützt den Archigenes 43. 50; s. *γυναιχεῖα*, von Philumenos benützt 127.

Sostratos, von Philoxenos benützt 124.

Sprache, als Förderungsmittel der Gesundheit 143.

στεάτωμα 73.

Stimme, pneumatische Erklärung derselben 142.

Stoa, Einfluß derselben auf die pneumatische Physiologie 132 ff.

σύμπτωμα 161.

τερηδών 80.

Tharrias = Thraseas, Tharseas 58 A.

Theodoros, Pneumatiker 13.

Therapie der pneumatischen Schule 210 f.

θλάσμα 77.

θύμος 78.

τόνος des Pneuma 142.

τριχίασις 117.

Tryphon: Vater und Sohn 8 A. 7.

Ursachen, pneumatische Bestimmungen über Begriff und Arten ders. 154 f.; von der Stoa beeinflusst 156.

Venaesektion, Vorschriften darüber 226 f.

Vipernmittel 37.

Wärme, eingepflanzte 137.

Wassersucht 58 A. 159.

weibliches Geschlecht, Vorschriften über die Lebensweise dess. 207.

Wein, s. therapeutische Verwendung 215 f.

Weizen s. Getreidearten.

II. Stellenregister.

(Die verbesserten Stellen sind mit einem Stern versehen.)

Aetius: (II 170) 37 A. 1; (III 162)* 113; (III 167)* 110f.; (III 181)* 49; (IV 106) 19 A. 2; (VI 15)* 50; (VI 50)* 57f.; (VIII 66)* 51; (VIII 68)* 44; (IX 28)* 39 f.; (X 29) 59 A.; (XIII 120. 121)* 28f. 32f.; (XV 7)* 121. vgl. 72; (XV 9)* 79; (XV 11)* 73; (XV 12) 80; (XVI 68)* 92f.; (XVI 76)* 127.

Alexander Aphrod. *περὶ πυρετῶν* (c. 15 p. 91 Jd.)* 88; (c. 30) 90.

Alexander Trall. (I 557 Puschm.) 60; (I 561)* 60.

Aretaios caus. ac. m. (I 10, 20) 42; (II 1, 25)* 51f.; (II 4, 41) 82; (II 5, 43) 82; (II 6, 45)* 39f.; (II 11, 60)* 83, 98f. caus. chr. m. (I 2, 68) 66; (II 13 p. 175) 64; (II 13 p. 178)* 28 ff.; (II 13, 183) 37 A. 1; cur. ac. m. (I 10, 232)* 44; (II 5, 271) 41; (II 5, 273)* 42; cur. chr. m. (I 2, 293)* 47f. 50; (II 13, 341 f.)* 32f.

Athenaios (III 115) 202 A. 2; 203 A. 2.

Caelius Aurelianus A. M. (II 9) 57 A.; (II 27) 53; (III 4) 56 A.; (III 17) 38 f. M. Ch. (III 8) 58 A.; (IV 1) 25 A. 1. 2. 37.

Celsus (III 20) 57 A.; (III 21) 58; (III 25) 25 A. 3; (IV 7) 56 A.; (V 28) 26 A.; (VII 6) 121; (VII 29) 118.

Cramer (A. P. IV 196)* 16 A. 12).

Dioskorides (II 18) 37 A. 1.

Galen: (I 457) 133 A. 6; (I 522) 68. 144 A. 6; (IV 603)* 150 A. 7; (VII 275f.) 68; (VII 295) 86; (VII 304) 90; (VII 609)* 153 A. 3; (VII 670) 19 A. 2; (VIII 150) 48; (VIII 414f.)* 94f.; (VIII 455f.) 175; (VIII 519f.)* 195; (VIII 626)* 194; (VIII 640)* 179 A. 6; (VIII 644)* 180 A. 3; (VIII 651)* 181 A. 2; (VIII 932)* 179; (IX 306)* 198; (IX 670f.) 84; (X 929) 141 A. 1; (XIV 698f.) 133 A. 2; (XIV 942) 57 A.; (XVI 134)* 105f.; (XVI 141f.)* 106; Ps.-Galen XIX (def. 9, 351)* 67 A. 2; (def. 11, 351) 67 A. 1; (def. 29, 355) 140 A. 10; (def. 47, 359) 69; (def. 51, 360) 70; (def. 73, 74 p. 365) 70; (def. 104, 373) 68 A. 1; (def. 110, 375) 68 A. 2; (def. 113, 378)* 67 A. 3; 141 A. 3; (def. 155, 392)* 155 A. 3; (def. 158f. p. 393) 156; (def. 162, 394) 156 A. 3; (def. 185, 398) 68 A. 3; (def. 186, 318)* 167 A. 8; (def. 188, 399) 82; (def. 209, 404) 71 A. 1. 182 A. 9; (def. 210, 405) 185; (def. 212, 405) 185; (def. 213, 406) 71 A. 2. 181 A. 1; (def. 214, 406) 186; (def. 217, 407) 71 A. 3; (def. 220, 408)* 189 A. 4; (def. 265, 420) 82; (def. 266, 421)

- 82; (def. 269, 419) 83; (def. 300, 428) 83; (def. 316—324 p. 431, 13f.)* 75 f.; (def. 375, 440) 72; (def. 376, 440) 73; (def. 378, 441) 79; (def. 380, 441) 78; (def. 388, 442) 80; (def. 389, 442)* 78; (def. 390, 442) 80; (def. 394, 443) 80; (def. 395, 443) 80; (def. 399, 444) 79; (def. 400, 444) 79; (def. 401, 444) 79; (def. 402, 444) 78; (def. 412, 445)* 81; (def. 413, 445)* 80; (def. 416, 445)* 81; (def. 420, 446)* 81; (def. 423—431 p. 447f.) 73; (def. 438, 449) 78; (XIX 629)* 175; (XIX 640)* 199.
- Macrobius (com. in somn. Scip. I 6, 65) 152 A. 4.
- Muscion (Sor. ed. Rose p. 106) 124.
- Oppian (Cyn. II 489f.) 64.
- Oribasius (II 42) 105; (II 161. 163) 224 A. 3; (II 164) 224 A. 1; (II 195f.) 106 f.; (II 287) 113; (II 383) 110; (IV 9, 9) 72; (V 539) 92. 126.
- Paulus Aegineta (VI 36 B.) 121 f.; (VI 62f.)* 74; (VI 74) 118f.; (VI 90)* 76 f.
- Photios (bibl. c. 221 p. 177 a 7) 125.
- Plinius (XXVI 7) 25 A. 3; (XXIX 70) 37 A. 1.
- Rufus (ed. Ruelle 166, 9) 137 A. 7; (p. 231) 174f.
- Scholien zu Oribasius (III 681, 10) 130; (IV 526, 13) 73; (IV 527, 3) 72; (IV 535, 32) 65.
- Sextus Empiricus (Hyp. III 15) 156 A. 6.
- Soran (περὶ γυν. παθ. II praef. 2 R.)* 9 A. 8; (II 19, 363 R.) 118; (II 31, 375) 127.


Nachwort.

Die Absicht, welche der Titel der vorliegenden Schrift verkündet, hat sie nur in beschränktem Sinne erreicht. Die Darstellung der pneumatischen Chirurgie, die einer Geschichte der Chirurgie im Altertum gleichkäme, erfordert ein Buch für sich ebenso wie die Behandlung der pneumatischen Pharmakologie, die in der Reconstruction der pharmakologischen Schriften des Archigenes gipfeln würde. Ich habe deshalb beides von meiner Darstellung ausgeschlossen.

Einem Herzensbedürfnis genüge ich, indem ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor von Wilamowitz-Moellendorff, für seine wertvollen Beigaben zu dieser Schrift öffentlich danke.


Rom, am Palilienfeste 1895.

Max Wellmann.





Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung. Äußere Geschichte der pneumatischen Schule bis auf Archigenes.	
1. Athenaios	5
2. Agathinos	11
3. Theodoros. Magnus	13
4. Herodot. Leonidas	14
5. Apollonios aus Pergamon. Heliodor	17
6. Archigenes	19
I. Teil. Quellen für das System der pneumatischen Schule.	
1. Aretaios	23
2. Galen. Pseudogalens Schrift <i>ὅροι ἰατρικοί</i>	65
Galen's Schriften <i>περὶ διαφορᾶς πυρετῶν, περὶ τῶν πεπονθότων νόσων</i> und <i>περὶ σπέρματος</i> B. II	84
3. Oribasius. Aetius	104
II. Teil. System der pneumatischen Schule.	
1. Physiologie	131
2. Pathologie	153
3. Diätetik und Therapie	201



Druck von W. Pormetter in Berlin.





Wellmann, Max,

Die pneumatische Schule bis auf Archigenes in ihrer Entwicklung
dargestellt

Berlin 1895

Bibl.Sud. 39

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11569693-0